



Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



✓ 1. Мяч, посланный теннисистом вертикально вверх, поднимается на максимальную высоту за $T = 2$ с.


✓ 1) Найдите начальную скорость V_0 мяча.

✓ 2) Теннисист посылает мяч с начальной скоростью V_0 под различными углами к горизонту в направлении высокой вертикальной стенки, находящейся на расстоянии $S = 20$ м от места броска. На какой максимальной высоте мяч ударяется о стенку?

Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление возд уха считайте пренебрежимо малым. Все высоты отсчитываются от точки старта.

2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол α такой, что $\sin \alpha = 0,8$ (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость $V_0 = 4$ м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте $\mu = \frac{1}{3}$. Движение коробки прямолинейное.



✓ 1) За какое время T после старта коробка пройдет в первом опыте путь $S = 1$ м?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью $U = 2$ м/с, и сообщают коробке скорость $V_0 = 4$ м/с.

✓ 2) На каком расстоянии L от точки старта скорость коробки во втором опыте будет равна $U = 2$ м/с?

✓ 3) На какой высоте H , отсчитанной от точки старта, скорость коробки во втором опыте станет равной нулю? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же скорости V_0 за одинаковое время.


В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом α к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения скорости V_0 действие внешней силы прекращается.

✓ 1) Найдите коэффициент μ трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

✓ 2) Через какое время T после прекращения действия силы санки остановятся? Ускорение свободного падения g .

Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.




Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.


4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости C газа (в единицах универсальной газовой постоянной R) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1 $T_1 = 400$ К, универсальная газовая постоянная $R = 8,31$ Дж/(моль·К).



✓ 1) Найдите работу A_{12} газа в процессе 1-2.

✓ 2) Найдите КПД η цикла.

3) Постройте график цикла в координатах $(P/P_1, V/V_1)$, где P_1 и V_1 давление и объем в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.




5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной b (см. рис.). Масса каждого шарика m , заряд q .

✓ 1) Найдите силу T натяжения нитей.

Одну нить пережигают.

2) Найдите скорость V любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.

✓ 3) На каком расстоянии d от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)?



Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N1

Дано:

$$T = 2c$$


$$S = 20 \text{ м}$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

Решение:

$$mgh + \frac{mV^2}{2} = \text{const} \Rightarrow h_{\max} \text{ при } V=0.$$

$$V = V_0 - gt \Rightarrow V_0 - gT = 0 \Rightarrow V_0 = gT = 20 \text{ м/с}$$



$$V_x = V_{x0} = V_0 \cos \alpha$$

$$V_{y0} = V_0 \sin \alpha$$

Пусть мяч достигнет земли за время T .

$$V_x T = V_0 T \cos \alpha = S \Rightarrow T = \frac{S}{V_0 \cos \alpha}$$

$$h(t) = V_0 \sin(\alpha) t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow h = h(T) = V_0 \sin(\alpha) T - \frac{gT^2}{2}$$

$$h = \frac{V_0 \sin \alpha S}{V_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \frac{S^2}{V_0^2 \cos^2 \alpha} = \tan \alpha S - \frac{gS^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}$$

$$h' = \frac{S}{\cos \alpha} - \frac{gS^2}{2V_0^2} (-2) \frac{1}{\cos^3 \alpha} (-\sin \alpha) = 0$$

$$\frac{S}{\cos \alpha} = \frac{gS^2}{2V_0^2} \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 = \frac{gS \sin \alpha}{V_0^2 \cos^2 \alpha}$$

$$\begin{cases} \sin \alpha = \frac{\sqrt{17}-1}{4} \\ \sin \alpha = \frac{\sqrt{17}+1}{4} \end{cases}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{17}-1}{4}$$

$$\sqrt{16} < \sqrt{17} < \sqrt{25}$$

$$4 < \sqrt{17} < 5$$

$$3 < \sqrt{17}-1 < 4$$

$$\frac{3}{4} < \frac{\sqrt{17}-1}{4} < 1$$

$$-5 > \sqrt{17}-1 > -6$$

$$-\frac{5}{4} > -\frac{\sqrt{17}-1}{4} > -\frac{6}{4}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{17}-1}{4}$$

$$1 - \sin^2 \alpha = \frac{gS}{V_0^2} \sin \alpha$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{gS}{V_0^2} \sin \alpha - 1 = 0$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{gS}{g^2 T^2} \sin \alpha - 1 = 0$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{S}{gT^2} \sin \alpha - 1 = 0$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{20}{10 \cdot 4} \sin \alpha - 1 = 0$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{\sin \alpha}{2} - 1 = 0$$

$$D = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

$$\sin \alpha = \frac{-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{17}}{2}}{2}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{17}-1}{4} \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{\frac{16 - 44 + 2\sqrt{17}-1}{16}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{17}-2}{16}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{\sqrt{17}-1}$$

$$h = S \operatorname{tg} \alpha = \frac{g S^2}{2 v_0^2} \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$h' = \frac{S}{\cos^2 \alpha} - \frac{g S^2}{2 v_0^2} \frac{(-2)(-\sin \alpha)}{\cos^3 \alpha} = 0$$

$$\frac{S}{\cos^2 \alpha} = \frac{g S^2}{2 v_0^2} \frac{2 \sin \alpha}{\cos^3 \alpha}$$

$$\delta = \frac{g S^2}{v_0^2} \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \frac{v_0^2}{g S} = \frac{20^2}{10 \cdot 20} = 2$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 4 \Rightarrow 4 \cos^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$$

$$h_{\max} = 2S - \frac{g S^2}{2 v_0^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{5}} = 2S - \frac{5}{2} \frac{g S^2}{v_0^2}$$

$$h_{\max} = 40 - \frac{5}{2} \frac{10 \cdot 20^2}{20^2} = 40 - 25 = 15 (\text{м})$$


Ответ: $v_0 = 20 \text{ м/с}$; $h_{\max} = 15 \text{ м}$.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



3) ~~Путь~~ Пересечения в СО левые:



~~Для~~ $V=0 \Rightarrow \vec{V}' = \vec{0} - \vec{u} = -\vec{u}$

Возмем за начало отсчета, положим начало.

в н. з.:

$av=g; a_n=0,6g; t_0=0,2c; H=\frac{2}{3}c$

$V'=u = \frac{a_n t_n}{2} \Rightarrow t_n = \sqrt{\frac{2u}{a_n}} = \sqrt{\frac{4}{6}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$

$V'=u = a_n t_n \Rightarrow t_n = \frac{u}{a_n} = \frac{2}{0,6g} = \frac{1}{0,3} (c)$

Полное время пребывания коробки в каб-ой СО:

$S_n = u(t_0 + t_n) + (V_0 - u)t_0 - \frac{a_n t_0^2}{2} - \frac{a_n t_n^2}{2} =$

$= u t_n + V_0 t_0 - \frac{a_n t_0^2 + a_n t_n^2}{2} =$

$= 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot 0,2 - \frac{10 \cdot 0,2^2 + 6 \cdot \frac{1}{9}}{2} =$

$= 0,6 + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0,6 + \frac{1}{3} = 0,6 + \frac{1}{3} (m)$

$H = (0,6 + \frac{1}{3}) \sin \alpha = (0,6 + \frac{1}{3}) 0,8 = 0,48 + \frac{8}{30} (m)$

Ответ: 1) $0,4 + \sqrt{\frac{1}{15}} (c)$; 2) $0,5 (m)$ 3) $0,48 + \frac{8}{30} (m)$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№ 2.

Дано:
 $\sin \alpha = 0,8$
 $V_0 = 4 \text{ м/с}$
 $\mu = \frac{1}{3}$
 $S = 1 \text{ м}$
 $u = 2 \text{ м/с}$
 $g = 10 \text{ м/с}^2$

Решение:



по II з.д:


$$0 = N - mg \cos \alpha.$$

$$N = mg \cos \alpha.$$

$$F_{тр} = \mu N = \mu mg \cos \alpha.$$

то:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - 0,64} = \sqrt{0,36} = 0,6$$




Пока коробка едет вверх (рис. 2)
 её она тормозит с ускорением: $a = \frac{mg(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{m}$
 $\Rightarrow g(0,8 + \frac{0,6}{3}) = g.$

Пока коробка останавливается через время $t_0 = \frac{V_0}{a} = \frac{V_0}{g}.$
 путь, который она пройдет за это время:

$$S_0 = V_0 t_0 - \frac{a t_0^2}{2} = \frac{V_0^2}{g} - \frac{g V_0^2}{g^2 \cdot 2} = \frac{V_0^2}{2g} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5} \text{ (м)}.$$

Значит ей останется пройти $S' = S - S_0 = \frac{1}{5} \text{ м}$, но
 теперь она скользит вниз:



Коробка будет разгоняться с ускорением:
 $a' = \frac{mg(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{m} = g \cdot 0,6.$

$$\frac{a' t'^2}{2} = S' \Rightarrow t' = \sqrt{\frac{2S'}{a'}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{1}{5}}{5 \cdot 0,6}} = \sqrt{\frac{1}{15}} \text{ (с)}$$

$$T = t_0 + t' = \frac{V_0}{g} + \sqrt{\frac{1}{15}} = 0,4 + \sqrt{\frac{1}{15}} \text{ (с)}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

2) перейдем в СО ленты:



$$\vec{V}' = \vec{V} - \vec{u}$$

в этой же коробочка.

будем двигаться вверх, тормозясь.

сущ.-ин $a_0 = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) = g$, в
это время $|V| = |V'| + |u| \geq u > 0$

$$\stackrel{II}{|V|} = |u|, \text{ когда } |V'| = 0$$

$$V' = V_0 - u - a_0 t_0 \Rightarrow u t_0 = \frac{V_0 - u}{a_0} = 0,2(c).$$

За это время в этой СО коробочка придет в покое.
и останется вверх на:

$$S_0 = (V_0 - u)t_0 - \frac{a_0 t_0^2}{2} = 0,202 \text{ м}$$

а в лабораторной СО:

$$S_{lab} = S_0 + u t_0 = V_0 t_0 - \frac{a_0 t_0^2}{2} = 4 \cdot 0,2 - \frac{10 \cdot 0,2^2}{2} = 0,8 - 0,2 = 0,6 \text{ (м)}.$$

Затем коробочка в нашей СО пойдет вниз:
ускорением $a_n = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = 0,6g$.

$$|V| = ||V'| - |u|| \Rightarrow \begin{cases} |V'| = 2|u| \\ |V'| = 0 \leftarrow \text{рассматриваем выше.} \end{cases}$$

$$\stackrel{III}{V_n} = 2u; \quad t_n = \frac{V_n}{a_n} = \frac{2u}{0,6g} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}(c).$$

За это время в лабораторной СО коробочка придет
вверх:

$$\begin{aligned} S_{nn} &= u(t_0 + t_n) + (V_0 - u)t_0 - \frac{a_0 t_0^2}{2} - \frac{a_n t_n^2}{2} = \\ &= V_0 t_0 + u t_n - \frac{a_0 t_0^2}{2} - \frac{a_n t_n^2}{2} = 4 \cdot 0,2 + 2 \cdot \frac{2}{3} - \\ &- \frac{10 \cdot 0,2^2}{2} - \frac{0,6g \cdot \frac{4}{3}}{2} = 0,8 + \frac{4}{3} - 0,2 - \frac{4}{3} = 0,6 \text{ (м)}. \end{aligned}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N3.



$$\text{I } N_1 = mg - F_0 \sin \alpha.$$

$$F_{\text{тр}1} = \mu N_1 = \mu mg - \mu F_0 \sin \alpha.$$

$$ma_1 = F_0 \cos \alpha - \mu mg + \mu F_0 \sin \alpha.$$

$$\text{II } N_2 = mg; F_{\text{тр}2} = \mu N_2 = \mu mg.$$

$$ma_2 = F_0 - F_{\text{тр}2} = F_0 - \mu mg.$$

$$\text{так как } t_1 = t_2 \Rightarrow ma_1 = ma_2$$

$$F_0 \cos \alpha - \mu mg + \mu F_0 \sin \alpha = F_0 - \mu mg.$$

$$\cos \alpha + \mu \sin \alpha = 1$$

$$\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

Поиск перемещения действующей силы:
 $N = mg$; $F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg$.

$$mA = F_{\text{тр}} = \mu mg \Rightarrow A = \mu g.$$

$$T = \frac{V_0}{A} = \frac{V_0}{\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} g} = \frac{V_0 \sin \alpha}{(1 - \cos \alpha) g}$$

$$\text{Ответ: } 1) \mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \quad 2) T = \frac{V_0 \sin \alpha}{(1 - \cos \alpha) g}.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\eta = \frac{A_0}{Q_{12}} = \frac{RT_1(6,5 - 2^{2,5})}{6RT_1} = \frac{6,5 - 2^{2,5}}{6}$$

for

$$C dT = p dV + C_v dT$$

$$C - C_v = p \frac{dV}{dT} = \frac{RT}{V} \frac{dV}{dT} \Rightarrow R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) = (C - C_v) \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$$

$$pV = RT$$

$$V = V_0 \frac{T}{T_0} e^{\frac{C - C_v}{R}}$$

$$p dV + V dp = R dT$$

$$p \frac{dV}{dT} = R - V \frac{dp}{dT}$$


$$V_1 = V_1$$

$$V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} e^{\frac{C - \frac{3}{2}R}{R}} = V_1 \cdot 4 \sqrt{e}$$

$$V_3 = V_2 \frac{T_3}{T_2} e^{\frac{0,5R - 1,5R}{R}} = V_1 \cdot 4 \sqrt{e} \frac{2^{1,5}}{4 \sqrt{e}} = \frac{2^{1,5}}{\sqrt{e}} V_1$$

$$\begin{aligned} p_1 V_1 &= RT_1 \\ p_2 V_2 &= RT_2 \Rightarrow p_2 = \frac{T_2}{T_1} \frac{V_1}{V_2} p_1 = \frac{4}{4 \sqrt{e}} p_1 = \frac{1}{\sqrt{e}} p_1 \end{aligned}$$

$$p_3 = \frac{T_3}{T_1} \cdot \frac{V_1}{V_3} p_1 = \frac{2^{1,5}}{\frac{2^{1,5}}{\sqrt{e}}} p_1 = \sqrt{e} p_1$$



1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

№4. Как видно в каждом из процессов 1-2; 2-3; 3-1.

температуры постоянны: $C_{12} = 2R$; $C_{2-3} = \frac{R}{2}$; $C_{3-1} = 2,5R$.

$$T_1 = T_1; T_2 = 4T_1; T_3 = 2^{1,5}T_1.$$

Затем первый закон термодинамики для процесса 1-2:

$$C_{12} \Delta T_{12} = A_{12} + C_V \Delta T_{12}$$

$$C_{12} (T_2 - T_1) = A_{12} + C_V (T_2 - T_1)$$

$$2R \cdot 3T_1 = A_{12} + \frac{3}{2}R \cdot 3T_1.$$

$$A_{12} = RT_1 \left(6 - \frac{9}{2}\right) = \frac{3}{2}RT_1$$

$$A_{12} = \frac{3 \cdot 8,31 \cdot 400}{2} = 600 \cdot 8,31 \text{ (Дж)}$$

$$Q_{12} = C_{12} (T_2 - T_1) = 2R \cdot 3T_1 > 0.$$

$$2-3: C_{23} \Delta T_{23} = A_{23} + C_V \Delta T_{23}; Q_{23} = C_{23} \Delta T_{23} = \frac{R}{2} T_1 (2^{1,5} - 4) < 0$$

$$\frac{R}{2} T_1 (2^{1,5} - 4) = A_{23} + \frac{3}{2}RT_1 (2^{1,5} - 4).$$

$$A_{23} = -RT_1 (2^{1,5} - 4) > 0.$$

$$3-1: C_{31} \Delta T_{31} = A_{31} + C_V \Delta T_{31}; Q_{3-1} = C_{31} \Delta T_{31} = 2,5R (T_1 - 2^{1,5}T_1) < 0$$

$$2,5R (T_1 - 2^{1,5}T_1) = A_{31} + \frac{3}{2}RT_1 (1 - 2^{1,5})$$

$$A_{31} = RT_1 (1 - 2^{1,5}) < 0.$$

$$A_0 = A_{12} + A_{23} + A_{31} = \frac{3}{2}RT_1 + RT_1 (4 - 2^{1,5}) + RT_1 (1 - 2^{1,5}) =$$


$$= \frac{R}{2} RT_1 \left(\frac{3}{2} + 4 - 2^{1,5} + 1 - 2^{1,5} \right) = RT_1 \left(\frac{13}{2} - 2^{2,5} \right)$$

$C_V = \frac{i}{2}R = \frac{3}{2}R$ (м.к. газ одно-м.)
по условию $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3}$
Аналогично не можем м.к. $\gamma = \frac{5}{3}$
по условию.

Заменим, что
 $3R = 24,93 \approx 25$.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Для каждой в смысле симметрии
все силы равны: T .

По II з. Н:

$$0 = F_{12} + F_{13} \cdot \cos 45^\circ - T$$

$$T = k \frac{q^2}{b^2} + k \frac{\sqrt{2}}{2} k \frac{q^2}{b^2} =$$

$$= k \frac{q^2}{b^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

3) Заметим, что все силы (силы натяжения и силы
кулона) являются внутренними, значит,
центр масс покоится, находясь в центре квадрата.

и значит искомого расстояния

$$x = \sqrt{b^2 + \frac{b^2}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} b$$



2) Из сооб-ий симметрии $v_2 = v_3$; $v_1 = v_4$.

$$v_2 \cdot \frac{b}{r} = v_3 \cdot \frac{b}{r} \Rightarrow v_2 = 3v_1 \text{ из того, что центр масс покоится.}$$

$$F_c = \frac{kq^2}{r^2} \quad dA = \frac{kq^2}{r^2} dr \Rightarrow A = kq^2 \cdot \left(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r_1} \right)$$

$$\frac{mv_1^2}{2} = kq^2 \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{b} + \frac{1}{\sqrt{2}b} - \frac{1}{b} - \frac{1}{2b} - \frac{1}{3b} \right)$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{kq^2}{mb} \left(2 + \sqrt{2} - 1 - \frac{2}{3} \right)}$$

$$\text{Ответ: } T = k \frac{q^2}{b^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \quad v_1 = \sqrt{\frac{kq^2}{mb} \left(2 + \sqrt{2} - 1 - \frac{2}{3} \right)}$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порука QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$$C dT = p dV + C_v dT$$

$$(C - C_v) dT = p dV$$

$$\frac{p}{p_0} = \frac{V}{V_0} e^{\left(\frac{C_p - C}{R}\right)}$$

$$p = \frac{p_0}{V_0} e^{\frac{C_p - C}{R}} V$$

$$C - C_v = p \frac{dV}{dT} = \frac{RT}{V} \frac{dV}{dT}$$

$$\frac{C - C_v}{R} \cdot \frac{dT}{T} = \frac{dV}{V}$$

$$\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0} e^{\frac{C - C_v}{R}} = \frac{p}{p_0} e^{\frac{C - C_p}{R}}$$

$$p = p_0 \frac{T}{T_0} e^{\frac{C - C_v - C + C_p}{R}}$$

kg.

$$G \frac{m^2}{R^2} = A$$

$$\frac{36 \mu^2}{V_0}$$

$$F = \frac{k q^2}{r^2}$$

$$F dr = \frac{k q^2}{r^2} dr = dA$$

$$A = -k q^2 \frac{1}{r} = -k q^2 \left(\frac{1}{r_k} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$pV = RT$$

$$p dV + V dp = R dT$$

$$(C - C_v) = \frac{p dV}{dT} =$$

$$= \frac{R dT - V dp}{dT} = R - V \frac{dp}{dT}$$

$$C - C_v =$$

$$C - C_v = p \frac{dV}{dT}$$

$$m a =$$

$$p dV + V dp = R dT$$

$$C dT = R dT - V \frac{dp}{dT} + C_v dT$$

$$C - C_p = - \frac{V dp}{dT}$$

$$V \cdot \frac{b}{2} = u \frac{3}{2} b$$

$$V = 3u$$

$$\frac{u}{u}$$

$$\frac{C - C_p}{C - C_v} = - \frac{V}{p} \frac{dp}{dV}$$

$$x = \frac{x^2}{2}$$

$$p = V^{\frac{C - C_p}{C - C_v}}$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$tg' = \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right)' = \frac{\cos^2 \alpha - \sin \alpha (\sin \alpha)}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$


$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g(x)^2} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

$$\begin{matrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{matrix} \quad x^2 \rightarrow 2x$$

$$\frac{C - C_v}{R} (dpV + p dV) = p dV$$

$$h' = \frac{S}{\cos^2 \alpha} - \frac{g S^2}{2 V_0^2} \frac{(-2)(-\sin \alpha)}{\cos^3 \alpha} = \frac{dp}{p} = \frac{dV}{V} \left(1 - \frac{C - C_v}{R} \right)$$

$$= \frac{S}{\cos^2 \alpha} - \frac{g S^2 \sin \alpha}{V_0^2 \cos^3 \alpha} = 0$$

$$\beta = \frac{g S^2}{V_0^2} \tan \alpha$$

$$\frac{V_0^2}{g S} = \tan \alpha = \frac{400}{200} = 2$$

$$\ln \left(\frac{p}{p_0} \right) = \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) \frac{C - C_v}{R}$$

$$m g h = \frac{m V_0^2}{2} - m m g 0,6 m g \quad C = p \frac{dV}{dT} + C_v$$

$$RT_1 \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$4RT_1 - 2^{15} \frac{3}{2}$$

$$\frac{R}{2} T_1 \cdot 3 = \frac{3}{2} RT_1$$

$$(C - C_v) \frac{dT}{T} = R \frac{dV}{V}$$

$$RT_1 \left(\frac{1}{2} - T_1 \right)$$

$$dpV + p dV = R dT$$

$$C dT = p dV + C_v dT$$

$$C - C_v = p \frac{dV}{dT}$$

$$pV = RT$$

$$C - C_v = \frac{RT}{V} \frac{dV}{dT}$$

$$p = \frac{RT}{V}$$