



Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



1. Мяч, посланный теннисистом вертикально вверх, поднимается на максимальную высоту за $T = 2$ с.


1) Найдите начальную скорость V_0 мяча.

2) Теннисист посылает мяч с начальной скоростью V_0 под различными углами к горизонту в направлении высокой вертикальной стенки, находящейся на расстоянии $S = 20$ м от места броска. На какой максимальной высоте мяч ударяется о стенку?

Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление воздуха считайте пренебрежимо малым. Все высоты отсчитываются от точки старта.

2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол α такой, что $\sin \alpha = 0,8$ (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость $V_0 = 4$ м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте $\mu = \frac{1}{3}$. Движение коробки прямолинейное.



1) За какое время T после старта коробка пройдет в первом опыте путь $S = 1$ м?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью $U = 2$ м/с, и сообщают коробке скорость $V_0 = 4$ м/с.

2) На каком расстоянии L от точки старта скорость коробки во втором опыте будет равна $U = 2$ м/с?

3) На какой высоте H , отсчитанной от точки старта, скорость коробки во втором опыте станет равной нулю? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же скорости V_0 за одинаковое время.


В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом α к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения скорости V_0 действие внешней силы прекращается.

1) Найдите коэффициент μ трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

2) Через какое время T после прекращения действия силы санки остановятся? Ускорение свободного падения g .

Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.






Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01


Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.




4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости C газа (в единицах универсальной газовой постоянной R) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1 $T_1 = 400$ К, универсальная газовая постоянная $R = 8,31$ Дж/(моль·К).



- 1) Найдите работу A_{12} газа в процессе 1-2.
- 2) Найдите КПД η цикла.
- 3) Постройте график цикла в координатах $(P/P_1, V/V_1)$, где P_1 и V_1 давление и объём в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.



5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной b (см. рис.). Масса каждого шарика m , заряд q .



- 1) Найдите силу T натяжения нитей. Одну нить пережигают.
- 2) Найдите скорость V любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.
- 3) На каком расстоянии d от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)?

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Дано:

$$T = 2 \text{ с}$$

$$S = 20 \text{ м}$$

$$g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

1) $v_0 = ?$

2) $H = ?$

Решение:

1) $v_x = v_0 - at;$

$$0 = v_0 - gT \Rightarrow v_0 = gT;$$

$$v_0 = 10 \cdot 2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

2) $y = v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \Rightarrow H = v_0 \sin \alpha t - \frac{g t^2}{2}; (1)$

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \Rightarrow S = v_0 \cos \alpha t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{S}{v_0 \cos \alpha} (2)$$

Подставим (2) в (1): $H = \frac{v_0 \sin \alpha S}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g S^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha};$

$$H = S \tan \alpha - \left(\frac{g S^2 \tan^2 \alpha}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} + \frac{g S^2 \cos^2 \alpha}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \right);$$

$$-S \tan \alpha + H = -\frac{g S^2}{2 v_0^2} \tan^2 \alpha - \frac{g S^2}{2 v_0^2};$$

$$\frac{g S^2}{2 v_0^2} \tan^2 \alpha - S \tan \alpha + \frac{g S^2}{2 v_0^2} + H = 0 - \text{получим кв. уравнение,}$$

т.к. максимальной высоты мяч достигает только при
одном значении α , то $D = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow 18^2 - 4 \frac{g S^2}{2 v_0^2} \cdot \left(\frac{g S^2}{2 v_0^2} + H \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{2gH}{v_0^2} = 1 - \frac{g^2 S^2}{2 v_0^4};$$

$$H = \frac{v_0^4 - g^2 S^2}{2g v_0^2}; \quad H = v_0^2 - \frac{g T^2}{2} \Rightarrow H = \frac{g T^2}{2} - \frac{S^2}{2g T^2};$$

$$H = \frac{10^2 \cdot 2^4 - 20^2}{2 \cdot 10 \cdot 2^2} = 15 \text{ м.} \quad \text{Ответ: } v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}; H = 15 \text{ м.}$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Дано:

$$\sin \alpha = 0,8$$

$$v_0 = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\mu = \frac{1}{9}$$

$$1) S = 1 \text{ м}$$


$$2) \mu = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$1) T = ?$$

$$2) L = ?; H = ?$$

$$3) H = ?$$

Решение:



По следствию из II з. Ньютона:

$$O_y: N - mg \cos \alpha = 0 \Rightarrow N = mg \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{по ф. Ампера-Кулона: } F_{\text{тр}} = \mu mg \cos \alpha.$$

$$O_x: ma = -ma = -mg \sin \alpha - F_{\text{тр}};$$

$$ma = mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha, \text{ где}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}; \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = 0,6$$

$$a = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha). (1)$$

По полезной формуле: $S = \frac{v_0^2 - v_1^2}{2a} \Rightarrow$

$$S = v_0 T - \frac{aT^2}{2} = v_0 T - \frac{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)T^2}{2};$$

$$S - v_0 T + \frac{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)T^2}{2} = 0;$$

$$D = v_0^2 - 4 \cdot \frac{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}{2} \cdot S =$$

$$= v_0^2 - 2gS(\sin \alpha + \mu \cos \alpha);$$

$$\begin{cases} T = \frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 2gS(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}; & \text{— первый раз на } x=S; \\ T = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 - 2gS(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}; & \text{— второй раз на } x=S; \end{cases}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

нам подходит только первый ответ с
минусом, т.к. требуется найти время за
перемещение на S :

$$T = \frac{v_0 - \sqrt{2gS(\sin\alpha + \mu\cos\alpha) + v_0^2}}{g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}$$

$$T = \frac{4 - \sqrt{2 \cdot 10 \cdot (0,8 + \frac{1}{3} \cdot 0,6) + 4^2}}{10(0,8 + \frac{1}{3} \cdot 0,6)} = \frac{4 - \sqrt{4}}{10}$$

- отрицательное ^{ое} выражение под корнем $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ тело не достигнет координаты $x=S$, найдём

максимальную координату $x_{\max}$:

$$v_x = v_0 + at, \Rightarrow 0 = v_0 - g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)t$$

$$\text{Заметим, что } \sin\alpha + \mu\cos\alpha = 0,8 + \frac{1}{3} \cdot 0,6 = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = g \Rightarrow 0 = v_0 - gt, \Rightarrow t_1 = \frac{v_0}{g} \quad (2)$$

$$x_{\max} = v_0 t_1 - \frac{gt_1^2}{2} = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g} = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$x_{\max} = \frac{16}{2 \cdot 10} = 0,8 \text{ м, далее тело}$$

поедет вниз, найдём время t_2 , за которое оно

проедет $S - x_{\max}$, тогда $T = t_1 + t_2$:

$$S - x_{\max} = \frac{gt_2^2}{2} \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2(S - x_{\max})}{g}}$$

$$T = t_1 + t_2 = \frac{v_0}{g} + \sqrt{\frac{2(S - x_{\max})}{g}}; T = \frac{4}{10} + \sqrt{\frac{2(1 - 0,8)}{10}} = 0,6 \text{ с.}$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

2). Все кинематические величины в лоб. системе
отсчёта $\Rightarrow$ ~~на~~ скорости $u = 2 \frac{м}{с}$ коробка
достигнет, когда ~~она~~ остановится отн. ленты, тогда:
зная из предыдущего пункта время $t_1 = \frac{v_0}{g}$ за
которое коробка останавливается:

$$L = v_1 t_1 - \frac{a t_1^2}{2}, \text{ где } a = g \text{ (доказанно).}$$

$$v_1 = v_0 + u \text{ (по 3-му сложения скоростей)}$$

$$L = (v_0 + u) \frac{v_0}{g} - \frac{v_0^2}{2g};$$

$$L = \frac{v_0^2}{2g} + \frac{u \cdot v_0}{g}; \quad L = \frac{4^2}{2 \cdot 10} + \frac{2 \cdot 4}{10} = 1,6 \text{ м.}$$

$$3) \quad \sin \alpha = \frac{H}{L} \Rightarrow H = L \sin \alpha;$$

$$H = 1,6 \cdot 0,8 = 1,28 \text{ м}$$

$$\text{Ответ: 1) } T = 0,6 \text{ с;}$$

$$2) L = 1,6 \text{ м;}$$

$$3) H = 1,28 \text{ м.}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Дано:
 $g; v_0; L; F$

- 1) μ -?
- 2) T -?



По следствию из II з. Ньютона:

$$Oy: F_{\text{см}d} + N_1 = mg \Rightarrow N_1 = mg - F_{\text{см}d} \Rightarrow$$


$\Rightarrow$ по ф. Ампера - Кулона:

$$F_{\text{тр}1} = \mu mg - \mu F_{\text{см}d}.$$

$$Ox: F \cos \alpha - F_{\text{тр}1} = ma_1;$$

$$a_1 = \frac{F}{m} \cos \alpha - \mu g + \frac{\mu F_{\text{см}d}}{m} \quad (1)$$

Второй случай:



По следствию из II з. Ньютона:

$$Oy: N_2 = mg \Rightarrow F_{\text{тр}2} = \mu mg;$$

$$Ox: ma_2 = F - F_{\text{тр}2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{F}{m} - \mu g \quad (2)$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$t_1 \neq t_2; \quad v_0 = 0 + at \Rightarrow v_0 = at \Rightarrow a = \frac{v_0}{t};$$


$$a \propto \frac{1}{t} \text{ (т.к. } v_0 = \text{const)};$$

$$t_1 \neq t_2 \Rightarrow a_1 = a_2 \Rightarrow \frac{v_0}{t_1} = \frac{v_0}{t_2} = a_2;$$

$$(1) = (2): \quad \frac{F}{m} \cos \alpha - \mu g + \frac{\mu F \sin \alpha}{m} = \frac{F}{m} - \mu g; \quad | \cdot m$$

$$F \cos \alpha + \mu F \sin \alpha = F \quad | \cdot \frac{1}{F}$$

$$\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$



По следствию из II з-на Ньютона:

$$O_y: N_3 = mg \Rightarrow F_{тр3} = \mu mg;$$

$$O_x: -ma_3 = -F_{тр3} \Rightarrow a_3 = \frac{\mu mg}{m} = \mu g \quad (3)$$

$$\text{С учётом } v_k = 0 \Rightarrow 0 = v_0 - a_3 T;$$

$$T = \frac{v_0}{a_3}; \text{ с учётом (3) } a_3 = \mu g$$

$$T = \frac{v_0}{\mu g}, \text{ с учётом выражения для } \mu:$$

$$T = \frac{v_0 \sin \alpha}{g(1 - \cos \alpha)}.$$

Ответ: 1) $\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$; 2) $T = \frac{v_0 \sin \alpha}{g(1 - \cos \alpha)}.$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Дано:

$$\nu = 1 \text{ моль};$$

$$i = 3$$

$$T_1 = 400 \text{ K}$$

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{K}}$$

$$1) A_{12} - ?$$

$$2) \eta - ?$$

$$3) \text{График } P \sim V.$$

Решение:

$$C_{1,2} = 2R; \quad Q = C \Delta T; \quad (1)$$

По 1-3. Термодинамика:

$$Q = \Delta U + A_{\text{газ}} \quad (2)$$

$$(1) - (2): \quad C \Delta T = \Delta U + A_{\text{газ}}$$

$$\text{По (1-2):} \quad 2R \Delta T = \frac{3}{2} R \Delta T + A_{\text{газ}_{1-2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_{\text{газ}_{1-2}} = \frac{1}{2} R \Delta T$$

$$\Rightarrow A_{\text{газ}_{1-2}} = \frac{1}{2} R \Delta T$$

$$\text{Менделеева-Клапейрона:} \quad T = \frac{P V}{R}$$

$$\Rightarrow A_{\text{газ}_{1-2}} = \frac{1}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1) - \text{формула работы газа}$$

при $\frac{P_1}{V_1} = \text{const}$, тогда найдем P_2 :

$$V_1 = \frac{R T_1}{P_1} \quad \frac{P_1}{V_1} = \frac{P_2}{V_2} \Rightarrow$$

$$T_2 \text{ по графику } T_2 = 4 T_1 \Rightarrow A_{\text{газ}_{1-2}} = \frac{1}{2} R (4 T_1 - T_1) = \frac{3}{2} R T_1$$

$$A_{\text{газ}_{1-2}} = \frac{3}{2} \cdot 8,31 \cdot 400 = 4986 \text{ Дж.}$$

$$2) \eta = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2}, \text{ где } Q_1 = Q_{1,2} + Q_{1,3} \quad \text{Т.К.}$$

$$Q_1 = Q_{1,2} + Q_{1,3}$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

2) Заметим, что процесс (2-3) соответствует изобарному сжатию, т.к.

$$Q = Q;$$

$$C_{2,3} \Delta T = A_{газ_{2,3}} + \Delta U_{2,3}$$

$$\frac{1}{2} R \Delta T = A_{газ_{2,3}} + \frac{3}{2} R \Delta T \Rightarrow A_{газ_{2,3}} = -R \Delta T,$$

$$\Rightarrow p = \text{const};$$

Для процесса (3-1): $C_{3,1} \Delta T = A_{газ_{3,1}} + \Delta U_{3,1}$

$$\frac{5}{2} R \Delta T = A_{газ_{3,1}} + \frac{3}{2} \Delta U_{3,1}$$

$$R \Delta T = A_{газ_{3,1}} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ (3-1) - изобарное расширение.

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{*}|}{Q_1}, \text{ где } Q_2 = Q_{1,2} + Q_{3,1}$$

$$Q_{1,2} = A_{газ_{1,2}} + \Delta U_{1,2} = \frac{3}{2} R T_1 + \frac{3}{2} R (4T_1 - T_1) = 6RT_1 > 0$$

$$Q_{2,3} = A_{газ_{2,3}} + \Delta U_{1,2} = -R(2\sqrt{2}T_1 - 4T_1) + \frac{3}{2} R(2\sqrt{2}T_1 - 4T_1) =$$

$$= -RRT_1(\sqrt{2}-2) < 0$$

$$Q_{3,1} = A_{газ_{3,1}} + \Delta U_{3,1} = R(T_1 - 2\sqrt{2}T_1) + \frac{3}{2} R(T_1 - 2\sqrt{2}T_1) =$$

$$= -\frac{5}{2} R T_1 (1 - 2\sqrt{2}) < 0$$

$$\text{Значит, } \eta = 1 - \frac{|Q_{*}|}{Q_1} = 1 - \frac{|RT_1(\sqrt{2}-2) + T_1 \frac{5}{2}(1-2\sqrt{2})|}{6RT_1} =$$

$$= 1 - \frac{|\sqrt{2}-2 + \frac{5}{2}-5\sqrt{2}|}{6} = 1 - \frac{4\sqrt{2}-\frac{1}{2}}{6} = 1 - 0,86 = 0,14$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

3) При ~~$T_2 = \frac{p_2 V_2}{R}$~~ $\Rightarrow \Delta T = \frac{1}{R} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$,

Тогда: $T_2 - T_1 = \frac{1}{R} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$;

~~$\Delta T_1 R = p_2 V_2 - p_1 V_1$;~~

$\frac{pV}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_2 V_2}{T_2} = \frac{p_1 V_1}{T_1} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1}$
 $\frac{4T_2}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} \Rightarrow$

$\Rightarrow p_2 V_2 = 4p_1 V_1$


~~Простите, мне надо торопиться на сборы
по астрономии, поэтому я не успел.~~

Начертим график зная, что $A_{газ} = S_{\text{под графиком}}$ числ.

$A_{газ1-2} = \frac{3}{2} R T_1 = \frac{3}{2} p_1 V_1$

$A_{газ2-3} = (4 - 2\sqrt{2}) p_1 V_1$

$A_{газ3-1} = (1 - 2\sqrt{2}) R T_1 = (2\sqrt{2} - 1) p_1 V_1$



Ответ: 1) $A_{1-2} = 4386 \text{ Дж}$; 2) $A_2 = 0,14$


1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Дано:
 $b; m; q; k$

- 1) T_0 - ?
- 2) v - ?
- 3) d - ?

Решение:



Эта Д.С. система
симметрична: все T равны
между собой, рассмотрим
любой из шариков, здесь:

по 3-ку Кулона:

$$F_1 = k \frac{q^2}{b^2}; \quad F_2 = k \frac{q^2}{2b^2} \text{ (из т. Пифагора),}$$

Тогда по следствию из II 3-ка Ньютона:

$$Ox: 2T \sin 45^\circ = 2F_1 \sin 45^\circ + F_2$$

$$2T \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \cdot k \frac{q^2}{b^2} \frac{\sqrt{2}}{2} + k \frac{q^2}{2b^2}$$

$$T = k \frac{q^2}{b^2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right)$$

2) По 3-ку сохранения энергии:

$$E_{\text{ко}} + E_{\text{по}} = E_{\text{к}} + E_{\text{п}}$$

$$0 + 4 \cdot k \frac{q^2}{b} + 2 \cdot k \frac{q^2}{b\sqrt{2}} = 3k \cdot \frac{q^2}{b} + 2k \frac{q^2}{2b} + k \frac{q^2}{3b} + \frac{4mv^2}{2};$$

Конечное состояние:



Т.к. верхаие шары будут
отталкивать
и действовать друг на друга



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$4k \frac{q^2}{b^2} + 2k \frac{q^2}{b^2} - 8k \frac{q^2}{b} + 2k \frac{q^2}{2b} + 8k \frac{q^2}{3b} + \frac{4mq^2}{2}$$

$$kq^2 \frac{q^2}{b} \left(4 + \frac{2}{\sqrt{2}} - 3 - 1 - \frac{1}{3} \right) = 2mq^2$$

$$kq^2 \frac{q^2}{b} \left(\frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} \right) = 2mq^2 \Rightarrow \frac{q^2}{b} \sqrt{\frac{kq^2}{2mb} \left(\frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} \right)}$$

2) В ^{начале} процессе движения на вершине



Находим $\vec{a}_0$:

По следствию из II з. Ньютона:

На Oy : $T_H = P_1 + P_2 \sin 45^\circ$

На Ox : $-ma_0 = -P_1 - P_2 \sin 45^\circ$

А на нижние шарики силы электростатич.
взаимодействия компенсированы силами
натяжения нитей $\Rightarrow$ их скорости останутся
равны 0. φ

На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

3) Из 2 пункта можно найти
расстояние любого из вершин шариков
от начального положения:



По т. Пифагора:

$$d^2 = b^2 + b^2 = 2b^2$$

$$d = b\sqrt{2}.$$

Ответ: 1) $T = k \frac{q^2}{b^2} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$.

примерно $1,35 k \frac{q^2}{b^2}$;

2) Для легких шариков $v=0$.

3) $d = b\sqrt{2}$

примерно $1,41 b = d$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$T = 20$$

$$H_{max} = v_0 T - \frac{g T^2}{2};$$

$$0 = v_0 - g t$$

$$t = \frac{v_0}{g} = \frac{4}{10} = 0.4 \text{ c}$$

$$0 = v_0 - g T \Rightarrow v_0 = g T$$

$$H = \frac{g T^2}{2} \Rightarrow \boxed{10 \cdot 2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}}$$

$$S_{max} = 4 \cdot 0.4 - \frac{10 \cdot 0.16}{2} = 20 \text{ м}$$

$$= 1.6 - \frac{1.6}{2} = 0.8$$

$$= 1.6 - 0.8 = 0.8 \text{ м}$$

$$H = v_0 \sin \alpha t - \frac{g t^2}{2}; \quad S = v_0 \cos \alpha t$$

$$\cos \alpha = \frac{S}{v_0 t}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{S^2}{v_0^2 t^2}} = \frac{\sqrt{v_0^2 t^2 - S^2}}{v_0 t}$$

$$H = v_0 \sqrt{v_0^2 t^2 - S^2} - \frac{g t^2}{2}$$

$$t = \frac{S}{v_0 \cos \alpha}$$

$$H = S \tan \alpha - \frac{g S^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

$$H = S \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{g S}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \right)$$

$$H = S \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{g S}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} - \frac{g S}{2 v_0^2} \right);$$

$$\tan \alpha = \frac{H}{S}$$

$$H = S \tan \alpha - \frac{g S^2}{2 v_0^2} \tan^2 \alpha - \frac{g S^2}{2 v_0^2} \Rightarrow \frac{g S^2}{2 v_0^2} \tan^2 \alpha - S \tan \alpha + \frac{g S^2}{2 v_0^2} + H = 0$$

$$D = S^2 - 4 \cdot \frac{g S^2}{2 v_0^2} \cdot \left(\frac{g S^2}{2 v_0^2} + H \right) = 0$$

$$S^2 - \frac{g^2 S^4}{v_0^4} - 2 \frac{g S^2 H}{v_0^2} = 0$$

$$\frac{g^2 S^4}{v_0^4} = S^2 \left(1 - \frac{2 g H}{v_0^2} \right)$$

$$H = \frac{v_0^2 - \frac{g^2 S^2}{v_0^2}}{2 g} = \frac{v_0^4 - g^2 S^2}{2 g v_0^2} = \frac{400 - \frac{100 \cdot 20^2}{20^2}}{2 \cdot 10} = \frac{300}{20} = 15 \text{ м}$$

$$\frac{4980}{6} = 830$$

$$0.4 + \frac{2}{10} = 0.6 \text{ c}$$

$$80 \times 48 = 128$$

$$128$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Черновик.

$$C_{13} = \frac{5}{2}$$

$$b = \sqrt{2}$$

При $p = \text{const.}$

$$b^2 = 2$$

$$Q = \Delta U + A_{\text{газа}}$$

$$A_{\text{газа}} = \nu R \Delta T =$$

$$\Rightarrow C = 0,5R \text{ при}$$

изобарном охлаждении


$$\Delta U + A$$

$\frac{5}{2}$ изобара?

$$\Rightarrow p \propto dV$$

Даны p_1 и V_1 :

p_2 V_2




$$p(V_2 - V_1) =$$

$$\Rightarrow p_2 V_2 - p_1 V_1 = 0$$

$$\Rightarrow \nu R T_2 - \nu R T_1 = R \Delta T$$

$$\frac{514}{6} = \frac{257}{3} = \frac{258}{3} = 86$$



$$\begin{aligned} A_{1-2} &= 0,5 R \Delta T \\ A_{2-3} &= -R \Delta T \\ A_{3-1} &= R \Delta T \end{aligned}$$



$$8900 - 183 = 8717$$

$$\frac{100}{282} =$$

$$\frac{1}{2,82}$$

$$\frac{100}{282} = 0,35$$

$$\frac{1540}{282} = 5$$