



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 9



✓1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{14}7^{10}$, bc делится на $2^{17}7^{17}$, ac делится на $2^{20}7^{37}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

✓2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

✗3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 1 и 5 соответственно.

✓4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2 - 7x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-12; 24)$, $Q(3; 24)$ и $R(15; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 12$.

6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax - y + 10b = 0, \\ ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 4,5 и 2.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

МФТИ

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№ 1

Из условия:

$$ab \geq 2^{14} \cdot 7^{10}$$

$$bc \geq 2^{17} \cdot 7^{17}$$

$$ac \geq 2^{20} \cdot 7^{37}$$

Тогда, перемножив полученные неравенства,

получим: $a^2 b^2 c^2 \geq 2^{51} \cdot 7^{64}$. С другой стороны,

$a^2 b^2 c^2 = (abc)^2$. Поэтому любое простое число должно входить в разложение данного числа в четной степени.

Значит, если $a^2 b^2 c^2 \geq 2^{51}$, то и $a^2 b^2 c^2 \geq 2^{52}$. Поэтому

$$a^2 b^2 c^2 \geq 2^{52} \cdot 7^{64} \quad \text{Тогда} \quad abc \geq 2^{26} \cdot 7^{32}$$

То есть $abc \geq 2^{26} \cdot 7^{32}$. Пример, для которого

неравенство превращается в равенство: Также,

из пункта ~~условия~~ условия $ac \geq 2^{20} \cdot 7^{37}$. Полагая,

что $abc \geq 7^{37}$, то есть $abc \geq 2^{26} \cdot 7^{37}$. Пример,

когда $abc = 2^{26} \cdot 7^{37}$: $b = 2^6$; $a = 2^9 \cdot 7^{17}$; $c = 2^{11} \cdot 7^{20}$.

Для данного набора условия выполняются.

Ответ: ~~abc~~ $2^{26} \cdot 7^{37}$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$\sqrt{2}$

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2} = \frac{a+b}{(a+b)^2-8ab} \quad \text{Т.к. по условию } \frac{a}{b} - \text{несок-}$$

ратима, то $(a, b) = 1$. Пусть числитель и знаменатель дроби можно сократить на m . Тогда:

$$\begin{cases} a+b : m \\ (a+b)^2-8ab : m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b : m \\ -8ab : m \end{cases}$$

Пусть a или $b : m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$. И пусть a или $b : p_i^{\alpha_i-k}$ ($k < \alpha_i$). Тогда заметим, что $a+b \not\vdots p_i^{\alpha_i-k}$. Т.к. из-за $(a, b) = 1$, если $a : p_i^{\alpha_i-k}$, то $b \not\vdots p_i^{\alpha_i-k}$, и наоборот. А значит, $(a+b) \not\vdots m$, т.к. $p_i^{\alpha_i-k}$ ~~не делится на~~ m . Из этого $(ab, m) = 1$.

Поэтому $8 : m$, из этого $m \leq 8$. При $m = 8$, пример: $a = 1, b = 7$.

Ответ: при $m = 8$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{2x^2-5x+3} - \sqrt{2x^2+2x+1} = 2-7x$$

дажножи левую и правую часть на $(\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1})$.

Мы можем это сделать, т.к. ^{корректность} ~~бумага~~ ~~условие~~ ~~следует~~

не потеряем условие на то, что корни должны быть ≥ 0 .

$$2x^2-5x+3 - 2x^2-2x-1 = (2-7x)(\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1})$$
$$(2-7x) = (2-7x)(\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1}).$$

$$a) 2-7x = 0$$

$$x = \frac{2}{7}$$

~~$f(x) = \sqrt{2x^2-5x+3}$~~ определен, когда $2x^2-5x+3 \geq 0$.

$$D = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 1.$$

$$x_1 = \frac{5+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$x_2 = \frac{5-1}{4} = 1.$$

Разложив ~~на~~ $D(f) =$
 $= (-\infty; 1] \cup [\frac{3}{2}; +\infty).$

$g(x) = \sqrt{2x^2+2x+1}$ определен, когда $2x^2+2x+1 \geq 0$.

$$D = 4 - 4 \cdot 2 = -4.$$

$$\text{т.е. } D(g) = (-\infty; +\infty).$$

Значит, $x = \frac{2}{7}$ подходит.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\delta) \sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 1. \quad (1)$$

Из пред. пункта $x_{\text{верш. } g(x)} =$

$$2x^2 + 2x + 1 \geq k, \text{ где } k$$

$$g(x) = 2x^2 + 2x + 1 = \left(\sqrt{2}x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}. \text{ т.е. } g(x) \geq \frac{1}{2}.$$

Также заметим, что нам подходят только $\left. \begin{array}{l} g(x) = \frac{1}{2} \text{ при} \\ x = -\frac{1}{2} \end{array} \right\}$
 $x \in [-1; 0]$. т.к. иначе $g(x) > 1$. а значит и (1) не
будет выполняться.

Нозаметим, что на данном промежутке

$$f(x) = \sqrt{2x^2 - 5x + 3} > 1. \text{ ведь. вершина у } f(x) \text{ находится}$$

$$\text{в } \left(\frac{\frac{5}{2} + 1}{2}\right) \text{ из предыдущ. пункта (а), т.е. правее } 0.$$

$$\text{А } f(0) = \sqrt{3} > 1. \text{ Тогда}$$

Тогда в пункте (б) корней нет.

$$\text{Ответ: } x = \frac{2}{7}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№ 06

$$((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0. \text{ При}$$


$$a) \begin{cases} (x+8)^2 + y^2 - 1 \geq 0 \\ x^2 + y^2 - 4 \leq 0. \end{cases}$$

На коорд. плоскости это будет

иметь след. вид:

Т.к. у нас система, то нам

необходимо пересечение
данной "+" и "///". Т.е.



область "///" Но за-
круг радиуса 2 с центром в (0,0)
метим, что для данного

пересечения нам надо, чтобы

у нас было два решения для системы. Т.е. прямая
 $ax - y + 10b = 0$ - секущая для круга ω . Но тогда у нас
найдется хотя бы одно решение внутри круга. ~~Противо-~~
~~решение~~. Тогда будет > 2 решений. Противоречие.

$$b) \begin{cases} (x+8)^2 + y^2 - 1 \leq 0 \\ x^2 + y^2 - 4 \geq 0. \end{cases}$$

На коорд. плоскости это будет иметь след. вид:




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Т.к. у нас система, то возм. решения это пересечение "////" и "++". т.е. "////". Дальнейшее рассуждения аналогичны
к окружности радиуса 1 с центром в $(-8; 0)$ и точке (а)

Таким образом, решений не будет. ~~Будет~~

Ответ: таких а не существует




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

2) Из условия $(a, b) = 1$.

$$a^2 - 6ab + b^2 = (a-b)^2 - 4ab$$

$$((a+b)^2; (a-b)^2 - 4ab) = m$$

$$a_1 x + (a_1 x + b_1 y_1)(a_1 x_2 + b_1 y_2)$$

$$((a-b)^2; (a-b)^2 - 8ab) = m$$

||

$$(a-b) \equiv 0 \pmod{m}$$

$$(a-b)^2 - 8ab \equiv -8ab \equiv 0 \pmod{m}$$

Если $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$. Тогда $\forall a_i^{\alpha_i}; p_i^{\alpha_i}$, то

$$(a-b) \not\equiv 0 \pmod{p_i^{\alpha_i}}; \text{т.к. } a \not\equiv b \pmod{p_i^{\alpha_i}}$$

$$m = 8$$

$$a \equiv 2 \pmod{8}, m = 6, a = 1; b = 7$$

$$2) ab \geq 2^{14} \cdot 7^{10}$$

$$bc \geq 2^{17} \cdot 7^{17}$$

$$ac \geq 2^{20} \cdot 7^{37}$$

$$a^2 b^2 c^2 \geq 2^{52} \cdot 7^{64}$$

пусть $(abc)^2$ все простые входят
в степенях, поэтому $a^2 b^2 c^2 \geq 2^{52} \cdot 7^{64}$.

$$abc \geq \sqrt{a^{52} \cdot 7^{64}}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

4.8)

$$2x^2 - 5x + 3 - 2x^2 - 2x - 1 = (2 - 7x)(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1})$$

$$(-7x + 2) = (2 - 7x)(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1})$$

$$25 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = \sqrt{25 - 24} = 1$$


$$11 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -1 \in [-1, 0]$$

а) $-7x + 2 = 0 \Rightarrow$ проверить, что $\sqrt{\quad}$ будут > 0 , тогда ок.

б) $-1 = \sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}$

↑ неверно, т.к. $\sqrt{x} \geq 0$.

3)



$$y^2 - 1 + \frac{49}{x^2} = 1$$

$$\frac{AC}{CB} = \frac{7}{1}$$

$$\frac{1+y^2}{1+x^2} = \frac{49}{1}$$

$$1+y^2 = 49+49x^2$$

$$y^2 = 49x^2$$

$$R=5$$

$$\frac{y^2-1}{x^2-1} = \frac{49}{1}$$

$$y^2 - 1 = 49x^2 - 49$$

$$y^2 = 49x^2 - 48$$

из ACVA:
y - диаметр.
x - диаметр.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

