



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 8



1. [3 балла] Пятый член арифметической прогрессии равен $6x + 18$, седьмой член равен $(x^2 - 4x)^2$, а одиннадцатый равен $(-3x^2)$. Найдите x .
2. [4 балла] Найдите наименьшее значение выражения $14x + 7y$ при условии

$$\begin{cases} |4x - 3y| \leq 6, \\ |3x - 4y| \leq 8. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары (m, n) натуральных чисел, для которых одно из чисел $A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n$ и $B = m^2n - mn^2 + 3mn$ равно $13p^2$, а другое равно $3q^2$, где p и q – простые числа.
4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе AH треугольника ABC , проходящая через середину M его стороны BC , пересекает сторону AC и продолжение стороны AB в точках Z и Y соответственно. Найдите BC , если $AC = 12$, $AZ = 3$, $YZ = 4$.
5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y^2}, \\ 4x^4 + x - 5\sqrt{y} = 4y^4 - 5\sqrt{x} + y. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат 9×9 клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.
7. [6 баллов] В треугольнике ABC на медиане AM и биссектрисе CL как на диаметрах построены окружности Ω и ω соответственно, пересекающиеся в точках P и Q . Отрезок PQ параллелен высоте треугольника ABC , проведённой из вершины B . Окружность Ω пересекает сторону AC повторно в точке N . Найдите длины сторон AC и BC , если $AB = 26$, $AN = 20$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
1 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача 1

Пропустим членов арифметической прогрессии как a_1, a_2, a_3, a_4 и т.д.

Пусть шаг арифметической прогрессии b . Тогда:

т.е:

$$\begin{cases} a_5 = a_1 + 4b = 6(x+3) \\ a_7 = a_1 + 6b = (x^2 - 4x)^2 \\ a_{11} = a_1 + 10b = -3x^2 \end{cases} \quad (1) \quad \begin{aligned} a_7 - a_5 &= 2b \\ a_{11} &= a_7 + 4b = \\ &= a_7 + 2 \cdot (a_7 - a_5) \end{aligned}$$

Подставим в ур-ие (1) значения членов арифметической прогрессии через x .

$$[(x^2 - 4x)^2 - 6(x+3)] \cdot 2 + (x^2 - 4x)^2 = -3x^2$$

$$2(x^2 - 4x)^2 - 12(x+3) + (x^2 - 4x)^2 = -3x^2$$

$$3x^2(x-4)^2 + 3x^2 - 12(x+3) = 0$$

$$x^2(x-4)^2 + x^2 - 4(x+3) = 0$$

$$x^2(x^2 + 16 - 8x) + x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 + x^2 - 4x - 12 = 0 \quad (2)$$

Решим ур-ие (2):

Заметим, что $x=2$ подходит:

$$16 + 17 \cdot 4 - 64 - 8 - 12 = 16 + 68 - 84 = 0$$

→



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 & x - 2 \\ -x^4 - 2x^3 & \\ \hline -6x^3 + 17x^2 & \\ -6x^3 + 12x^2 & \\ \hline 5x^2 - 4x & \\ -5x^2 - 10x & \\ \hline -6x - 12 & \\ -6x - 12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

т.е:

$$(x-2) \cdot (x^3 - 6x^2 + 5x + 6) = 0$$

Здесь также корнем является 2:

$$2^3 - 6 \cdot 4 + 10 + 6 = 0$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 6x^2 + 5x + 6 & x - 2 \\ -x^3 - 2x^2 & \\ \hline -4x^2 + 5x & \\ -4x^2 + 8x & \\ \hline -3x + 6 & \\ -3x + 6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

т.е. Ур-ие (1) можно представить в виде:

$$(x-2)^2(x^2 - 4x - 3) = 0$$

Найдём корни ур-ия $x^2 - 4x - 3 = 0$

$$D = 4^2 + 4 \cdot 3 = 28$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{28}}{2} = 2 - \sqrt{7}$$

$$x_2 = \frac{4 + \sqrt{28}}{2} = 2 + \sqrt{7}$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



СТРАНИЦА
3 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

т.е. ур-ие (1) можно представить
в виде:

$$(x-2)^2(x-2+\sqrt{7})(x-2-\sqrt{7})=0.$$

Тогда x может равняться: $\{2\}$; $\{2-\sqrt{7}\}$;
и $\{2+\sqrt{7}\}$

Ответ: $x = \{2; 2-\sqrt{7}; 2+\sqrt{7}\}$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 3


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача 2

$$\begin{cases} |4x-3y| \leq 6 & \text{тоже самое, что } |3y-4x| \leq 6 \\ |3x-4y| \leq 8 & \text{тоже самое, что } |4y-3x| \leq 8 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} -6 \leq 3y-4x \leq 6 \\ -8 \leq 4y-3x \leq 8 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 4x-6 \leq 3y \leq 4x+6 \\ 3x-8 \leq 4y \leq 3x+8 \end{cases}$$
$$\begin{cases} \frac{4}{3}x-2 \leq y \leq \frac{4}{3}x+2 & (1) \\ \frac{3}{4}x-2 \leq y \leq \frac{3}{4}x+2 & (2) \end{cases}$$

Рассмотрим ГМТ точек, подходящих
системе из ур-ий (1) и (2), для
этого построим соответствующие
графики

(См. график на
стр. 2 (этой задачи))






На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

2 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$f_1(x) = \frac{4}{3}x + 2$$

$$f_3(x) = \frac{3}{4}x + 2$$

$$f_2(x) = \frac{4}{3}x - 2$$

$$f_4(x) = \frac{3}{4}x - 2$$

~~Точки~~ и точки удовлетворяющие
ур-ям (1) и (2) находятся
выше $f_4(x)$ и $f_2(x)$ и ниже $f_1(x)$ и $f_3(x)$.
(т.е. в области, заштрихованной красной).

Найдём координаты точек A и B:

$$\frac{3}{4}x_A - 2 = \frac{4}{3}x_A + 2$$

$$\left(-\frac{7}{12}x_A = -4 \right) ; x_A = \frac{-4 \cdot 12}{-7} = \frac{48}{7} \Rightarrow$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
3 из 3


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\Rightarrow y_A = \frac{3}{4}x_A - 2 = -\frac{48}{7} \cdot \frac{3}{4} - 2 = -\frac{36}{7} - \frac{14}{7} = -\frac{50}{7}$$

$$\frac{3}{4}x_B + 2 = \frac{4}{3}x_B - 2 \Rightarrow x_B = \frac{48}{7}; y_B = \frac{50}{7}$$

$$A: \left(-\frac{48}{7}; -\frac{50}{7}\right) \quad B: \left(\frac{48}{7}; \frac{50}{7}\right)$$

Пусть $14x + 7y = m$
 $\hookrightarrow 7y = m - 14x$
 $y = \frac{m}{7} - 2x$



т.е. вид прямой:

Пусть точка
пересечения
оси y прямой
 $y = -2x + \frac{m}{7}$

это точка M , тогда

при минимальном m
координата y_M минимальна.

y_M будет минимально, когда прямая
 $y = -2x + \frac{m}{7}$ пройдет через $T-A$

$$\Rightarrow \cancel{y_A = -2x_A} \quad y_A = -2x_A + \frac{m}{7}$$

$$-\frac{50}{7} = \frac{2 \cdot 48 + m}{7}$$

$$2 \cdot 48 + m + 50 = 0$$

$$m = -50 - 2 \cdot 48 = -146$$

Ответ: наименьшее значение выражения
 $14x + 7y$ это -146 .
в данной задаче



1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n = (m-n)^2 + 9(m-n)$$

$$B = m^2n - mn^2 + 3mn = mn(m-n+3)$$

т.к. $m \in \mathbb{N}$ и $n \in \mathbb{N}$, то $m > 0$ и $n > 0$

$p > 0$ и $q > 0$ также.

$$A = (m-n)(m-n+9)$$

$$B = mn(m-n+3)$$

Пусть $A = 13p^2 = (m-n)(m-n+9)$

т.к. p не раскладывается на множители, а

$m-n$ и $m-n+9$ разные множители, то

возможно 4 вар:

1. $\begin{cases} m-n=13 \\ m-n+9=p^2 \end{cases} \rightarrow p^2=22$ не может быть

2. $\begin{cases} m-n=p^2 \\ m-n+9=13 \end{cases} \rightarrow p^2=4 \rightarrow p=2$ Подходит

3. $\begin{cases} m-n=p \\ m-n+9=p \cdot 13 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} p+9=13p \\ 12p=9 \end{matrix}$ не может быть

4. $\begin{cases} m-n=13 \cdot p \\ m-n+9=p \end{cases} \rightarrow -12p=9$ не может быть.

$\Rightarrow$ возможен только вариант 2



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

В варианте 2 : $m-n = 4$
 $p=2$

$$\Rightarrow B = mn(4+3) = 3q^2$$

$$7m \cdot n = 3q^2$$

$$\hookrightarrow m \cdot n = \frac{3}{7}q^2 \Rightarrow \text{т.к. } m \cdot n \in \mathbb{N}, \text{ то } \frac{3}{7}q^2 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{cases} m \cdot n = 21 \\ m - n = 4 \end{cases}$$

$$(4+n) \cdot n = 21$$

$$4n^2 + 4n - 21 = 0$$

$$D = 4^2 + 4 \cdot 21 = 100$$

$$\begin{cases} \text{т.к. } n \in \mathbb{N} \\ n = \frac{4+10}{2} = 7 \end{cases}$$

$$\text{т.е. } m=11 \text{ а } n=7$$

Пусть $A = (m-n)(m-n+9) = 3q^2$
тогда тоже возможны
4 варианта :

$$1. \begin{cases} m-n=3 \\ m-n+9=q^2 \end{cases} \rightarrow q^2=12 \text{ не может быть}$$

$$2. \begin{cases} m-n=q^2 \\ m-n+9=3 \end{cases} \rightarrow q^2 < 0 \text{ не может быть}$$

$$3. \begin{cases} m-n=3q \\ m-n+9=q \end{cases} \rightarrow q > 3q \text{ не может быть т.к. } q > 0$$

$$4. \begin{cases} m-n=q \\ m-n+9=3q \end{cases} \rightarrow q = \frac{9}{2} \text{ не может быть, т.к. } q \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow A \neq 3q^2$$

Ответ: $m=11$; $n=7$ (единственный вариант)





1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача 4



По условию:
 $BM = MC$
 $AC = 12$
 $AZ = 3$
 $YZ = 4$

$$ZC = AC - AZ = 9$$

Запишем Th Менелая:

$$\frac{BY}{YA} \cdot \frac{AZ}{ZC} \cdot \frac{CM}{MB} = 1 \quad \text{где} \quad \frac{AZ}{ZC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\text{тогда} \quad \frac{BY}{YA} \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{BY}{YA} = 3 = \frac{BA + AY}{AY} = \frac{BA}{AY} + 1$$

$$\text{Значит} \quad \frac{BA}{AY} = 2$$

Запишем еще Th Менелая:

$$\frac{BC}{CM} \cdot \frac{MZ}{ZY} \cdot \frac{YA}{AB} = 1 \quad \text{где} \quad \frac{BC}{CM} = 2, \quad \frac{YA}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{MZ}{ZY} = 1 \rightarrow \frac{MZ}{ZY} = 1 \Rightarrow ZM = ZY = 4$$

По условию $AX \parallel YM$, значит $\rightarrow$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\triangle BAX \sim \triangle BYM$$

$$\Rightarrow \frac{BA}{BY} = \frac{2}{3} = \frac{AX}{YM} = \frac{BX}{BM}$$

$$\text{т.к. } YM = 8, \text{ то } AX = \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}$$

$$\text{Также заметим, что } BX = \frac{2}{6} BC$$

$$XM = \frac{1}{6} BC$$

$$MC = \frac{3}{6} BC$$

$$\text{т.к. } AX - \text{диссектриса, то } \angle BAX = \angle XAC = \alpha$$

$$\text{т.к. } AX \parallel YM, \text{ то } \angle BAX = \angle BYM = \alpha$$

$$\text{и } \angle XAC = \angle MZC = \alpha$$

$$\angle MZC = \angle YZA = \alpha \text{ как вертикальные,}$$

тогда по признаку $\text{Р/Д } \triangle^{\text{ка}}$

$$AZ = AY = 3$$

$$\text{Запишем тх cos, для } \triangle^{\text{ка}} AYZ:$$

$$3^2 + 4^2 - 2 \cdot \cos \alpha \cdot 3 \cdot 4 = 3^2$$

$$16 = 24 \cos \alpha \rightarrow \cos \alpha = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Запишем тх cos, для } \triangle^{\text{ка}} ZMC:$$

$$4^2 + 9^2 - 2 \cdot \cos \alpha \cdot 4 \cdot 9 = CM^2$$

$$16 + 81 - 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \cdot 9 = 97 - 48 = 49 = 7^2$$

$$\text{значит } CM = 7$$

$$\Rightarrow BC = \frac{CM \cdot 6}{3} = \frac{42}{3} = 14$$

$$\text{Ответ: } BC = 14.$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y^2} \quad (1)$$

$$4x^4 + x - 5\sqrt[4]{y} = 4y^4 - 5\sqrt[4]{x} + y \quad (2)$$

Рассмотрим ур-ие (2):

$$4x^4 + x + 5\sqrt[4]{x} = 4y^4 + y + 5\sqrt[4]{y}$$

Пусть $4x^4 + x + 5\sqrt[4]{x}$ это многочлен $P_1(x)$

а $4y^4 + y + 5\sqrt[4]{y}$ это многочлен $P_2(y)$

Тогда можно записать:
 $P_1(x) = P_2(y)$

Вспомним о теореме, по которой говорится, что многочлены равны, когда если в многочлене перед переменными в равных степенях соответственно стоят равные коэффициенты, то многочлены равны, т.е. в нашем случае.

$P_1(x) = P_2(y)$ т.к. коэффициенты перед переменными в равных степенях равны,

т.е. $P_1(x)$ и $P_2(y)$ это один и тот же многочлен $\Rightarrow$ они принимают равные значения в одинаковых точках и не иначе,
 $\Rightarrow x = y$.

Где у ур-ия (2) по ОДЗ $\begin{cases} y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$



1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Тогда запишем ур-ие (1):

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{5-x} + 5 = 2\sqrt{30-x-x^2}$$

ОДЗ: $\begin{cases} 5-x \geq 0 \longrightarrow x \leq 5 \\ x+6 \geq 0 \longrightarrow x \geq -6 \\ 30-x-x^2 \geq 0 \longrightarrow \end{cases}$

$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \leftarrow \text{из (2) ОДЗ.}$

$\hookrightarrow$ ОДЗ: $0 \leq x \leq 5$

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{5-x} + 5 = 2\sqrt{(x+6)(5-x)}$$

Пусть $\sqrt{x+6} = t$, тогда $t^2 = x+6$

$x = t^2 - 6$

$\sqrt{5-x} = \sqrt{5-t^2+6} = \sqrt{11-t^2}$

Тогда

$$t - \sqrt{11-t^2} + 5 = 2t\sqrt{11-t^2}$$

$$t+5 = \sqrt{11-t^2}(2t+1)$$

$$t^2 + 25 + 10t = (11-t^2)(4t^2+1+4t)$$

$$t^2 + 25 + 10t = 44t^2 + 11 + 44t - 4t^4 - t^2 - 4t^3$$

$$4t^4 + 4t^3 - 42t^2 - 34t + 14 = 0$$

$$2t^4 + 2t^3 - 21t^2 - 17t + 7 = 0$$

Пусть $\sqrt{x+6} = A$, а $\sqrt{5-x} = B$

Тогда $\begin{cases} A^2 = x+6 \\ B^2 = 5-x \\ A-B+5 = 2AB \end{cases} \longrightarrow$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

СТРАНИЦА
3 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$A^2 - B^2 = x + 6 - 5 + x = 2x + 1 = (A - B)(A + B)$$

$$(A - B) + 5 = 2AB = (A + B)^2 - A^2 - B^2$$

$$(A - B) + 5 = \left(\frac{A^2 - B^2}{A - B} \right)^2 - (A^2 + B^2)$$

$$(A - B) + 5 = \frac{(2x + 1)^2}{(A - B)^2} - (x + 6 + 5 - x)$$

$$(A - B) - \frac{(2x + 1)^2}{(A - B)^2} = -11 - 5 = -16$$

$$(A - B)^3 - (2x + 1)^2 = -16(A - B)^2$$

$$(A - B)^3 + 16(A - B)^2 - (2x + 1)^2 = 0$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



Проведем оси x и y как на рисунке (через центр квадрата, // его сторонам).

Вспомрем задачу-предыдущую Т.А., теперь отметили точки, в которые она попадает при повороте квадрата от осей x и y .

Для Т.А. будет

3 "зеркальные" ей точки

"зеркальные" точки — это точки, которые мы отметили на сетке ранее (точки A' , A'' и A''').

Кол-во вариантов квадрата Т.А. — 25 вар, (т.к. мы можем поворачивать квадрат)

Вспомрем 2ую точку В.

Если она совпадает с зеркальными точками А, то вариант её можно считать

⇒ кол-во таких вариантов один из них можно получить поворотом предыдущего

⇒ таких раскрасок $25 \cdot 2 = 50$ где один цвет мы считаем двумя*



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 из 3


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

т.е. ~~этих~~ ~~ситуаций~~


т.е. т.к.

$A'''AA''$ — это
квадрат

то отрезок AA''' переходит
при повороте в отрезок $A'A$
(т.е. т. A''' в т. A , а т. A в т. A')



Теперь рассмотрим случай, когда
т. B не совпадает с зеркальными
точками A , тогда зеркальные
точки B также не совпадают с
т. A и её зеркальными точками.



т. A ~~находится~~ или
т. B находится
на одной из осей,
что не может
быть

$\Rightarrow$ тогда вариантов $\neq$ раскрасок $\frac{1}{2}N^*$

Тогда заметим,
что расстояние
от т. B до ~~любой~~ всех
~~из~~ зеркальных
точек A ~~различно~~
~~и~~ и до т. A
различно, и ~~также~~
~~т. A находится~~ или
~~на т. B находится~~
~~на одной из осей,~~
~~что не может~~
~~быть~~





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

СТРАНИЦА
3 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

где N - это произведение вариантов
выбрать A и ~~всех точек~~ кол-во
вариантов выбрать B

(кол-во раскрасок $\frac{1}{2}N$, т.к. мы
не можем выбрать вариант A , а
только B .)

$$\Rightarrow \frac{1}{2}N = \frac{25 \cdot 96}{2} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Всего точек } 100 \\ - \text{т.А} - 3 \text{ зеркальных} \\ \text{ей точки} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{Всего раскрасок } \frac{50}{2} + \frac{25 \cdot 96}{2} =$$
$$= 25 + 1200 = 1225$$

Ответ: 1225 вар-ов.

$$(A+B)+5 = \cancel{2}(A+B) \frac{A^2+B^2}{(A-B)} (A+B) = X+6-5+X = 2X+1$$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐


СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!




$$9^2 + 4^2 - 2 \cos \alpha \cdot 9 \cdot 4 = 16^2$$

$$3^2 + 4^2 - 2 \cdot \cos \alpha$$



$$AM = 20$$
$$AB = 26$$



$$\left(\frac{h}{2} + x\right)(h+x)(h-x)h =$$
$$= \left(\frac{h}{2} + x\right)\left(\frac{h}{2} - x\right)h$$

$$0 < x$$
$$0 < h$$

$$0 = \left(\frac{h}{2} - x\right)h + (h-x) + \left(\frac{h}{2} - x\right)h$$

$$4h^2 + 4h + 4h = 4xh + 4x + 4h$$

$$h + 4xh - 4h = 4xh + 4x + 4h$$

$$(x-5) + (5-h)(5-h) + (5-h) = 0$$

$$x-5-h^2+5-h=0$$

$$x-5-h^2+5-h=0$$

$$\frac{\frac{1}{8} + \frac{1}{4} - \frac{21}{4} - \frac{17}{2}}{142 - 42 - 68 + 56} = \frac{-\frac{35}{4}}{8} = -\frac{35}{32}$$

