



МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"  
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 12



1. [3 балла] Углы выпуклого многоугольника образуют арифметическую прогрессию, имеющую разность  $2^\circ$  и начинающуюся с угла  $132^\circ$ . Какое наибольшее число вершин может быть у такого многоугольника?
2. [4 балла] Целые числа  $x, y, z$  удовлетворяют равенству  $x \ln 25 + y \ln 75 + z \ln 125 = \ln 45$ . Найдите наименьшее возможное значение выражения  $x^2 + y^2 + z^2$ .
3. [4 балла] Из множества  $M$ , состоящего из семи подряд идущих натуральных чисел, выбираются шестёрки попарно различных чисел такие, что сумма чисел в каждой из шестёрок – простое число. Пусть  $p$  и  $q$  – две из таких сумм. Найдите множество  $M$ , если  $p^2 - q^2 = 1080$ .
4. [5 баллов] Диагонали  $BD$  и  $AC$  трапеции  $ABCD$  пересекаются в точке  $M$ , а отношение оснований  $AD : BC = 1 : 2$ . Точки  $I_1$  и  $I_2$  – центры окружностей  $\omega_1$  и  $\omega_2$ , вписанных в треугольники  $BMC$  и  $AMD$  соответственно. Прямая, проходящая через точку  $M$ , пересекает  $\omega_1$  в точках  $X$  и  $Y$ , а  $\omega_2$  – в точках  $Z$  и  $W$  ( $X$  и  $Z$  находятся ближе к  $M$ ). Найдите радиус окружности  $\omega_1$ , если  $I_1 I_2 = 8$ , а  $MZ \cdot MY = 9$ .
5. [5 баллов] Что больше:  $5 - 4 \sin \frac{9\pi}{14}$  или  $3 \sin \frac{3\pi}{14} - 4 \cos \frac{3\pi}{7}$ ?
6. [4 балла] Даны 12 точек: 8 из них лежат на одной окружности в плоскости  $\alpha$ , а остальные 4 расположены вне плоскости  $\alpha$ . Известно, что если четыре точки из всех 12 лежат в одной плоскости, то эта плоскость –  $\alpha$ . Сколько существует выпуклых пирамид с вершинами в данных точках?
7. [6 баллов] Дана правильная шестиугольная пирамида  $SAB CDEF$  ( $S$  – вершина) со стороной основания 1 и боковым ребром  $\sqrt{2}$ . Точка  $X$  лежит на прямой  $SF$ , точка  $Y$  – на прямой  $AD$ , причём отрезок  $XY$  параллелен плоскости  $SAB$  (или лежит в ней). Найдите наименьшую возможную длину отрезка  $XY$ .



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  
☒

2  
☐

3  
☐

4  
☐

5  
☐

6  
☐

7  
☐

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

[1] Пусть  $a$  — арифметическая прогрессия,  $d$  — разность,  
 $n$  — число вершин многоугольника, тогда:

Сумма углов выпуклого многоугольника равна  $180(n-2)$ ,  
с другой стороны она равна сумме  $n$  членов арифметической прогрессии, то есть  $-\frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n$

Подставив вместо  $a_1$  132, вместо  $d$  2 получаем:

$$\frac{2 \cdot 132 + 2(n-1)}{2} \cdot n = 180(n-2)$$

$$(132 + n)n = 180(n-2)$$

$$n^2 + 132n = 180n - 360$$

$$n^2 - 48n + 360 = 0$$

$$(n-9)(n-40) = 0$$

Если  $n=40$ , то  $a_n = 132 + 39 \cdot 2 = 210^\circ$ , что не может быть.

Если  $n=9$ , то  $a_n = 132 + 8 \cdot 2 = 148^\circ$  — подходит.

Ответ: 9



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

|                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$12] \quad x \ln 25 + y \ln 75 + z \ln 125 = \ln 45$$

$$e^{x \ln 25 + y \ln 75 + z \ln 125} = e^{\ln 45}$$

$$25^x \cdot 75^y \cdot 125^z = 45$$

$$5^{2x} \cdot 5^{2y} \cdot 3^y \cdot 5^{3z} = 5^2 \cdot 3^2$$

$$5^{2x+2y+3z} \cdot 3^y = 5^2 \cdot 3^2$$

Поскольку  $x, y, z$  целые:  $2x+2y+3z = 2$

$$y = 2$$

$$2x+3z = -2 \Rightarrow z = \text{четное}$$

$$x = -\frac{3z+2}{2}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \left(-\frac{3z+2}{2}\right)^2 + 4 + z^2 = \frac{9z^2 + 12z + 4}{4} + 4 + z^2 = \frac{13z^2 + 12z + 20}{4}$$

Рассмотрим  $f(z) = 13z^2 + 12z + 20$  — параболу, ветви вверх

7  $z_0$  — вершина,  $z_0 = -\frac{9}{13}$

Поскольку наименьшее значение будет в ближайшем

целом  $z$  тогда, но если  $z = -1$  или  $0$ ,  $0$  не подходит

так как  $z$  — четное

$$z = -1; \quad x = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 0 + 4 + 1 = 5$$

Ответ: 5





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

|                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                                   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

СТРАНИЦА  
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

13] Пусть  $n, n+1, n+2, \dots, n+6$  — числа входящие в множество  $M$ . Сумма всех чисел равна  $7n+21$ , также найдем шестёрки, нужно исключить одно число из множества, рассмотрим все возможные шестёрки:

1) Исключим  $n$ :  $6n+21 : 3$  — некруглое

2) Исключим  $n+1$ :  $6n+20 : 2$  — некруглое

3) Исключим  $n+2$ :  $6n+19$

4)  $n+3$ :  $6n+18 : 3$  — некруглое

5)  $n+4$ :  $6n+17$

6)  $n+5$ :  $6n+16 : 2$  — некруглое

7)  $n+6$ :  $6n+15 : 3$  — некруглое

Поэтому круглыми суммами могут быть только  $6n+19, 6n+17$ .

$$p^2 - q^2 = 1080 \Rightarrow p > q \Rightarrow p = 6n+19, q = 6n+17$$

$$(6n+19)^2 - (6n+17)^2 = 1080 \quad (6n+19)^2 - (6n+17)^2 = 1080$$

$$2 \cdot (12n+36) = 1080$$

$$n+3 = 45, n = 42$$

Проверим, что такое  $n$  подходит:





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  
☐

2  
☐

3  
☒

4  
☐

5  
☐

6  
☐

7  
☐

СТРАНИЦА  
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$6n + 19 = 252 + 19 = 271 - \text{нечетное}$$

$$6n + 17 = 269 - \text{нечетное}$$


$$\text{Ответ: } M = \{42; 43; 44; 45; 46; 47; 48\}$$



1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА  
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$AD:BC = 1:2$$

$$I_1 I_2 = 8$$

$$MI_1 \cdot MI_2 = 9$$

( $r_1, r_2$  - радиусы  $\omega_1$  и  $\omega_2$ )

$r_1 = ?$

$\angle BMC = ?$

1)  $MI_2$  - биссектриса  $\angle AMD$ ,  $MI_1$  - биссектриса

$\Rightarrow I_1, MI_2$  - параллельны


$T, Q$  - точки касания

$$2) \triangle BMC \sim \triangle DMA: \frac{BM}{MD} = \frac{BC}{AD} = 2$$

$$\triangle BMI_1 \sim \triangle DMI_2: \frac{MI_1}{MI_2} = \frac{BM}{DM} = 2$$

$$\frac{MI_1}{MI_2} = 2 \quad \Rightarrow \quad MI_2 = \frac{8}{3}, \quad MI_1 = \frac{16}{3}$$

$$I_1 I_2 = 8$$



$$3) \triangle MI_1 Q \sim \triangle MI_2 T: \frac{I_1 Q}{I_2 T} = \frac{MI_1}{MI_2} = 2 \Rightarrow r_1 = 2r_2$$

$$4) \frac{MI_1}{I_1 Y} = \frac{\sin \angle YMI_1}{\sin \angle MYI_1} \quad (\text{из } \triangle MYI_1)$$

$$\angle YMI_1 = \angle WMI_2$$

$$\frac{MI_2}{I_2 W} = \frac{\sin \angle WMI_2}{\sin \angle MWI_2} \quad (\text{из } \triangle MWI_2)$$

$$\Rightarrow \sin \angle MYI_1 = \sin \angle MWI_2$$

$$\Rightarrow \angle MYI_1 = \angle MWI_2$$

$$\frac{MI_1}{I_1 Y} = \frac{2MI_2}{2I_2 W} = \frac{MI_2}{I_2 W}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА  
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$5) \angle YMI_1 = \angle WMI_2, \angle MYI_1 = \angle MWI_2 \Rightarrow \angle MI_1Y = \angle MI_2W \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \triangle MI_1Y \sim \triangle MI_2W \text{ (м.к. } \frac{MI_1}{MI_2} = \frac{I_1Y}{I_2W}) : \frac{MY}{MW} = \frac{MI_1}{MI_2} = 2$$

Аналогично из  $\triangle MI_1X$  и  $\triangle MI_2Z$ :  $\frac{MX}{MZ} = 2$   
(подобие доказано также, как и в 4) и 5))

$$6) MX \cdot MY = MQ^2 = MI_1^2 - I_1Q^2 (\triangle MI_1Q)$$

$$MZ \cdot MW = MT^2 = MI_2^2 - I_2T^2 (\triangle MI_2T)$$

$$MX \cdot MY \cdot MZ \cdot MW = (MI_1^2 - I_1^2)(MI_2^2 - I_2^2)$$

$$MX = 2MZ, MW = \frac{MY}{2} \Rightarrow MX \cdot MW = MZ \cdot MY$$

$$(MZ \cdot MY)^2 = (MI_1^2 - I_1^2)(MI_2^2 - I_2^2)$$

$$81 = \left(\frac{256}{9} - I_1^2\right)\left(\frac{64}{9} - I_2^2\right) \cdot 4$$

$$I_1^2 = 4I_2^2$$

$$4 \cdot 81 = \left(\frac{256}{9} - I_1^2\right)\left(\frac{256}{9} - I_1^2\right)$$

$$\left(\frac{256}{9} - I_1^2\right)^2 = 4 \cdot 81$$

$$\frac{256}{9} - I_1^2 = 18$$

Зем "-" так как  $MI_1 > I_1$

$$I_1^2 = \frac{256 - 162}{9}$$

$$I_1 = \frac{\sqrt{94}}{3}$$

$$\text{Ответ: } \frac{\sqrt{94}}{3}$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$5 - 4 \sin \frac{3\pi}{4} \vee 3 \sin \frac{3\pi}{4} - 4 \cos \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{Поскольку } \alpha = \frac{3\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{12} > \frac{3\pi}{14} > \frac{3\pi}{17} > \frac{\pi}{6} \quad \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{4}$$

$$5 - 4 \sin 3\alpha \vee 3 \sin^2 \alpha - 4 \cos 2\alpha$$

$$5 \vee 4(3 \sin^2 \alpha - 4 \sin^2 \alpha) + 3 \sin^2 \alpha - 4(1 - 2 \sin^2 \alpha) \quad | +4$$

$$9 \vee 15 \sin^2 \alpha - 16 \sin^3 \alpha + 8 \sin^2 \alpha$$

$$\text{Рассмотрим } f(x) = 15x - 16x^3 + 8x^2$$

$$f'(x) = 15 - 48x^2 + 16x$$

$$f'(x) \geq 0: \quad 15 - 48x^2 + 16x \geq 0$$

$$48x^2 - 16x - 15 \leq 0$$

$$-\frac{5}{12} \leq x \leq \frac{3}{4}$$

$$D = 64 + 15 \cdot 48 = 16(4 + 3 \cdot 45) =$$

$$= 16 \cdot 49 = (4 \cdot 7)^2$$

$$x = \frac{8 \pm 28}{48} = \left[ -\frac{5}{12}, \frac{3}{4} \right]$$

$$f(x) \uparrow \text{ на промежутке } \left[ -\frac{5}{12}, \frac{3}{4} \right]$$

$$\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{1}{2} < \sin \alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$- \text{уменьшаясь на } \left[ -\frac{5}{12}, \frac{3}{4} \right]$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \vee \frac{3}{4}$$

$$2\sqrt{2} \vee 3$$

$$8 < 9$$

$$\text{Значит: } f(\sin \alpha) < f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{15\sqrt{2}}{2} - \frac{16}{2\sqrt{2}} + \frac{8}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{2} + 4$$

$$\text{Поэтому } 15 \sin^2 \alpha - 16 \sin^3 \alpha + 8 \sin^2 \alpha < \frac{7\sqrt{2}}{2} + 4$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  
☐

2  
☐

3  
☐

4  
☐

5  
☒

6  
☐

7  
☐

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

График:  $\frac{7\sqrt{2}}{2} + 4 < 9$

$$\frac{7\sqrt{2}}{2} + 4 < 9$$

$$7\sqrt{2} < 10$$

$$98 < 100$$

$$\frac{7\sqrt{2}}{2} + 4 < 9 \Rightarrow 15 \sin^2 - 16 \sin^3 + 3 \sin^2 < 9$$

Значит:  $5 - 4 \sin 3\alpha > 3 \sin \alpha - 4 \cos 2\alpha$

$$5 - 4 \sin \frac{9\pi}{14} > 3 \sin \frac{3\pi}{14} - 4 \cos \frac{3\pi}{7}$$

Ответ:  $5 - 4 \sin \frac{9\pi}{14}$





1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

СТРАНИЦА  
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

[6] Из условия следует, что если у пирамиды в основании лежит многоугольник  $n$  с более чем 3 вершинами, то основание лежит в плоскости  $L$ .

1) Рассмотрим сколько пирамид составили  $L$ :

$$2^3 - 1 - 8 - \frac{3 \cdot 2}{2} = 219 - \text{каждый способ выбрать многоугольник в } L.$$

Для каждой многоугольной пирамиды 4 вершинные вершины:

$$4 \cdot 219 = 876$$

Остаток пирамид  $\frac{4 \cdot 3}{2}$  <sup>предельное</sup> с основанием, не лежащим в  $L$ .

2) Если в основании есть ровно 2 точки, то лежащие в

$$L: \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 - \text{выбрать эти две точки}$$

Для каждой пары есть 8 вариантов для третьей точки основания  $6 \cdot 8 = 48$

Для каждой тройки есть 2 точки, не лежащие в

$$L: 4 \cdot 2 = 8 \text{ Для каждой тройки есть 7 оставшихся}$$

точек из основания:  $48 \cdot 7$ , но каждый способ мы

рассчитали дважды, так как пару в основании можно

$$\text{выбрать двумя способами: } \frac{48 \cdot 7}{2} = 24 \cdot 7 = 168$$

3) Если в основании ровно 3 точки, то лежащие в  $L$ :





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

СТРАНИЦА  
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

4 способа выбрать эти 3 точки, для каждой вершины  
есть 8 точек из основания;  $8 \cdot 4 = 32$

4) Остаётся единственная пирамида, состоящая из  
4 точек, не лежащих в  $L$ .

$$876 + 168 + 32 + 1 = 876 + 200 + 1 = 1077$$

Ответ: 1077

1) Посчитаем сколько пирамид с основанием, лежащим в  $L$ :

Поскольку эти точки лежат на окружности,  
все тетраэдральные будут выпуклые.

2<sup>й</sup> способ выбрать какие-то точки,

1 - пустое множество, 8 - множество из

1 вершины,  $\frac{8 \cdot 7}{2} = 28$  - множество из 2 вершин


Так есть способ выбрать тетраэдральные в  $L$ :

$$2^3 - 1 - 8 - 28 = 219$$

Для каждого тетраэдрального 4 выпуклых вершины,  
не лежащих в  $L$ :  $4 \cdot 219 = 876$

$$\text{Итого: } 876 + 168 + 32 + 1 = 1077$$

Ответ: 1077






На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

6) 1 - оценка:  $4 \cdot (2^8 - 1 - \frac{3 \cdot 7 - 8}{2}) = 4 \cdot (256 - 1 - 8 - 28) = 4 \cdot 218$



$$540 - 36 = 504$$

$$\begin{array}{r} 504 \overline{) 12} \\ 36 \\ \underline{-24} \\ 24 \\ \underline{-24} \\ 0 \end{array}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$\sqrt{2} \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$2 \sqrt{\frac{9}{4}}$$

7)  $5 - 4 \sin \frac{3\pi}{4} \vee 3 \sin \frac{3\pi}{4} - 4 \cos \frac{3\pi}{4}$

$$\frac{3\pi}{4} = 2$$

$$5 - 4 \sin 2 \vee 3 \sin 2 - 4 \cos 2$$

$$2\sqrt{2} \quad 4 \quad \frac{3}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 0 \quad 2$$

$$\frac{\pi}{6} < 2 < \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{9} < 2 < \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} < 3 < \frac{3\pi}{4}$$

$$5 - 4 \sin 2 \vee 3 \sin 2 - 4 + 8 \sin^2 2$$

$$9 - 4 \sin 2 \vee 3 \sin 2 + 8 \sin^2 2$$

$$9 \vee 4(3 \sin 2 - 4 \sin^2 2) + 3 \sin 2 + 8 \sin^2 2$$

$$9 \vee (9 \sin 2 - 16 \sin^2 2 + 3 \sin 2)$$

$$f(\frac{1}{2}) < f(\sin 2) < f(\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\frac{15}{2} - 2 + 2 = 7,5$$

$$\frac{15\sqrt{2}}{2} - 16 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} + 4 =$$

$$= \frac{15\sqrt{2}}{2} - 4\sqrt{2} + 4 = \frac{7\sqrt{2}}{2} + 4$$

$$f(\frac{1}{2}) < f(\sin 2) < f(\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$$

$$4 + \frac{7\sqrt{2}}{2} \approx$$

$$\frac{7\sqrt{2}}{2} + 4 \vee 9$$

$$7\sqrt{2} \vee 10$$

$$98 < 100$$

$$-48(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{9}{3} + 15$$

$$x \geq \frac{1}{6} \quad f(x) \nearrow$$

$$f(x) = 15x - 16x^3 + 8x^2$$

$$f'(x) = 15 - 48x^2 + 16x =$$

$$x_0 = +\frac{1}{6}$$

$$48x^2 - 2 \quad 48(x^2 - \frac{1}{3}x)$$

$$= 48(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{36}) =$$

$$\frac{48}{36} = \frac{4}{3}$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$[5] \quad 5 - 4 \sin \frac{3\pi}{4} \vee 3 \sin \frac{3\pi}{4} - 4 \cos \frac{3\pi}{4}$$

$$\sin 2 = 3 \sin \frac{\pi}{2} - 4 \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\cos 2 = 1 - 2 \sin^2 \frac{\pi}{2}$$

$$4 \sin \frac{9\pi}{4} + 3 \sin \frac{3\pi}{4} - 4 \cos \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{4} = 2; \quad 4 \sin \frac{3\pi}{2} + 3 \sin \frac{\pi}{2} - 4 \cos \frac{\pi}{2} = 12 \sin \frac{\pi}{2} - 16 \sin^2 \frac{\pi}{2} + 3 \sin \frac{\pi}{2} -$$

$$\frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{4} > \beta = \frac{3\pi}{4} > \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$-4 + 8 \sin^2 \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} = \beta: \quad 15 \sin \beta - 16 \sin^3 \beta + 8 \sin^3 \beta - 4 = 15 \sin \beta + 8 \sin^3 \beta$$

$$= \sin \beta (15 - 8 \sin^2 \beta) + \frac{1}{2} (15 - 16 \sin^2 \beta) + \frac{7}{2}$$

$$\left( \sin \beta - \frac{1}{2} \right) (15 - 8 \sin^2 \beta) \vee \frac{3}{2}$$

$$< \frac{\sqrt{2}-1}{2} \Rightarrow 11$$


$$\frac{\sqrt{2}-1}{2} \cdot 11 \vee \frac{3}{2}$$

$$\sqrt{2}-1 \vee \frac{3}{4}$$

$$\sqrt{2} \vee \frac{14}{11}$$

$$4 \sin 3\beta + 3 \sin \beta - 4 \cos 2\beta$$

$$2\sqrt{2} \quad 4 \quad \frac{3}{2} \quad \frac{3\sqrt{2}}{2} \quad 0 \quad 2$$



$$\frac{\pi}{8} < \beta < \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{1}{2} < \sin \beta < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1}{4} < \sin^2 \beta < \frac{1}{2}$$

$$-8 < -16 \sin^2 \beta < -4$$

$$\frac{\pi}{3} < 2\beta < \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} < 3\beta < \frac{3\pi}{4}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  
☐

2  
☐

3  
☐

4  
☐

5  
☐

6  
☐

7  
☐

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

12]  $x \ln 25 + y \ln 75 + z \ln 125 = \ln 45 \quad | : \ln 5 \quad \min(x^2 + y^2 + z^2) = ?$

$$x \log_5 25 + y \log_5 75 + z \log_5 125 = \log_5 45$$

$$2x + (2 + \log_5 3)y + 3z = 1 + 2\log_5 3$$

$$2x + 2y + 2z = 1 + 2\log_5 3 - 2 - \log_5 3 \cdot y$$

$$2x + 2y + 2z = 2 + 1 + 2\log_5 3 + (1 - \log_5 3)y$$

$$\sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \geq \frac{x + y + z}{3}$$

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} \geq \frac{(x + y + z)^2}{3} =$$

$$2x + (2 + \log_5 3)y + 3z = 2(2 + \log_5 3) - 3$$

$$e^{x \ln 25} \cdot e^{y \ln 75} \cdot e^{z \ln 125} = 45$$

$$25^x \cdot 75^y \cdot 125^z = 45$$

$$5^{2x} \cdot 5^{2y} \cdot 3^y \cdot 5^{3z} = 5^2 \cdot 3^2$$

$$2x + 2y + 3y = 1$$

$$x = y = z: \quad \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} = \frac{4(1 + 2\log_5 3 - 2 - \log_5 3)}{3} \quad y = 2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{1 + 3z}{2}\right)^2 + 4 + z^2 = \frac{1 + 6z + 9z^2 + 4z^2}{4} + 4 =$$

$$p, q \Rightarrow \frac{2x}{3} = \frac{7 \cdot 6}{3} = 21 = \frac{132^2 + 62 + 12}{4} \quad z = \frac{3}{13}$$

$$z = -1, x = 1$$

$$2x + 3z = -8$$

$$x = -\frac{8 + 3z}{2}$$

13]  $p^2 - q^2 = 1080$

p, q - простые

⑥  $z = 1 \quad x = 2$

каждый из них равен 2

$$(p^2 - q^2)(p + q) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$$

S - сумма

$$h, h+1, \dots, h+6$$

$$108 = 36 \cdot 3$$

$$(S - x)^2 - (S - y)^2 = 1080$$

$$S = \frac{2h+6}{2} \cdot 7 = (h+3) \cdot 7$$

$$2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3^3$$

$$(y - x)(2S - x - y) = 1080$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА  
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Черновик

1)  $\alpha_1 = 132^\circ$

1)  $d = 2^\circ$

$n$  - число вершин

$$(n-2)180 = \frac{(\alpha_1 + \alpha_n)}{2} \cdot n = \frac{2\alpha_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$

$$(n-2)180 = (132 + n-1)n$$

$$180n - 360 = 132n + n^2 - n$$

$$n^2 - 49n + 360 = 0$$


$$D = 49^2 - 4 \cdot 360 = 49^2 - 4^2 \cdot 9^2 = 10$$

$$(n-9)(n-40) = 0$$

$$n=9, n=40$$

$\times$  н.к.  $\alpha_1 = 132 + 35 \cdot 2 = 200^\circ$

2)



$$AB = 1, SA = \sqrt{2}$$

$$X \in SF, Y \in AB \quad XV \perp (SAR)$$

$$\min(XY) = ?$$

$$\min(XY) = ?$$

$$2) d = -2$$

$$(n-2)180 = \frac{2\alpha_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$

$$(n-2)180 = (132 - n + 1)n$$

$$180n - 360 = 132n - n^2 + n$$

$$n^2 + 47n - 360 = 0$$

$$D = 47^2 + 4 \cdot 360 = 2809$$

$$= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 10^2 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  
☐2  
☐3  
☐4  
☐5  
☐6  
☐7  
☐СТРАНИЦА  
\_\_ ИЗ \_\_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$[3] \quad n, n+1, \dots, n+6$$

$$S = \frac{2n+6}{2} \cdot 7 = 7n+21$$

Число, которое не делится на  $n$  —  $6n+21 : 3$  X

$$2) n+1 \quad 6n+20 : 2 \quad X$$

$$3) n+2 \quad 6n+19 = p \quad \checkmark$$

$$3) n+3 \quad 6n+18 : 3 \quad X$$

$$4) n+4 \quad 6n+17 = q \quad \checkmark$$

$$5) n+5 \quad 6n+16 : 2 \quad X$$

$$6) n+6 \quad 6n+15 : 3 \quad X$$

$$p = 6n+19, \quad q = 6n+17$$

$$p^2 - q^2 = 1080$$

$$6n+19 = 252+19 = 271$$

$$(p-q)(p+q) = 1080$$

$$6n+17 = 252+17 = 269$$

$$2 \cdot (p+12n+36) = 1080$$

$$12n+36 = 540$$

$$n+3 = \frac{540}{12} = \frac{90}{2} = 45$$

$$n = 42$$

$$M = \{42, 43, \dots, 48\}$$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

14



$$AD, BC = r_2$$

$$I_1 I_2 = 8$$

$$M_2 M_4 = 9$$

$$r_1 = ?$$

$$\frac{r_1}{r_2} = 2 \text{ (из подобия)}$$

$$\triangle B I_1 M \sim \triangle D I_2 M. \quad \frac{M I_1}{M I_2} = \frac{B M}{D M} = 2$$

$$\frac{I_1 Y}{\sin \alpha} = \frac{M Y}{\sin \alpha}$$


$$M I_1 = \frac{86}{3}$$

$$M I_2 = \frac{8}{3}$$

$$\frac{M I_1}{I_1 Y} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$$

$$\frac{M I_2}{I_2 W} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$$

$$\frac{M X}{M_2} = d \quad \frac{M Y}{M W} = \frac{4}{d}$$



$$\frac{M T}{M A} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{M Y}{M W} = 2$$

$$\frac{M X}{M_2} = 2$$

$$M_2 \cdot M W - M X \cdot M Y = \left(\frac{16}{3} - r_2\right) \left(\frac{16}{3} + r_2\right) \left(\frac{8}{3} - r_2\right) \left(\frac{8}{3} + r_2\right)$$

$$M_2 \cdot M W = M I_2^2 - r_2^2$$

$$M X = 2 M_2, M W = \frac{M Y}{2} \Rightarrow M X \cdot M W = M_2 \cdot M Y$$

$$M X \cdot M Y = M I_1^2 - r_1^2$$

$$256 + 128 = 256 - 162 = 94$$

$$M X \cdot M Y = 4 M_2 \cdot M W$$

$$(M_2 \cdot M Y)^2 = \left(\frac{256}{9} - r_1^2\right) \left(\frac{64}{9} - r_2^2\right)$$

$$81 = \left(\frac{256}{9} - 4 r_2^2\right) \left(\frac{64}{9} - r_2^2\right)$$

$$81 = 4 \left(\frac{64}{9} - r_2^2\right)^2$$

$$4 \cdot 9^2 t^2 - 512 t + 128 = 0$$

$$r_2^2 = 6$$

$$81 = \left(\frac{256}{9} - 4t\right) \left(\frac{64}{9} - t\right)$$

$$81 = \frac{(16-8t)^2}{9^2} - \frac{256t}{9} + 4t^2 \cdot 9$$

$$\frac{64}{9} - r_2^2 = \pm \frac{9}{2}$$

$$1) r_2^2 = \frac{64}{9} - \frac{9}{2} = \frac{128 - 81}{18} = \frac{47}{18}$$

$$4 r_2^2 = \frac{2 \cdot 47}{9} \quad r_1 = \frac{\sqrt{94}}{3}$$

$$4 \cdot 9^2 t^2 - 512 t + 128 = 0$$

$$2) r_2^2 = \frac{64}{9} + \frac{9}{2} = \frac{205}{18} \quad r_1 = \frac{\sqrt{410}}{3}$$