



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 3



- √ 1. [3 балла] Найдите все действительные значения x , при каждом из которых существует геометрическая прогрессия, состоящая из действительных чисел и такая, что её десятый член равен $\sqrt{(25x + 34)(3x + 2)}$, двенадцатый член равен $2 - x$, а восемнадцатый член равен $\sqrt{\frac{25x + 34}{(3x + 2)^3}}$.

- ± √ 2. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} - \sqrt{3-x-2z} + 7 = 2\sqrt{y-3x-x^2+z}, \\ |y+2| + 2|y-18| = \sqrt{400-z^2}. \end{cases}$$

- √ 3. [5 баллов] Найдите все значения параметра p , при которых уравнение

$$p \cos 3x + 6 \cos 2x + 3(p+4) \cos x + 10 = 0$$

имеет хотя бы одно решение. Решите это уравнение при всех таких p .

4. [5 баллов] Две окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B , а их общая касательная имеет с ω_1 и ω_2 общие точки C и D соответственно, причём точка B расположена ближе к прямой CD , чем точка A . Луч CB пересекает ω_2 в точках B и E . Найдите отношение $ED : CD$, если диагональ AD четырёхугольника $ACDE$ делит отрезок CE в отношении $7 : 20$, считая от вершины C .

- √ 5. [4 балла] Дан клетчатый прямоугольник 500×120 . Сколькими способами можно закрасить 8 клеток этого прямоугольника так, чтобы закрашенное множество обладало хотя бы одной из следующих симметрий: относительно центра прямоугольника, относительно любой из двух "средних линий" прямоугольника ("средней линией" прямоугольника назовём отрезок, соединяющий середины двух его противоположных сторон). Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).

- √ 6. [4 балла] Найдите все тройки целых чисел $(a; b; c)$ такие, что:

- $a < b$,
- число $b - a$ не кратно 3,
- число $(a - c)(b - c)$ является квадратом некоторого простого числа,
- выполняется равенство $a^2 + b = 1000$.

7. [6 баллов] В основании призмы лежит равносторонний треугольник площади 4. Площади её боковых граней равны 6, 6 и 5. Найдите объём призмы.



1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a_{10} = \sqrt{(25x+34)(3x+2)}$$

$$a_{12} = 2-x$$

$$a_{13} = \sqrt{\frac{(25x+34)}{(3x+2)^3}}$$

$$a_1 b^{47} = (a_1 b^{17})(a_1 b^{27})$$

$$(a_1 b^{17})^4 = (a_1 b^{17})(a_1 b^9)^3$$

$$a_{12}^4 = a_{13} a_{10}^3$$

$$(2-x)^4 = \sqrt{\frac{(25x+34)(25x+34)^3(3x+2)^3}{(3x+2)^3}}$$

$$\text{ОДЗ: } x \neq -\frac{2}{3}$$

$$(2-x)^4 = (25x+34)^2$$

$$\sqrt{25x+34} = (2-x)^2$$

$$1. x \geq -\frac{34}{25}$$

$$2. x < -\frac{34}{25}$$

$$25x+34 = 4-4x+x^2$$

$$-25x+34 = 4-4x+x^2$$

$$x^2 - 29x - 30 = 0$$

$$x^2 + 21x + 38 = 0$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ x = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = -19 \end{cases}$$

Ответ: -19; -2; -1; 30



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



СТРАНИЦА

1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} - \sqrt{3-x-2z} + 7 = 2\sqrt{y-3x-x^2+z} & (1) \\ |y+2| + 2|y-18| = \sqrt{400-z^2} & (2) \end{cases}$$

$$(2) 0 \leq \sqrt{400-z^2} \leq 20 \Rightarrow 0 \leq |y+2| + 2|y-18| \leq 20$$

Решим кер-во:

$$|y+2| + 2|y-18| \leq 20$$

$$y \geq 18:$$

$$3y+2-36 \leq 20$$

$$y \leq 18$$

$$y = 18$$

$$-2 \leq y < 18:$$

$$-y+2+36 \leq 20$$

$$-y \leq -18$$

$$y \geq 18$$

$$y \leq -2$$

$$-3y-2+36 \leq 20$$

$$-3y \leq -14$$

$$y \geq \frac{14}{3}$$

$$\text{тогда } y = 18 \text{ и } \sqrt{400-z^2} = 20+0=20$$

$$\sqrt{400-z^2} = 20 \Rightarrow z = 0$$

(1) Подставим $y = 18, z = 0$

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{3-x} + 7 = 2\sqrt{18-3x-x^2}$$

$$\text{обз. } x \in [-6; 3]$$

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{3-x} + 7 = 2\sqrt{(x+6)(3-x)} - 7$$

$$0 \leq \sqrt{x+6} \leq 3$$

$$0 \leq \sqrt{3-x} \leq 3$$

$$-3 \leq \sqrt{3-x} \leq 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x+6} - \sqrt{3-x} \leq 3 \Rightarrow \sqrt{x+6} + \sqrt{3-x} + 7 \geq 4$$

из данного ур-я находим, что $x = -\frac{3}{2}$

⇒ Ответ: $(-\frac{3}{2}; 18; 0)$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА

2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

если $p < 0$:

$$\begin{cases} \sqrt[3]{p-1} + 1 \leq 1 \\ (\sqrt[3]{p-1} + 1) \geq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[3]{p-1} \leq 0 \\ \sqrt[3]{p-1} \leq -2 \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[3]{p-1} \leq -2 \\ p-1 \leq -8 \\ p \leq -7 \end{cases}$$

Ответ: при $p \in (-\infty; -7] \cup [1; +\infty)$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$p \cos 3x + 6 \cos 2x + 3(p+4) \cos x + 10 = 0$$

$$p(4 \cos^3 x - 3 \cos x) + 6(2 \cos^2 x - 1) + 3p \cos x + 12 \cos x + 10 = 0$$

Положим $t = \cos x, t \in [-1; 1]$

$$4pt^3 - 3pt + 12t^2 - 6 + 3pt + 12t + 10 = 0 \quad / : 4$$

$$pt^3 + 3t^2 + 3t + 1 = 0$$

$$(t+1)^3 + (p-1)t^3 = 0$$

$$(t+1 + \sqrt[3]{p-1} \cdot t)(t^2 + 2t + 1 + t(t+1)\sqrt[3]{p-1} + t^2\sqrt[3]{(p-1)^2}) = 0$$

~~если $p=1$, то есть корень $t=-1$~~

~~если $p \neq 1$, то~~

$$t = \frac{-1}{\sqrt[3]{p-1} + 1} \quad (1)$$

$$t^2(1 + \sqrt[3]{p-1} + \sqrt[3]{(p-1)^2}) + t(2 + \sqrt[3]{p-1}) + 1 = 0 \quad (2)$$

$$(2) \quad 0 = 4 + 4\sqrt[3]{p-1} + \sqrt[3]{(p-1)^2} - 4 - 4\sqrt[3]{p-1} - 4\sqrt[3]{(p-1)^2} =$$

$$= -3\sqrt[3]{(p-1)^2} \Rightarrow \text{реш-е есть при } \sqrt[3]{(p-1)^2} \leq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{при } p=1$$

(3) реш-е есть при

$$-1 \leq \frac{+1}{\sqrt[3]{p-1} + 1} \leq 1 \quad \cancel{\frac{1}{\sqrt[3]{p-1} + 1}}$$

~~$\sqrt[3]{p-1}$~~ если $p > 0$

$$\begin{cases} \sqrt[3]{p-1} \geq 0 \\ \sqrt[3]{p-1} \geq -2 \end{cases}$$

$$\sqrt[3]{p-1} \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{при } p \geq 1$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt[3]{p-1} + 1} \leq 1 \\ \frac{1}{\sqrt[3]{p-1} + 1} \geq -1 \end{cases}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Тогда общее кол-во мучав:

$$3 \cdot C_{(250-120)}^4 - 2 \cdot C_{(250-60)}^2$$

III мучав были 2 раза, т.к. конфигурация может повторяться ~~один~~ при симметрии откос. верт. и гориз. ср. линии.

$$\text{Ответ: } 3 \cdot C_{(250-120)}^4 - 2 \cdot C_{(250-60)}^2$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

1. Поделим прямоугольник на 4 равные части по средним линиям.

2. Тогда чтобы посчитать кол-во способов, нужно

I. кол-во способов относ. горизонтальной ср. линии

$$\frac{500 \cdot 120}{2} \quad C_{\frac{500 \cdot 120}{2}}^4 = C_{250 \cdot 120}^4$$

аналогично для вертикальной: $C_{250 \cdot 120}^4$

II. относительно центра:

$C_{\frac{500 \cdot 120}{2}}^4 = C_{250 \cdot 120}^4$ (Можно отмечать точки в только в одной половине и тогда ^{каждая} ~~каждая~~ одна точка симметричная им же будет во второй половине), аналогично для I случая)

III кол-во случаев, когда симметрия относительно обеих сред. линий: будем выбирать 2 точки в

каждо одной четверти и отмечать симметричные им относ. одной ср. линии, а потом другой кол-во случаев: $C_{250 \cdot 60}^2$

Заметим, что в этом случае такая выполняется центра симметрия относительно центра

Доказ-во: для точки $(x; y)$, $x \leq 250, y \leq 60$

отражаем относ. верт. ср. линии: точка ~~A₁~~ $A_1(500-x; y)$

относ. гориз. ср. линии: $A_2(500-x; 250-y) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ выполняется симметрия относ. центра



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$(a; b; c), a, b, c \in \mathbb{Z}$$

Условия:

1. $a < b$
2. $(b-a) \times 3$
3. $(a-c)(b-c) = k^2$, k - простое
4. $a^2 + b = 1000$

1) из 3 ус. и т.к. $a, b, c \in \mathbb{Z}$, есть несколько исходов

I. $\begin{cases} a-c=k \\ b-c=k \end{cases} \Rightarrow b-a=0$, но из 1 ус. $b-a > 0 \nmid$

II. $\begin{cases} a-c=-k \\ b-c=-k \end{cases} \Rightarrow b-a=0$, но из 1 ус. $b-a > 0 \nmid$

III. $\begin{cases} a-c=k^2 \\ b-c=1 \end{cases} \Rightarrow b-a=1-k^2$, но из 1 ус. $b-a > 0$, а $1-k^2 < 0$, т.к. $k > 1 \nmid$

IV. $\begin{cases} a-c=k^2-1 \\ b-c=-k^2 \end{cases} \Rightarrow b-a=1-k^2$, но из 1 ус. $b-a > 0$, а $1-k^2 < 0$, т.к. $k > 1 \nmid$

~~IV~~ V. $\begin{cases} a-c=1 \\ b-c=k^2 \end{cases} \Rightarrow b-a=k^2-1$. Заметим, что если $k \geq 1$, то $k^2-1 \geq 0 \Rightarrow k=3 \Rightarrow$
 $k \geq 2$, то $k^2-1 \geq 0 \Rightarrow k=3 \Rightarrow$

$$\Rightarrow b = a + 8$$

из 4 ус. $a^2 + a + 8 = 1000$

$$a^2 + a - 992 = 0$$

$$D = 3969 + 4 \cdot 992 = 3969 \Rightarrow \begin{cases} a = 31 \\ a = -32 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ подходит 2 пары тройки $(a; b; c)$: $(31; 39; 30)$
 $(-32; -24; -33)$

VI. $\begin{cases} a-c=-k^2 \\ b-c=-1 \end{cases} \Rightarrow b-a=k^2-1$, аналогично II случаю $k=3$

и тогда $\begin{cases} a \geq 31 \\ a = -32 \end{cases}$ и тройки чисел: $(31; 39; 38)$ и $(-32; -24; -25)$

Ответ: $(31; 39; 30), (-32; -24; -33), (31; 39; 38), (-32; -24; -25)$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



Дано:

$$S_{A_1C_1CA} = S_{C_1EVB_1} = 6$$

$$S_{AA_1B_1B} = 5$$

$$S_{ABE} = 4$$

$$V_{ABCA_1B_1C_1} = ?$$

Решение:

1) Заметим, что т.к. $S_{A_1C_1CA} = S_{C_1EVB_1}$, $\checkmark$ эк. $ABCA_1B_1C_1$ - призма, то C, M, K лежат на одной прямой, $MM \perp AB$

(M - сер. AB , K - сер. A_1B_1 , $KM \perp (ABE)$), $B_1B \perp AB$, $AA_1 \perp AB$
 $\Rightarrow A_1ABB_1$ - призм, $AA_1 = BB_1 = KM = \frac{5}{2}$

2) ABE :

$$S_{ABE} = \frac{AB^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \Rightarrow AB^2 = \frac{4 \cdot S_{ABE}}{\sqrt{3}} = \frac{4 \cdot 4}{\sqrt{3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AB^2 = \frac{16}{\sqrt{3}} \Rightarrow AB = \frac{16}{\sqrt{3}} \Rightarrow AA_1 = BB_1 = KM = \frac{5\sqrt{3}}{16}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№5.

Относ. центра: $\frac{500 \cdot 120!!}{2 \cdot 500 \cdot 120}$

$n!! = n(n-2)(n-4) \dots (n-2k), k \in \mathbb{Z}, n-2k > 0$

$n(n-2)(n-4) \dots$ 2 для четных чисел.

Относ. в центре $500 \cdot 120!!$ $\frac{500 \cdot 120!!}{250 \cdot 120!!} (250 \cdot 150)!$

Относ. и центра и ср. линии


$\frac{(25 \cdot 120)!}{15}$

в центр: $\frac{500 \cdot 120}{2} \cdot \frac{500 \cdot 120 \cdot (500 \cdot 120 - 2) \dots (500 \cdot 120 - 6)}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$

$500 \cdot 120 \cdot (500 \cdot 120 - 2) \dots (500 \cdot 120 - 6)$

$\frac{(500 \cdot 120)!}{8(500 \cdot 120 - 8)!} \cdot \frac{(500 \cdot 120 - 7) \dots (500 \cdot 120)}{8!}$

$500 \cdot 12$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

1. Относительно центра. Будем ^{красить} ставить 1 произвольную точку и сразу же одну симметричную ей относ. центра
Тогда способов:

$$\frac{500 \cdot 120}{2} + \frac{500 \cdot 120 - 2}{2} + \frac{500 \cdot 120 - 4}{2} + \frac{(500 \cdot 120 - 6)}{2} =$$
$$= \frac{(500 \cdot 120)!!}{16 C_{(500 \cdot 120)}^4 (500 \cdot 120 - 8)!!}$$

для четных $n!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n$

2. Относительно сред. линии. Будем красить 4 произвольные ~~клетки~~ по одну сторону от ср. линии и сразу отмечать симметричные им относительно ср. линии, тогда всего способов (учитывая, что есть 2 сред. линии)



1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$t = \frac{-1}{\sqrt[3]{p-1}}$$

$$t^3 + 2 + 1 + t(t^2 + t)\sqrt[3]{p-1} + t^2\sqrt[3]{p-1}^2 = 0$$

$$p > 1$$

$$t^2(t + \sqrt[3]{p-1} + \sqrt[3]{p-1}^2) + t(2 + \sqrt[3]{p-1}) + 1 = 0$$

$$D = 4 + 4\sqrt[3]{p-1} + \sqrt[3]{p-1}^2 - 4 - 4\sqrt[3]{p-1} - 4\sqrt[3]{p-1}^2 =$$

$$= -3\sqrt[3]{p-1}^2 \Rightarrow \sqrt[3]{p-1}^2 \leq 0 \Rightarrow p$$

$$(a, b, c) \in \mathbb{Z}$$

$$1. a < b$$

$$2. (b-a) \neq 3$$

$$3. (a-c)(b-c) = k^2, k - \text{натуральное}$$

$$4. a^2 + b = 1000$$

$$\begin{cases} a-c=1 \\ b-c=1 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} a-c=1 \\ b-c=k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a-c=1 \\ b-a=k-1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b-a=k-1 \\ a-c=1 \\ b-c=k \end{cases} \Rightarrow$$

$$t.k. b > a, \text{ то } b-a = k-1$$

$$t.k. 1-k < 0 \Rightarrow a > b$$

$$999 \text{ делится на } 1 \dots 3$$

$$b^2 = (k-1+a)^2 \quad a = b-k+1 \quad a = c+1$$

$$b = c+k$$

$$(k-1)(k-1+a)^2 + b-k+1 =$$

$$c^2 + 2ke + k^2 + c^2 + 1 = 1000$$

$$(c+k)^2 + c+1 = 1000$$

$$(c+k)^2 + c = 999$$

$$k^2 + 2ke + c^2 + c + 999 = 0$$

$$D = c^2 - c^2 - c + 999 = -c + 999$$

$$k = \frac{-2c \pm \sqrt{999-c}}{2}$$

$$k =$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$x+6-3-x+4+14\sqrt{x+6}$$

$$\sqrt{\frac{8}{2}} - \sqrt{\frac{5}{2}} + 7 =$$

↑



$$\sqrt{x+6} + \sqrt{3-x} + 7 = 2\sqrt{\quad}$$

-1.5 7





$$x = -\frac{3}{2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}} + \frac{1}{2\sqrt{3-x}} = \frac{\sqrt{3-x} + \sqrt{x+6}}{2\sqrt{3-x}\sqrt{x+6}}$$

$$g'(x) = \frac{-2x-3}{2\sqrt{3-x}\sqrt{x+6}}$$

$$4 \leq a \leq 4$$
$$0 \leq b \leq 7$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} + \sqrt{3-x-22} + 7 = 2\sqrt{y-3x-x^2+2} \\ |y+2| + 2|y-18| = \sqrt{400-2^2} \end{cases}$$

1) ОДЗ: $x \geq -6$
 $2 \in [-20, 20]$

если $x \uparrow$, то $\sqrt{x+6} \uparrow$
 $-\sqrt{3-x-22} \uparrow$
если $2 \uparrow$, то $\sqrt{3-x-22} \uparrow$
 $\Rightarrow \begin{cases} x = -6 \\ 2 \in [-20, 20] \end{cases}$

$$\sqrt{x+6} \geq 0$$

$$\sqrt{3-x-22} \leq \sqrt{3+6+40} = 7 \Rightarrow -\sqrt{3-x-22} \geq -7$$

$$\Rightarrow \sqrt{x+6} - \sqrt{3-x-22} + 7 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x+6} + \sqrt{3-x-22} + 7 \geq 0$$

то $\sqrt{x+6} + \sqrt{3-x-22} + 7 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -6 \\ 2 = -20 \end{cases}$

$$2\sqrt{y+18} - 400$$

$$2\sqrt{y+18} - 36 + 20 = 0$$

$$2\sqrt{y-38} = 0 \Rightarrow y = 38$$

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{3-x-22} + 7 = 0$$

$$2\sqrt{y-3x-x^2+2} = 0$$

$$|y+2| + 2|y-18| = \sqrt{400-2^2}$$

$$|t+2| + 2|t-20| = \sqrt{400-2^2}$$

$$(x+6)(3-x-22) = 3x - x^2 - 22x + 18 - 6x - 122 =$$

$$|y+2| + 2|y-18| \leq 20$$

$$y \geq 18: 3y \leq 18 \Rightarrow y = 18$$

$$-25 \leq y \leq 18: -y \leq -18 \Rightarrow y \geq 18 \text{ реш. нет.}$$

$$y \leq -2: -2y \leq -14$$

$$y \geq \frac{14}{2} \Rightarrow \text{реш. нет.} \Rightarrow y = 18$$

$$= y - 3x - x^2 + 2 - 132 - 22x + 18 - y$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№ 2)

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{3-x-22} + 7 = 2\sqrt{y-3x-x^2+2}$$

$$|y+2| + 2|y-18| = \sqrt{400-2^2}$$

ОДЗ: $x \geq -6$
 $2 \in [-20; 20]$

$$y = 18$$

$$y+2+2y-36 = \sqrt{400-2^2}$$

$$3y-34 = \sqrt{400-2^2}$$

$$|y+2| + |2y-36| \leq 20$$

$$|y+2| + 2|y-18| = 20$$

$$3y-34=20$$

$$y=18$$

$$\begin{cases} y=18 \\ y= \end{cases}$$

$$\frac{3-6}{2} = -1,5$$

$$x^2+3x-18=0$$

$$(x+6)(x-3)=0$$

$$p \cos 3x + 6 \cos 2x + 3(p+4) \cos x + 10 \cos(x) \neq 0$$

$$x+6 = -x+3$$

$$2x = -3$$

$$x = -1,5$$

$$\begin{cases} e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \\ e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi \end{cases}$$

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$$

$$\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$


pe

$$pe^{3xi} + pe^{-3xi} + 6e^{2xi} + 6e^{-2xi} + 3(p+4)e^{xi} + 3(p+4)e^{-xi} + 10 = 0$$

$$18 - 4,5 - 2,25 = 11,25 = \frac{45}{4}$$

$$\sqrt{x+6} \geq 0$$

$$-\sqrt{3-x-22} \geq 3$$



$$14,5 - 2,25 = 12,25 = \frac{49}{4}$$

$$\sqrt{3-x-22} \geq 0$$

$$-\sqrt{3-x-22} \geq 3$$

$$18 - 4,5 - 2,25 = 11,25 = \frac{45}{4}$$

$$\sqrt{3-x-22} \geq 0 \Rightarrow x = 43$$

$$10 \geq 0$$

$$2\sqrt{45} + 7 = \frac{6\sqrt{5}}{\sqrt{2}} + 7 \approx 3,5$$


$$y+2-2y+36=20$$

$$y=18$$

$$-y-2-2y+36=20$$

$$-3y=14$$

$$y=-\frac{14}{3}$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

1. ~~a, b~~ $a, b^9 = \sqrt{(25x+34)(3x+2)}$

$$a, b'' = 2-x$$

$$a, b^{17} = \sqrt{\frac{25x+34}{(3x+2)^3}}$$

~~a, b~~ $b^{22} = \frac{(2-x)}{\sqrt{(25x+34)(3x+2)}}$

~~b~~ $b^8 = \sqrt{\frac{1}{(3x+2)^4}}$

$$b^8 = \frac{1}{(3x+2)^2}$$

~~a, b~~

$$a, b^{44} = (a, b^{17})(a, b^{27})$$

$$(2-x)^4 = \sqrt{\frac{(25x+34)(25x+34)^2(3x+2)^3}{(3x+2)^2}}$$

$$x \neq -\frac{2}{3}$$

$$(2-x)^4 = (25x+34)^2$$

$$\sqrt{25x+34} = (2-x)^2$$

$$x < -\frac{34}{25}$$

$$x \geq -\frac{34}{25}:$$

$$-25x-34 = 4-4x+x^2$$

$$25x+34 = 4-4x+x^2$$

$$x^2+21x+38=0$$

$$x^2-29x+30=0$$

$$D=441-152=289$$

$$(x+1)(x-30)=0$$

$$\begin{cases} x = \frac{-21+17}{2} = -2 \\ x = \frac{-21-17}{2} = -19 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ x = 30 \end{cases}$$

Ответ: -19; -2; -1; 30



1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$pe^{6xi} + 6e^{5xi} + 3(p+4)e^{4xi} + 10e^{3xi} + 3(p+4)e^{2xi} + 6e^{xi} + p = 0$$

Пусть $t = e^{xi}$, $\frac{t+t^{-1}}{2} \in [-1; 1]$ ~~$\frac{t-t^{-1}}{2} \in [-1; 1]$~~

$$pt^6 + 6t^5 + 3(p+4)t^4 + 10t^3 + 3(p+4)t^2 + 6t + p = 0$$

если $t=0$, ~~тогда~~ то реш. есть при $p=0$

если $t \neq 0$:

$$pt^3 + \frac{p}{t^3} + 6t^3 + \frac{6}{t^2} + 3(p+4)\left(t + \frac{1}{t}\right) + 10 = 0$$

$$a = t + \frac{1}{t} \quad a^2 - 2 = t^2 + \frac{1}{t^2} \quad a^3 = t^3 + 3t + 3\frac{1}{t} + \frac{1}{t^3} \Rightarrow$$

$$a \in [-2; 2] \quad \Rightarrow t^3 + \frac{1}{t^3} = a^3 - 3a$$

$$p(a^3 - 3a) + 6(a^2 - 2) + 3(p+4)a + 10 = 0$$


$$pa^3 - 3pa + 6a^2 - 12 + 3pa + 12a + 10 = 0$$

$$pa^3 + 6a^2 + 12a - 2 = 0$$

$$\begin{aligned} & -8 + 24 - 12 = \\ & 8 + 24 - 12 = \end{aligned}$$

$$a^2(p+6) + 2x \quad f(x) = pa^3 + 6a^2 + 12a - 2$$

$$f'(x) = 3pa^2 + 12a + 12 = 3(pa^2 + 4a + 4) = 3(a+2)^2$$



$$\begin{aligned} & a^3 + 6a^2 + 12a - 2 = \\ & (a+2)^3 - 10 \\ & a^2 \end{aligned}$$