



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 11



1. [3 балла] Углы выпуклого многоугольника образуют арифметическую прогрессию, имеющую разность 2° и начинающуюся с угла 143° . Какое наибольшее число вершин может быть у такого многоугольника?
2. [4 балла] Целые числа x, y, z удовлетворяют равенству $x \ln 16 + y \ln 8 + z \ln 24 = \ln 6$. Найдите наименьшее возможное значение выражения $x^2 + y^2 + z^2$.
3. [4 балла] Из множества M , состоящего из семи подряд идущих натуральных чисел, выбираются шестёрки попарно различных чисел такие, что сумма чисел в каждой из шестёрок – простое число. Пусть p и q – две из таких сумм. Найдите множество M , если $p^2 - q^2 = 792$.
4. [5 баллов] Диагонали BD и AC трапеции $ABCD$ пересекаются в точке M , а отношение оснований $AD : BC = 1 : 2$. Точки I_1 и I_2 – центры окружностей ω_1 и ω_2 , вписанных в треугольники BMC и AMD соответственно. Прямая, проходящая через точку M , пересекает ω_1 в точках X и Y , а ω_2 – в точках Z и W (X и Z находятся ближе к M). Найдите радиус окружности ω_1 , если $I_1I_2 = 13/2$, а $MZ \cdot MY = 5$.
5. [5 баллов] Что больше: $5 - 4 \sin \frac{3\pi}{14}$ или $4 \cos \frac{\pi}{7} - 5 \sin \frac{\pi}{14}$?
6. [4 балла] Даны 12 точек: 7 из них лежат на одной окружности в плоскости α , а остальные 5 расположены вне плоскости α . Известно, что если четыре точки из всех 12 лежат в одной плоскости, то эта плоскость – α . Сколько существует выпуклых пирамид с вершинами в данных точках?
7. [6 баллов] Дана правильная шестиугольная пирамида $SABCDEF$ (S – вершина) со стороной основания 2 и боковым ребром 4. Точка X лежит на прямой SF , точка Y – на прямой AD , причём отрезок XY параллелен плоскости SAB (или лежит в ней). Найдите наименьшую возможную длину отрезка XY .




1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Пусть исходный многоугольник имеет n вершин.
Выберем одну из вершин и проведем отрезки ко всем другим вершинам.
Тогда образуется $n-2$ треугольников.
Сумма их углов $180^\circ(n-2)$ равна сумме углов исходного многоугольника.



$\Rightarrow$ Сумма углов многоугольника: $180^\circ(n-2)$

Найдем сумму углов при помощи арифметической прогрессии:

1) Если арифметическая прогрессия — возрастающая:

Углы: $143^\circ, 143^\circ+2^\circ, \dots, 143^\circ+2^\circ(n-1)$

Их сумма: $\frac{143^\circ + (143^\circ + 2^\circ(n-1))}{2} \cdot n = (142^\circ + n) \cdot n$

Суммы углов равны

$$\Rightarrow 180(n-2) = (142+n) \cdot n$$

$$180n - 360 = 142n + n^2$$

$$n^2 - 38n + 360 = 0 \quad D = 38^2 - 4 \cdot 360 = 4(19^2 - 360) = 4(361 - 360) = 4$$

$\Rightarrow n_1 =$

$$\Rightarrow n_1 = \frac{38 + \sqrt{4}}{2} = 19 + 1 = 20, \quad n_2 = \frac{38 - \sqrt{4}}{2} = 19 - 1 = 18$$

2) Если арифметическая прогрессия — убывающая:

Углы: $143^\circ, 143^\circ-2^\circ, \dots, 143^\circ-2^\circ(n-1)$

Их сумма: $\frac{143^\circ + (143^\circ - 2^\circ(n-1))}{2} \cdot n = (144^\circ - n) \cdot n$

Суммы углов равны

$$\Rightarrow 180(n-2) = (144-n) \cdot n$$

$$180n - 360 = 144n - n^2$$

$$n^2 + 36n - 360 = 0 \quad D = 36^2 + 4 \cdot 360 = 36(36 + 40) = 36 \cdot 4 \cdot 19$$

$$n_1 = \frac{-36 + \sqrt{36 \cdot 4 \cdot 19}}{2} = -18 + 6\sqrt{19}, \quad n_2 = \frac{-36 - \sqrt{36 \cdot 4 \cdot 19}}{2} = -18 - 6\sqrt{19}$$

Оба решения не подходят т.к. n должно быть

натуральным числом



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Известно, что многоугольник выпуклый

$\Rightarrow$ во любой угол не может быть больше 180°

Значит $143 + 2(n-1) \leq 179$

$$2(n-1) \leq 36$$

$$(n-1) \leq 18$$

$$\cancel{n-17} \quad n \leq 19$$

$\Rightarrow$ ~~Не существует подходящего многоугольника~~

$\Rightarrow n=20$ не подходит

Наибольшее число вершин — 18

Ответ: 18



1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$x \cdot \ln 16 + y \ln 8 + z \ln 24 = \ln 6$$

$$x \cdot \ln 2^4 + y \ln 2^3 + z \ln (6 \cdot 2^2) = \ln 6$$

$$4x \cdot \ln 2 + 3y \ln 2 + 2z \ln 2 + z \ln 6 = \ln 6$$

$$\ln 2 (4x + 3y + 2z) + z \cdot \ln 6 = \ln 6, \quad x, y, z \text{ — целые}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x + 3y + 2z = 0 \\ z \cdot \ln 6 = \ln 6 \Rightarrow z = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4x + 3y + 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{-2(2x+1)}{3}$$

$$\text{Найти } x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + \frac{4}{9}(2x+1)^2 + 1 = \frac{9x^2 + 4(4x^2 + 4x + 1) + 9}{9} = \frac{25x^2 + 16x + 13}{9}$$

$$\text{Т.к. } x, y, z \text{ — целые то } \Rightarrow 3y \equiv 0 \Rightarrow y \equiv 0$$

$$\text{Если } y = 0, \text{ то } x = -0,5, \text{ не целое число}$$

$$\text{Если } y = 2, \text{ то } x = -2$$

$$\text{Если } y = -2, \text{ то } x = 1 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \text{Если } y = 2, \text{ то } x = -2 \\ \text{Если } y = -2, \text{ то } x = 1 \end{matrix}} \right\} \Rightarrow \text{минимальное } y^2 = 4$$

$$\text{Если } x = 0, \text{ то } y \text{ — не целое}$$

$$\text{Если } x = 1, \text{ то } y = -2$$

$$\text{Если } x = -1, \text{ то } y \text{ — не целое}$$

$$\left. \vphantom{\begin{matrix} \text{Если } x = 0, \text{ то } y \text{ — не целое} \\ \text{Если } x = 1, \text{ то } y = -2 \\ \text{Если } x = -1, \text{ то } y \text{ — не целое} \end{matrix}} \right\} \Rightarrow \text{минимальное } x^2 = 1$$

Сумма $x^2 + y^2 + z^2$ тем меньше, тем меньше каждый из её членов если $x = 1, y = -2$ то достигается минимальный x^2 и y^2

$$\rightarrow \text{Наименьшее значение } x^2 + y^2 + z^2 = (1)^2 + (-2)^2 + 1^2 = 1 + 4 + 1 = 6$$

Ответ: 6



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$p^2 - q^2 = (p-q)(p+q) = 792 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11$$

Пусть $p = N - a$, $q = N - b$, где N — сумма элементов M

$p - q = b - a$. Элементы множества M : $n, n+1, \dots, n+6$

$\Rightarrow p - q$ может быть 1, 2, 3, 4, 5, 6 т.к. $p - q > 0$ (т.к. $p^2 - q^2 > 0$)

p, q — простые натуральные числа

$\Rightarrow$ либо одно из них 2, но тогда второе нечетное и $(p-q)(p+q)$ — нечетное

либо они оба нечетные $\Rightarrow p - q$ — четное,
 $p + q$ — четное

$\Rightarrow p - q$ может быть 2, 4, 6

Проверим $p - q = 2$:

$$p - q = 2 \Rightarrow p + q = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11 = 4 \cdot 99 = 396$$

$$p - q = (N - a) - (N - b) = b - a, \quad p + q = 2N - (a + b)$$

$$\Rightarrow b = a + 2, \quad p + q = 2N - 2a - 2$$

$$2N - 2a - 2 = 396$$

$$2N - 2a = 398$$

$$N - a = 199$$

Найдем, чему может быть равно N :

Представим ряд чисел:




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



← способами, которыми
можно выбрать 7 чисел

Тогда возможные суммы:

$$(a-1) \cdot 7, a \cdot 7, (a+1) \cdot 7, (a+2) \cdot 7, (a+3) \cdot 7$$

Подставим в $M - a = 199$:

$$\begin{cases} (a-1) \cdot 7 - a = 199 \\ a \cdot 7 - a = 199 \\ (a+1) \cdot 7 - a = 199 \\ (a+2) \cdot 7 - a = 199 \\ (a+3) \cdot 7 - a = 199 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} 6a = 206 \\ 6a = 199 \\ 6a = 192 \\ 6a = 185 \\ 6a = 178 \end{cases}$$

Т.к. a — натуральное,
то число справа
должно делиться
на 2 и на 3

$\Rightarrow$ ~~$6a = 206$~~ $\Rightarrow 6a = 192$

$$a = \frac{192}{6} = 32 \Rightarrow b = 34. \quad M = \{29, 30, 31, 32, 33, 34, 35\}$$

$$M = \{30, 31, 32, 33, 34, 35, 36\} \Rightarrow N = 33 \cdot 7 = 231$$

$$p = N - a = 231 - 32 = 199, \quad q = 231 - 34 = 197$$

$$13^2 < 199 \text{ и } 197 < 17^2 \Rightarrow \text{в простоте можно убедиться,}$$

проверив 2, 3, 5, 7, 11, 13

$$\text{Также } p^2 - q^2 = 199^2 - 197^2 = (199 - 197)(199 + 197) = 2 \cdot 396 = 792$$

Найденное множество целиком соответствует условиям


Ответ: $\{30, 31, 32, 33, 34, 35, 36\}$



1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$\triangle AMD \sim \triangle CMB \text{ т.к. :}$$

$$\cdot \angle AMD = \angle CMB \text{ как вертикальные}$$

$$\cdot \angle ADM = \angle MBC \text{ т.к. } AD \parallel BC \text{ (т.к. границы основания), } BD - \text{ секущая}$$

$$\frac{BC}{AD} = 2 \Rightarrow \text{это коэффициент подобия}$$

$$\Rightarrow \triangle AMI_1 \sim \triangle CMI_1 \text{ т.к. } \angle I_1MA = \frac{1}{2} \angle AMD = \frac{1}{2} \angle BMC = \angle I_1MC$$

$$\angle I_1AM = \frac{1}{2} \angle MAD = \frac{1}{2} \angle MCB = \angle I_1C_1$$

примем с тем же коэффициентом подобия
 (т.к. общее отношение $AM : MC$)

$$\Rightarrow \frac{MI_1}{MI_2} = 2, \quad MI_1 + MI_2 = I_1I_2 \text{ (лежат на одной прямой)}$$

(т.к. на биссектрисе $\angle AMD$)

$$\Rightarrow MI_1 = \frac{13}{3}, \quad MI_2 = \frac{13}{6}$$

Пусть ω_1 касается MC в точке S

$$\Rightarrow MS^2 = MX \cdot MY$$

$$\frac{MX}{MZ} = 2 \text{ (из подобия фигур относительно т. M, гомотетия)}$$

$$\Rightarrow MS^2 = 2 MZ \cdot MY = 2 \cdot 5 = 10$$

т.к. S - т. касания, I_1S - радиус, то по т. Пифагора:

$$MI_1^2 = MS^2 + I_1S^2 \Rightarrow I_1S^2 = MI_1^2 - MS^2 = \left(\frac{13}{3}\right)^2 - 10$$

$$I_1S = \sqrt{\frac{169}{9} - 10} = \sqrt{\frac{169 - 90}{9}} = \sqrt{\frac{79}{9}} = \frac{\sqrt{79}}{3}$$

Ответ: $\frac{\sqrt{79}}{3}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cdot \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{7} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{5\pi}{14} \right) = \sin \frac{5\pi}{14}$$

$$1 = \sin \frac{\pi}{2}$$

$$5 - 4 \sin \frac{3\pi}{14} + X = 4 \cos \frac{\pi}{7} - 5 \sin \frac{\pi}{14}$$

$$X = 4 \left(\cos \frac{\pi}{7} + \sin \frac{3\pi}{14} \right) - 5 \left(\sin \frac{\pi}{14} + \sin \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$= 4 \left(\sin \frac{5\pi}{14} + \sin \frac{3\pi}{14} \right) - 5 \left(\sin \frac{\pi}{14} + \sin \frac{7\pi}{14} \right) =$$

$$= 4 \cdot 2 \cdot \sin \frac{8\pi}{28} \cdot \cos \frac{2\pi}{28} - 5 \cdot 2 \cdot \sin \frac{8\pi}{28} \cdot \cos \frac{6\pi}{28} =$$

$$= 2 \cdot \sin \frac{2\pi}{7} \cdot \left(4 \cos \frac{\pi}{14} - 5 \cos \frac{3\pi}{14} \right), \quad \sin \frac{2\pi}{7} > 0$$

$$\cos \frac{\pi}{14} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{7} \right) = \sin \frac{3\pi}{7}$$

$$\cos \frac{3\pi}{14} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{7} \right) = \sin \frac{2\pi}{7}$$

$$\Rightarrow X = 2 \cdot \sin \frac{2\pi}{7} \left(4 \left(\sin \frac{3\pi}{7} - \sin \frac{2\pi}{7} \right) - \sin \frac{2\pi}{7} \right) = 2 \sin \frac{2\pi}{7} \cdot$$

$$\cdot \left(4 \left(\sin \frac{3\pi}{7} + \sin \frac{-2\pi}{7} \right) - \sin \frac{2\pi}{7} \right) = 2 \sin \frac{2\pi}{7} \cdot \left(8 \cdot \sin \frac{\pi}{14} \cos \frac{5\pi}{14} - \sin \frac{2\pi}{7} \right) =$$

$$= 2 \sin \frac{2\pi}{7}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Из условия, если 4 точки лежат в одной плоскости, то эта плоскость — Δ . Следует, что если в основании пирамиды лежат ≥ 4 точек, то все точки основания из плоскости Δ (выбор из 7), а вершина вне (выбор из 5).

Если в основании:

7 вершин: 5 ~~7~~ вариантов

$$6 \text{ вершин: } 5 \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{6!} = 5 \cdot 7$$

$$5 \text{ вершин: } 5 \frac{7!}{5! \cdot (7-5)!} = 5 \cdot 7 \cdot 3$$

$$4 \text{ вершин: } 5 \frac{7!}{4! \cdot (7-4)!} = 5 \cdot 7 \cdot 5$$

Если в основании 3 вершины, то можно выбрать любые 4 точки из 12, за исключением тех комбинаций, когда они лежат в одной плоскости:

$$C_4^{12} = \frac{12!}{4! \cdot (12-4)!} = 11 \cdot 5 \cdot 9$$

$$C_4^7 = \frac{7!}{4! \cdot (7-4)!} = 5 \cdot 7$$

$$\text{Значит для 3 вершин в основании: } C_4^{12} - C_4^7 = 11 \cdot 5 \cdot 9 - 5 \cdot 7 = \\ = 5(11 \cdot 9 - 7) = 5 \cdot 92$$

$$\text{Значит всего пирамид: } 5 + 5 \cdot 7 + 5 \cdot 7 \cdot 3 + 5 \cdot 7 \cdot 5 + 5 \cdot 92 = \\ = 5 + 5 \cdot 7(1 + 3 + 5) + 5 \cdot 92 = 5 + 5 \cdot 7 \cdot 9 + 5 \cdot 92 = 5(1 + 63 + 92) = 5 \cdot 156 = \\ = 780$$

Ответ: 780

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



Остались: ~~4~~, 5, ~~6~~, 7

$$\cos \frac{\pi}{2} = \cos^2 \frac{\pi}{4} - \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1 - 2\sin^2 \frac{\pi}{4}$$

$$4\cos \frac{\pi}{2} - 5\sin^2 \frac{\pi}{4} = 4 - 8\sin^2 \frac{\pi}{4} - 5\sin^2 \frac{\pi}{4} = -8\sin^2 \frac{\pi}{4} - 5\sin^2 \frac{\pi}{4} + 4$$

$$D = 25 + 4 \cdot 4 \cdot 8 = 25 + 128 = 153$$

$$\frac{5 \pm \sqrt{153}}{-16}$$



$$12 < \sqrt{D} < 13$$

$$17 < 5 + \sqrt{D} < 18$$

$$\frac{5 + \sqrt{D}}{16}$$

$$7 < 5 + \sqrt{D} < 8$$

$$\frac{7}{16} < \frac{5 + \sqrt{D}}{16} < 0,5$$



Если основание из 4:

$$5 \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 5 \cdot 7 \cdot 5 = 5^2 \cdot 7$$

Если основание из 5:

$$5 \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 5^2 \cdot 7 \cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot 5 \cdot 7$$

Если основание из 6:

$$5 \cdot 7$$

Если основание из 7: 5

Если основание из 3:

$$\frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} - \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 2 \cdot 11 \cdot 10 - 7 \cdot 5 = 220 - 35 = 185 = 5 \cdot 37$$

$$\text{Итого: } 5 + 5 \cdot 7 + 3 \cdot 5 \cdot 7 + 5^2 \cdot 7 + 37 \cdot 5 = 5(1 + 7 + 3 \cdot 7 + 5 \cdot 7 + 37) = 5(1 + 7 + 21 + 35 + 37) = 5(101) = 505$$

$$\frac{12!}{4!8!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 11 \cdot 5 \cdot 9$$

$$\frac{7!}{4!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 5!}{4!} = 7 \cdot 5$$

$n, n+1, \dots, n+6$

qth

$$(p-q)(p+q) = 792 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11$$

p-q	p+q
6	4 \cdot 33
4	99 \cdot 2
3	8 \cdot 33
2	4 \cdot 99
1	792

76

$$p = M - n_i$$

$$q = M - n_j$$

$$\Rightarrow p - q \leq 6$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} p - q = 6 \\ p - q = 4 \\ p - q = 3 \\ p - q = 2 \\ p - q = 1 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ +92 \\ \hline 156 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 156 \\ \times 5 \\ \hline 780 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15612 \\ 14176 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 792 \overline{) 792} \\ \underline{792} \\ 0 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{array}{r} p+q \\ 6 \quad 4.33 \\ 4 \quad 2.99 \\ 3 \quad 8.33 \\ 2 \quad 4.99 \\ 1 \quad 8.99 \end{array}$$

$$p-q=6: \quad p=q+6 \quad \text{сумма: } \frac{2q+6}{2} \cdot 7 = q+3$$

$$\begin{aligned} p &= M-a \\ q &= M-b \end{aligned}$$

$$p-q=6 \Rightarrow b-a=6$$

$$b=a+6$$

$$M = \frac{2a+6}{2} \cdot 7 = (a+3) \cdot 7$$

$$p = 6a + p+q = 2M - (a+b) = (a+3) \cdot 14 - (a+6) = 12a + 3 \cdot 14 - 6 = 12a + 6(7-1) = 12a + 36$$

$$12a + 36 = 4 \cdot 33$$

$$4a + 12 = 4 \cdot 11$$

$$a+3=11$$

$$a=8 \Rightarrow b=8+6=14$$

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

$$M = \frac{8+14}{2} \cdot 7 = (4+7) \cdot 7 = 11 \cdot 7 = 77$$

$$p = 77 - 8 = 69$$

$$q = 77 - 14 = 63$$

$$p^2 - q^2 = 69^2 - 63^2 = (69-63)(69+63) = 6 \cdot (69+63) = 6 \cdot 132 = 6 \cdot 11 \cdot 12 =$$

$$\begin{array}{r} 132 \\ \times 6 \\ \hline 792 \end{array}$$

$$p-q=1 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} p &= M-a \\ q &= M-b \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} b-a &= 1 \\ b &= a+1 \end{aligned}$$

$$p+q = 2M - (a+b) = 2M - 2a - 1 = 8.99 = 792$$

$$\begin{array}{r} p-q \\ 6 \quad 4.33 \\ 4 \quad 2.99 \\ 3 \quad 8.33 \\ 2 \quad 4.99 \\ 1 \quad 8.99 \end{array}$$

$$p, q - \text{н.т.} \Rightarrow p-q-2$$

$$\begin{aligned} p-q &= 2 \\ p &= M-a \\ q &= M-b \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} b-a &= 2 \\ b &= a+2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{\min} &= \frac{a+a+6}{2} \cdot 7 = \frac{(a+2) \cdot 2+6}{2} \cdot 7 = (a+1) \cdot 7 \\ M_{\max} &= \frac{(a+3) \cdot 2+6}{2} \cdot 7 = (a+3) \cdot 7 \end{aligned}$$

$$p+q = M \cdot 2 - (a+b) = 2M - 2a - 2 = 4.99 = 396$$

$$2M - 2a = 398$$

$$M - a = 199 \frac{3}{2} \Rightarrow a \frac{3}{2} = 4$$

$$(a-1) \cdot 7 - a = 199$$

$$6a = 206 \times 3a$$

$$(a-1) \cdot 7 - a = 199$$

$$6a = 199 \times 3a$$

$$(a+1) \cdot 7 - a = 199$$

$$6a = 192$$

$$a = \frac{192}{6} = 32$$

$$(a+3) \cdot 7 - a = 199$$

$$6a = 185 \times$$

$$b = 34$$

$$(a+3) \cdot 7 - a = 199$$

$$6a = 178 \times$$

$$a = 30, 31, 32, 33, 34, 35$$

$$M = (a+1) \cdot 7 = 33 \cdot 7 =$$

$$p = 33 \cdot 7 - 32 = 32 \cdot 7 + 7 - 32 = 32 \cdot 6 + 7 = 192 + 7 = 199$$

$$q = 33 \cdot 7 - 34 = 33 \cdot 6 - 1 = 197$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 7 \\ \hline 224 \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 \\ \times 6 \\ \hline 192 \end{array} \quad \begin{array}{r} 33 \\ \times 6 \\ \hline 198 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 197 \quad 13 \\ \times 13 \\ \hline 67 \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \\ \times 4 \\ \hline 52 \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \\ \times 5 \\ \hline 65 \end{array}$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



Пусть n углов

их сумма:

$$= (142 + n) \cdot n$$

$$(142 + n) \cdot n : 180$$

$$\frac{143 + 143 + 2(n-1)}{2} \cdot n = (143 + n - 1) \cdot n =$$

$$180^\circ (n-2)$$

$$\begin{array}{r} 179 \\ 143 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19 \\ 19 \\ \hline 171 \\ 19 \\ \hline 361 \end{array}$$

$$\Rightarrow (142 + n) \cdot n = 180 (n-2)$$

$$142n + n^2 = 180n - 360$$

$$n^2 - 38n + 360 = 0 \quad D = 38^2 - 4 \cdot 360 = 4(19^2 - 360) = 40$$

$$\text{или обратное: } \frac{143 + 143 - 2(n-1)}{2} \cdot n = (143 - n + 1) \cdot n = (144 - n) \cdot n$$

$$180(n-2) = (144 - n) \cdot n$$

$$180n - 360 = 144n - n^2$$

$$n^2 + 36n - 360 = 0 \quad D = 36^2 + 4 \cdot 360 = 36(36 + 40) = 36 \cdot 76 = 36 \cdot 4 \cdot 19 = 144 \cdot 19$$

$$(20-1)(20-1) = 400 - 40 + 1 = 361$$

$$36 + 40 = 76 = 4$$



$$\begin{array}{r} 76 : 2 \\ 38 : 2 \\ \hline 19 \end{array}$$

$$\cos \alpha - \sin \beta = 2 \cdot \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos 60^\circ - \sin 30^\circ = 2 \cdot \cos \frac{90^\circ}{2} \cdot \sin \frac{30^\circ}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sin 15^\circ$$



$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 13 \\ \hline 169 \\ 13 \\ \times 18 \\ \hline 234 \\ \hline 169 \end{array}$$



$$I_1 I_2 = \frac{13}{2} \quad MZ \cdot MY = 5$$

радиус ω - ?

$$\angle M I_2 = \angle I_2 M D = \angle I_1 M B = \angle I_1 M C$$

Пусть коэффициент подобия $k = 2$

$$\Rightarrow \frac{M I_1}{M I_2} = 2 \Rightarrow \frac{M I_1}{\frac{13}{6}} = 2 \Rightarrow M I_1 = \frac{13}{3}$$

$$MZ = 2MX \\ MW = 2MY$$

$$5 = MZ \cdot MY = 2MX \cdot MY = 2MS^2 \Rightarrow MS = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$I_2 S^2 = I_2 M^2 - MS^2 = \left(\frac{13}{6}\right)^2 - \frac{5}{2} = \frac{169}{36} - \frac{5}{2} = \frac{169 - 90}{36} = \frac{79}{36}$$

$$I_1 S = \sqrt{\frac{79}{36}} = \frac{\sqrt{79}}{6}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

сильно погрешит идущих чисел

$$M = \{n, n+1, n+2, \dots, n+6\}$$

$\sum M = n_i$ — простое число

$$792 = 2 \cdot 396 = 2 \cdot 2 \cdot 198 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 99 = 2^3 \cdot 9 \cdot 11$$

$$M = \frac{n+6}{2} \cdot 7 = (n+3) \cdot 7 \quad M \geq 28$$

$$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$$

$$0 \ 1 \ 4 \ 2 \ 2 \ 4 \ 1 \pmod{7}$$

$$p^2 - q^2 = 792$$

$$\equiv 1$$

$$\Rightarrow p^2 \equiv 2, q^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$p \equiv 3 \pmod{7} \text{ или } q \equiv 1 \pmod{7}$$

$$p^2 \equiv 1, q^2 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$q \equiv 7$$


$p_{\max} = 13 \rightarrow$ не подходит

$$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8$$

$$0 \ 1 \ 4 \ 0 \ 7 \ 7 \ 0 \ 4 \ 1$$

Оба числа нечетные

$$p = (7+1) \cdot 2 + 1 \text{ или } p = (7+2) \cdot 2 + 1$$



$$a^x \cdot b^y = a^{xy}$$

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^5$$

$$e^{\sim} = 16$$

$$e^{\sim} = 24$$

$$e^{\sim} \cdot e^{\sim} = 24$$

$$e^{\sim} \cdot e^{\sim} = 24$$

$$x \ln 16 + y \ln 6 + z \ln 24 = 2 \ln 4 + 4x \ln 2 + 3y \ln 2 + 2z \ln 4 + z \ln 6 = \ln 6$$

$$4x \ln 2 + 3y \ln 2 + 2z \ln 2 + z \ln 6 = \ln 6$$

$$\ln 2 \cdot (4x + 3y + 2z) + z \ln 6 = \ln 6 \Rightarrow z = 1, 4x + 3y + 2z = 0$$

$$4x + 3y + 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{-(2+4x)}{3}$$

$$(5x+a)^2 = 25x^2 + 10ax + a^2$$

$$10a = 16$$

$$a = \frac{16}{10}$$

$$x^2 + y^2 + 2^2 = x^2 + y^2 + 1 = x^2 + \frac{4(1+2x)^2}{9} + 1 =$$

$$\frac{9x^2 + 4(4x^2 + 4x + 1)}{9} = \frac{25x^2 + 16x + 4}{9} = (5x + 1.6)^2$$

$$(5x + 1.6)^2$$

$$4x + 3y + 2 = 0$$

$$1 - 2 = -1$$

$$u - 6 + 2 = 0$$

$$1^2 + 4^2 + 1^2 = 1 + 16 + 1 = 18$$

$$y \equiv 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Остаток: 5, 7.

$$3+4+4+5+5+4+6 = 31+5+5+10 = 31$$

$$5 - 4 \sin \frac{3\pi}{14} + x = 4 \cos \frac{\pi}{7} - 5 \sin \frac{\pi}{14}$$

$$x = 4 \left(\cos \frac{\pi}{7} + \sin \frac{3\pi}{14} \right) - 5 \left(\sin \frac{\pi}{14} + 1 \right)$$




$$\begin{aligned} \sin \alpha + \cos \beta &= 2 \cdot \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2} \\ \sin 30^\circ + \cos 60^\circ &= 1 = 2 \cdot \sin \frac{60^\circ+30^\circ}{2} \cdot \cos \frac{60^\circ-30^\circ}{2} = \\ \sin 60^\circ + \cos 60^\circ &= 2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ = \end{aligned}$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} = \frac{5\pi}{14}$$

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2} &= 2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \right) \cdot \left(\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \right) = \\ &= 2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} + \right. \\ &\quad \left. \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \right) = \\ &= 2(a_1 + a_2)(a_3 + a_4) = 2(a_1 a_3 + a_1 a_4 + a_2 a_3 + a_2 a_4) \\ &\quad (a_1 a_3 + a_2 a_4) + (a_1 a_4 + a_2 a_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} + \right. \\ &\quad \left. \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos^2 \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} \right) = \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} (\cos^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \frac{\beta}{2}) \\ &= \frac{1}{2} \sin \alpha \end{aligned}$$



$$\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} + \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} =$$

$$= \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} (\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}) = \frac{1}{2} \sin \beta$$


$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin \alpha + \cos \beta = \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = 2 \sin \frac{\alpha+90^\circ-\beta}{2} \cos \frac{\alpha+\beta-90^\circ}{2}$$

$$\sin \frac{3\pi}{14} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4\pi}{14} \right) = \cos \frac{4\pi}{14}$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{14} = \frac{6\pi}{14} = \frac{3\pi}{7}$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{14} = \frac{7\pi-3\pi}{14} = \frac{2\pi}{7}$$





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. **Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно.** Порча QR-кода недопустима!

