



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 10



- ✓ 1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{15}7^{11}$, bc делится на $2^{17}7^{18}$, ac делится на $2^{23}7^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

- ✓ 2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь
- $$\frac{(a+b, a^2-7ab+b^2)}{(a+b, a^2-7ab+b^2)} = \frac{a+b}{a^2-7ab+b^2}$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 17 : 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 7 и 13 соответственно.

- ✓ 4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x.$$

$$1 - 9x = (1 - 9x)$$




5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-13;26)$, $Q(3;26)$ и $R(16;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$.

- ✓ 6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax + y - 8b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y - 12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 5 и 2,5.



7.24x
13.7 * sqrt(1+x^2) * sin(90-d)
132.

© МФТИ, 2023

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

р1.

$ab : 2^{15} 7^{11} \Rightarrow ab \geq 2^{15} 7^{11}$, аналогично $ac \geq 2^{23} 7^{39}$, $bc \geq 2^{17} 7^{18}$
Заметим, abc - наименьшее $\Leftrightarrow a = 2^{\alpha_1} 7^{\alpha_2}$, $b = 2^{\beta_1} 7^{\beta_2}$,
 $c = 2^{\gamma_1} 7^{\gamma_2}$, т.е. каждое из чисел a, b и c делится только на
простые p , отличные от 2 и 7 (если делится, то по не-
вышеет на делимость их попарных произведений на $2^x 7^y$ из
условия, но увеличивает произведение, т.е. делает не
наименьшим из возможных).

Тогда $ab = 2^{\alpha_1 + \beta_1} 7^{\alpha_2 + \beta_2} \geq 2^{15} 7^{11}$, $ac = 2^{\alpha_1 + \gamma_1} 7^{\alpha_2 + \gamma_2} \geq 2^{23} 7^{39}$, $bc = 2^{\beta_1 + \gamma_1} 7^{\beta_2 + \gamma_2} \geq 2^{17} 7^{18}$

Тогда
$$\begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 \geq 15 \\ \alpha_2 + \beta_2 \geq 11 \\ \beta_1 + \gamma_1 \geq 17 \\ \beta_2 + \gamma_2 \geq 18 \\ \alpha_1 + \gamma_1 \geq 23 \\ \alpha_2 + \gamma_2 \geq 39 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \beta_1 &\geq 15 \Rightarrow \beta_1 \geq 15 - \alpha_1 \\ (15 - \alpha_1) + \gamma_1 &\geq \beta_1 + \gamma_1 \geq 17 \Rightarrow 15 - \alpha_1 + \gamma_1 \geq 17 \\ \Rightarrow \gamma_1 &\geq 2 + \alpha_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_1 + \gamma_1) + (\beta_1 + \gamma_1) &\geq 15 + 17 + 23 \\ 2(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) &\geq 55 \end{aligned}$$

но $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ - целые неотрицательные,
т.е. a, b и c - натуральные
 $\Rightarrow \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1$ - целое неотрицательное

$$\textcircled{2} (\alpha_2 + \beta_2) + (\alpha_2 + \gamma_2) + (\beta_2 + \gamma_2) \geq 11 + 39 + 18 = 68$$

$$\Rightarrow (\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2) \geq 34,$$

но $\beta_2 \geq 0$,
но $\alpha_2 + \gamma_2 \geq 39$, $\alpha_1 + \beta_2 + \gamma_2 \geq \alpha_1 + \gamma_2 \geq 39$
 $\Rightarrow \min(\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2) = 39$

$$abc = (2^{\alpha_1} 7^{\alpha_2}) \cdot (2^{\beta_1} 7^{\beta_2}) \cdot (2^{\gamma_1} 7^{\gamma_2}) = 2^{\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1} \cdot 7^{\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2} \geq 2^{28} \cdot 7^{39} \Rightarrow \min(abc) = 2^{28} \cdot 7^{39}$$

Докажем, что такой случай возможен:

$$\begin{aligned} a &= 2^{11} \cdot 7^{19} \\ b &= 2^4 \cdot 7^0 \\ c &= 2^{13} \cdot 7^{20} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} ab &= 2^{15} 7^{19} : (2^{15} 7^{11}) \\ bc &= 2^{17} 7^{20} : (2^{17} 7^{18}) \\ ac &= 2^{24} 7^{39} : (2^{23} 7^{39}) \end{aligned}, \text{ т.т.д.}$$

$$\textcircled{1} \text{ Ответ: } \min(abc) = 2^{28} \cdot 7^{39}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№2.

т.к. дроби $\frac{a}{b}$ несократима и $a, b \in \mathbb{N}$, то $\text{НОД}(a, b) = 1$ (иначе, если $\text{НОД}(a, b) = d$, $a : d$ и $b : d \Rightarrow \frac{a}{b}$ можно сократить на d).

Пусть $a + b : m$, $a^2 - 7ab + b^2 : m$. ($d \in \mathbb{N}$)

$a + b : m$, $\text{НОД}(a, b) = 1$. Предположим, $\text{НОД}(a, m) = d \Rightarrow$

$\Rightarrow a = kd$, $m = nd$, ~~$k, n \in \mathbb{N}$~~ $k \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$. $a + b : m \Rightarrow$

$\Rightarrow a + b = rm = rnd$, $r \in \mathbb{N} \Rightarrow a + b = kd + b = rnd \Rightarrow$

$\Rightarrow b = rnd - kd = (rn - k)d \Rightarrow b : d \Rightarrow \text{НОД}(a, b) \geq d$, но

$\text{НОД}(a, b) = 1 \Rightarrow d = 1 \Rightarrow \text{НОД}(a, m) = 1$. Аналогично

$\text{НОД}(b, m) = 1 \Rightarrow a$ и b взаимно просты с m

Если $(a + b) : m$, то $(a + b)^2 : m$

$(a + b)^2 : m$, $a^2 - 7ab + b^2 : m \Rightarrow (a + b)^2 - (a^2 - 7ab + b^2) : m \Rightarrow$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + 2ab - a^2 + 7ab - b^2 = 9ab : m$

a и b взаимно просты с $m \Rightarrow \text{НОД}(ab, m) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ если $9ab : m$, то $9 : m \Rightarrow \max(m) = 9$

Докажем, что случай $m = 9$ возможен:

$a = 1$, $b = 8$ (дроби $\frac{1}{8}$ несократима)

$$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2} = \frac{1+8}{1-7 \cdot 1 \cdot 8 + 64} = \frac{9}{65-56} = \frac{9}{9} \leftarrow \text{можно сократить на } m=9$$

Таким образом, мы доказали, что $m \leq 9$ (m - делитель числа 9, т.е. $m \leq 9$) и привели пример для $m = 9 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \max(m) = 9$

Ответ: $\max(m) = 9$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



3. (геом.)



$$R^2 = 12^2 + 24^2 = 144 + 576 = 720$$

$$= 513 \quad 5^2 + x^2 = 3^2 + 12^2$$

Пусть O_1, O_2 — центры Ω и W .
Будем ~~с~~ выбирать C на окружности W , проводить в ней касательную к W AB , пересекать $(O_2 C)$ с Ω в точке K . Наскелм двигать C вправо от диаметра (выбора будет то же из симметрии).

Керудно заметить, тем дальше C от $D = O_1 O_2 \cap W$, тем больше $\angle O_2 O_1 C$, тем больше дуга $O_2 K$, где $O_3 = (O_1 O_2) \cap \Omega$, тем дальше K от O_3 ,

тем меньше дуга $O_2 K$, тем меньше $\angle O_2 K$, тем меньше $CK = O_2 K - 4$. Т.е. тем меньше $CK \cdot CO_2 = 4CK$, тем меньше $AC \cdot CB = O_2 C \cdot CK$. Но при отдалении точки C по окружности от D к Ω $AC \uparrow$, $CB \downarrow$, значит, отношение $AC : CB \uparrow \Rightarrow$ есть только одна C на ΩE такая, что $AC : CB = 17 : 7$.

$E = W \cap \Omega$
справа от $(O_1 O_2)$

$O_2 C = 4$, $AC : CB = 17 : 7$. Пусть $AC = 17x$, $CB = 7x$, x — единица измерения.
 $CK = \frac{AC \cdot CB}{O_2 C} = 17x^2$ из $CK \cdot O_2 C = AC \cdot CB$.

Заметим, что $\angle ACO_2 = \angle O_2 CB$ (они x почитаем площадь $\triangle ACO_2$ и $\triangle O_2 CB$).
АВ — высота
 $2 \rightarrow \frac{7 \cdot 24x}{2} = \frac{\sqrt{4^2 + (17x)^2} \cdot \sqrt{7^2 + (7x)^2} \cdot 24x}{4 \cdot 13}$ $\leftarrow S = \frac{abc}{4R}$

$$2 \cdot 7x \cdot 13 = \sqrt{49 + (17x)^2} \cdot \sqrt{49 + (7x)^2}$$

$$2 \cdot 13 = \sqrt{49 + 289x^2} \cdot \sqrt{1 + x^2} \quad |^{\wedge} 2$$

$$4 \cdot 169 = (49 + 289x^2)(1 + x^2)$$

$$4 \cdot 169 = 289x^2 + (289 + 49)x^2 + 49 \quad y = x^2$$

$$289y^2 + (289 + 49)y + (-4 \cdot 169 + 49) = 0$$

$$D = (289^2 + 49^2) + 4 \cdot 289 \cdot 4 \cdot 169 - 4 \cdot 289^2 \cdot 49$$

Аналогично $24x = AB$

$$289^2 + 49^2 = 289 \cdot 49 \cdot 2 + 16 \cdot 289 \cdot 169 = (289 - 49)^2 + (4 \cdot 13)^2 =$$

$$= (240)^2 + (4 \cdot 13)^2$$

$$X = \frac{-289 - 49 + \sqrt{240^2 + (13 \cdot 4)^2}}{289 \cdot 2}$$

если $\sqrt{\dots}$ перед $\sqrt{D}$, то $x < 0$, что невозможно $\Rightarrow$ берем $\sqrt{\dots}$ перед $\sqrt{D}$

т.к. один корень отрицательный, не больше $x = 0$, $y < 0$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



3.



Заметим,
т.к. $AC:CB=17:7$,
если $AC=17x$, $CB=7x$.
 $x=1$

$$2R \cdot O_2C = O_2B \cdot AO_2$$

$$2 \cdot 13 \cdot 7 = \sqrt{49 + 49x^2} \cdot \sqrt{289 + 49x^2}$$

$$4 \cdot 169 = (1+x^2)(289x^2 + 49)$$

$$2 \cdot 338$$

3 (решать)

Чтобы мы посчитали площадь $\triangle AO_2B$ двумя способами: $\frac{AB \cdot O_2C}{2}$ и $\frac{AB \cdot O_2B \cdot AO_2}{4R}$

$O_2C = 7$, $O_2B = \sqrt{49 + 49x^2}$, $O_2A = \sqrt{289 + 49x^2}$ по т. Пифагора
где $AC=17x$, $BC=7$. $R=13$ (радиус Ω).

Апробация 2 значения площади, найдем x ,
Г.к. $AB=7x+17x=24$
т.к. $AB=24$
 $4 \cdot 169 = (1+x^2)(289x^2 + 49)$
 $x=1$ ← решение ур-е $\Rightarrow AB=7x+17x=24x=24$
что невозможно для x, y уравнение не больше 1 корня

Ответ: $AB=24$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№4. Ответ: $x = \frac{1}{9}$

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x$$

~~Уравнение имеет нецелую область определения~~

Выражение под корнем должно быть неотрицательным $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x^2 - 6x + 2 \geq 0 \\ 3x^2 + 3x + 1 \geq 0 \end{cases}$$

Дополним обе части ур-е на $(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1})$:

$$(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1})(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1}) = (1 - 9x)(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1})$$


$$(\sqrt{3x^2 - 6x + 2})^2 - (\sqrt{3x^2 + 3x + 1})^2 = (1 - 9x)(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1})$$

$$3x^2 - 6x + 2 - (3x^2 + 3x + 1) = (1 - 9x)(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1})$$

$$(1 - 9x) = (1 - 9x)(\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1})$$

При $1 - 9x \neq 0$ можем сократить обе части на $(1 - 9x)$:

$$1 = \sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1}$$



Построим на координатной плоскости $y = 3x^2 - 6x + 2$ и $y = 3x^2 + 3x + 1$

Рассмотрим $y = 3x^2 + 3x + 1$:

при $x \in (-\infty; -1)$ и $x \in (0; +\infty)$

$$3x^2 + 3x + 1 > 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{3x^2 + 3x + 1} > 1 \Rightarrow 1 - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} < 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{3x^2 - 6x + 2} \leq 1 - 1 = 0, \text{ что}$$

невозможно, т.к. $\sqrt{a}$ — неотриц.

значит, $x \in [-1; 0]$. Однако $y = 3x^2 - 6x + 2$ убывает на участке $(-\infty; 1)$, т.к. $(1, -1)$ — координаты вершины.

значит, возрастает на участке $(-\infty; 0]$ тоже возрастает.

значит, на участке $[-1; 0]$ $3x^2 - 6x + 2 \geq 3 \cdot 0 - 6 \cdot 0 + 2 = 2$,

значит, $\sqrt{3x^2 - 6x + 2} \geq \sqrt{2}$ на $[-1; 0] \Rightarrow$

$$\Rightarrow 1 - \sqrt{3x^2 - 6x + 2} \leq 1 - \sqrt{2} < 0 \Rightarrow \sqrt{3x^2 + 3x + 1} < 0, \text{ что невозможно по определению квадратного корня} \Rightarrow \text{случай } 1 - 9x \neq 0 \text{ невозможен}$$

При $1 - 9x = 0$: $x = \frac{1}{9} \Rightarrow \sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = \sqrt{\frac{3}{81} - \frac{6}{9} + 2} - \sqrt{\frac{3}{81} + \frac{3}{9} + 1} =$
 $= \sqrt{\frac{3 - 6 \cdot 9 + 2 \cdot 81}{81}} - \sqrt{\frac{3 + 3 \cdot 9 + 81}{81}} = \sqrt{\frac{121}{81}} - \sqrt{\frac{121}{81}} = 0 = 1 - 9 \cdot \frac{1}{9}$. Обозначается: оба подкоренных выражения равны $\frac{11}{9} > 0$.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№6. Ответ: $a=0$

$$\begin{cases} ax+y-8b=0 \\ (x^2+y^2-1)(x^2+(y-12)^2-16) \leq 0 \end{cases}$$

$$(x^2+y^2-1)(x^2+(y-12)^2-16) \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2-1 \leq 0 \\ x^2+(y-12)^2-16 \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x^2+y^2-1 \geq 0 \\ x^2+(y-12)^2-16 \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$(1) \begin{cases} x^2+y^2 \leq 1 \\ x^2+(y-12)^2 \geq 16 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x^2+y^2 \geq 1 \\ x^2+(y-12)^2 \leq 16 \end{cases}$$

аналогично: $R_1 \geq 1, R_2 \leq 4$,
где R_1 и R_2 — радиусы окр.
 $W_1(0;0, R_1)$ и $W_2(0;12, R_2)$

$x^2+y^2=R_1^2$ — окружность с центром в $(0;0)$ и радиусом $R_1 \Rightarrow x^2+y^2 \leq 1 \rightarrow$ мн-во окружностей с центром в $(0;0)$ и радиусом $R_1 \leq 1$
 $x^2+(y-12)^2=R_2^2$ — окр. с центром в $(0;12)$ и радиусом $R_2 \Rightarrow x^2+(y-12)^2 \geq 16$ — мн-во окружностей с центром в $(0;12)$ и радиусом $R_2 \geq 4$

Корней ур-е ~~не~~ две заданных R_1, R_2 может быть нullo, либо 1, либо 2. 0 корней: окружности $W_1(0;0, R_1)$ и $W_2(0;12, R_2)$ не пересекаются, 1 корень: W_1 и W_2 касаются, 2 корня — пересекаются в двух точках. Заметим, если при заданных R_1 и R_2 ур-е имеет ~~не~~ меньше 2-х корней, то в зависимости от a и b система имеет меньше 2-х корней (если одно ур-е системы имеет меньше 2-х корней, то система тоже). Значит, система может иметь 2 решения $\Leftrightarrow$ окружности пересекаются в двух точках $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$.

Заметим, т.к. центры окружностей лежат на оси ординат, любая конструкция из двух окр. симметрична отн. оси ординат, тогда прямая, содержащая точки пересечения $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ окружностей, должна быть перпендикулярна оси ординат, иначе поворота имеют вид $y=k+0 \cdot x$.

$ax+y-8b=0 \Rightarrow y=8b-ax$. Эта прямая должна содержать $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$, иначе система будет иметь меньше 2-х решений, значит, должна совпадать с прямой, проходящей через точки пересеч. W_1 и W_2 (т.к. прямая определяется двумя ее точками) $\Rightarrow$ иметь вид $y=k+0 \cdot x \Rightarrow a=0$.




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Заметим, по лемме
о треугольнике $AN = NI = NC$ и $AI = MI = MB$,
где I — центр вписанной в $\triangle ABC$ окружности,
также, CI — биссектриса $\Rightarrow \angle ACI = \angle ICB$, $\angle ACM = \angle BCM$
как вписанные в одну окр. и опирающиеся на равные дуги $\Rightarrow M \in CI$. Аналогично $N \in BI$.



Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




$$a+b \vdash m$$

$$a^2 - 7ab + 6b^2 : m$$

$$a^2 + 2ab + b^2 : m$$

$$gab : m$$

~~gim~~ gim



$$4gk^2 = \frac{4g(k+1)}{k+2/(k-1)}$$

$$7. \frac{343}{17} \checkmark = \frac{343}{17} \checkmark$$

$$\frac{7}{17} = \frac{2}{17}$$


$$K =$$

$$\frac{343}{17} k = \frac{343}{17} k^2$$
$$k = 1$$

$$(3x - 1)(x + 2)$$

$$3 \times 2$$

34-9X



$$\left(3 + 2^{-\frac{1}{2}}\right)^x$$

$$y = 86 - 8x$$

$$\frac{6}{2a}$$

$$\frac{6 \pm \sqrt{12}}{6} \quad 1 \pm \sqrt{12}$$

$$1 + \sqrt{12}$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




03.7

$$3x^2 - 6x + 2 \geq 0$$

$$\frac{6}{6} = 1 \quad 3 - 6 + 2 = -1$$

$$1 + \frac{\sqrt{12}}{6}$$

$$1 - \frac{\sqrt{12}}{6}$$




$$1 - 3x^2 - 3x - 1 = 2\sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 3x^2 - 6x + 2$$

$$6x^2 + 3x - 2 = 2\sqrt{3x^2 + 3x + 1}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}$$

5.



$$2(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1) = 14$$

Пусть $x_2 = x_1$. Тогда $y_2 - 1 = 14$

Тогда

~~2x + k = y~~

$$-2x + k = y$$

