



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 4



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^6 3^{13} 5^{11}$, bc делится на $2^{14} 3^{21} 5^{13}$, ac делится на $2^{16} 3^{25} 5^{28}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,4$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_{x^3} \frac{1}{121} - 5, \quad \text{и} \quad \log_{11}^4(0,5y) + \log_{0,5y} 11 = \log_{0,125y^3} (11^{-13}) - 5.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-15;90)$, $Q(2;90)$ и $R(17;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $6x_2 - 6x_1 + y_2 - y_1 = 48$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 180, $SA = BC = 20$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 6$, а радиус сферы Ω равен 8.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N1

$$ab = k_1 \cdot 2^6$$

$$bc = k_2 \cdot 2^{14}$$

$$ac = k_3 \cdot 2^{16}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

переименуем

$$\Rightarrow (abc)^2 = k_1 k_2 k_3 \cdot 2^{36}$$

$$abc = \sqrt{k_1 k_2 k_3} \cdot 2^{18}$$

неизвестно, сколько 2 содержится

$$\sqrt{k_1 k_2 k_3}$$

в abc по 18 делится на 18 ,

проведем анализ с помощью таблицы

для 2 - 2^{18}

$$\text{для } 3 - \frac{13+21+25}{2} = 29,5$$

$$\text{для } 5 - \frac{11+13+21}{2} = 26$$

из $ac = 2^{16} \cdot 3^{25} \cdot 5^{28} \Rightarrow$, что для 5 в abc 28 :

$a, b, c \in \mathbb{Z} \Rightarrow abc \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ для 3 $\leq 2 \Rightarrow$ для 3 30

$$\text{получаем } abc = 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{28}$$

Пример: $a = 2^4 \cdot 3^8 \cdot 5^{14}$; $b = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 5^0$; $c = 2^{12} \cdot 3^{17} \cdot 5^{14}$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N2



$$\frac{S_{ABC}}{S_{EFC}} = \left(\frac{CF}{AB}\right)^2, \text{ м.к.}$$

~~AB~~ ABC cos(EF по

B ?-ым углом

$$CF = \frac{CE}{\sin \alpha}$$

$$CE \cdot (CE + EL) = AC^2 - \text{м-ма Окал и сек.}$$

$$AD \cdot DC = ED \cdot DL \Rightarrow DL = \frac{AD \cdot DC}{ED} - \text{м-ма пересек. хорд}$$

$$EL = DE + DL = DE + \frac{AC \cdot DC}{ED}$$

$$DE = CD - CE; AC \cdot DC = AB \cdot CD$$

$$EL = (CD - CE) + \frac{AB \cdot CD}{CD - CE}$$

$$CD = AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$EL = AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE + \frac{AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE}$$

$$CE \cdot \left(CE + AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - \left(CE + \frac{AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE} \right) \right) = AC^2$$

$$CE \cdot \left(AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha \left(1 + \frac{1}{AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE} \right) - CE \right) = AB^2 \cdot \sin^2 \alpha$$

$$CE \cdot \cos \alpha \left(1 + \frac{1}{AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE} \right) = AB \cdot \sin \alpha \cdot \left(AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE \right)$$

$$CE \cdot \cos \alpha \cdot AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - CE^2 \cdot \cos \alpha + CE \cdot \cos \alpha - AB \cdot \sin \alpha = 0$$

$$CE^2 \cos \alpha = (AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \cos \alpha) (CE + AB \cdot \sin \alpha) = 0$$

$$CE^2 = AB^2 \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha + 2AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$BD = CB \cdot \cos \alpha$$

$$CB = AB \cdot \cos \alpha$$

$$BD = AB \cdot \cos^2 \alpha \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{BD}{AB} = \frac{5}{7}; \cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}}; \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}};$$

$$\lg \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \text{ Ам.к. } \alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$$

$$(E^2 - (AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + 1)(E + AB \cdot \lg \alpha) = 0$$

$$CE^2 - (AB \cdot \frac{\sqrt{10}}{7} + 1)E + \frac{\sqrt{2}}{7} AB = 0$$

$$D = \frac{10}{49} AB^2 + \frac{2\sqrt{10}}{7} AB + 1 - \frac{4\sqrt{2}}{5} AB$$

~~Выразив E через AB, а E через F, зная что $F = \frac{CE}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}} CE$ можно было бы выразить E через CF~~

~~AB м. л. найти как опущенные, м. л. найти~~

$$\frac{S_{ABC}}{S_{CEF}} = \left(\frac{AB}{CF}\right)^2 \text{ выразив F через AB, зная что}$$

$$F = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}} CE, AC = \frac{AB}{\sin \alpha} \text{ можно было бы найти}$$

$$\frac{AC}{CF} \text{ и } \frac{AC}{CF} \frac{S_{CEF}}{S_{ACD}} = \left(\frac{AC}{CF}\right)^2$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



13

$$10 \sin(\sin x) = 9x - 2x \Rightarrow 9\pi - 2x \in [0; 10\pi]$$

$$10 \cos\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = 9\pi - 2x \quad 0 \leq 9\pi - 2x \leq 10\pi$$

1) $2\pi n \leq \frac{\pi}{2} - x \leq 2\pi n + \pi, n \in \mathbb{Z}$

$$2\pi n - \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2\pi n + \frac{\pi}{2}$$

$$10\left(\frac{\pi}{2} - x - 2\pi n\right) = 9\pi - 2x$$

$$5\pi - 10x - 20\pi n = 9\pi - 2x$$

$$8x = 20\pi n - 4\pi$$

$$x = 2,5\pi n - 0,5\pi$$

2) $2\pi n + \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} - x \leq 2\pi n + \pi$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$$

$$10\left(x - \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 9\pi - 2x$$

$$10x - 5\pi + 20\pi n = 9\pi - 2x$$

$$12x = 20\pi n + 14\pi$$

$$x = \frac{5}{3}\pi n + \frac{7}{6}\pi$$

Найдем корни на данной промежутке:

$$x = -0,5\pi; x = 2\pi; x = 4,5\pi \quad x \in \left[2\pi n - \frac{\pi}{2}; 2\pi n + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x = -0,5\pi; x = \frac{17}{6}\pi; x = \frac{9}{2}\pi \quad x \in \left[2\pi n + \frac{\pi}{2}; 2\pi n + \frac{3\pi}{2}\right]$$

поднимаем корни
поднимаем корни:

$$x = -0,5\pi; 2\pi; 4,5\pi$$

$$x = \frac{7}{6}\pi; \frac{17}{6}\pi$$

Ответ: $-\frac{1}{2}\pi; \frac{7}{6}\pi; \frac{17}{6}\pi; 2\pi; 4,5\pi$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7


ЛМОТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Эти отрезки от начал. с те будут пересекать сразу окруж.

Крайние виды $y = k_2 x + c$ будут всегда пересекать обе окр. в 2-х местах, как показано на графике. получаются "разрешенные" коэф. это $\begin{cases} k_2 > k \\ k_2 < -k \end{cases}$, а запрещенные $-k \leq k_2 \leq k$

найдем k - коэф. общей касательной.



$$O_1 M_1 k \cap O_2 M_2 k$$

$$O_1 k = x; O_2 k = 9 - x$$

$$\cos \alpha = \frac{5}{9 - x} = \frac{2}{x}$$

$$5x = 18 - 2x$$

$$7x = 18 \Rightarrow x = \frac{18}{7}$$

$$\cos \alpha = \frac{5}{9 - \frac{18}{7}} = \frac{35}{95} = \frac{7}{9} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

получаем: $k = \operatorname{tg} \alpha = \frac{4\sqrt{2}}{7}$

получаем: $\begin{cases} \frac{4\sqrt{2}}{7} \geq \frac{5}{6\alpha} \\ \frac{5}{6\alpha} \geq -\frac{4\sqrt{2}}{7} \end{cases} \Rightarrow 6\alpha$

получаем:

$$\begin{cases} \frac{5}{6\alpha} > \frac{4\sqrt{2}}{7} \\ \frac{5}{6\alpha} < -\frac{4\sqrt{2}}{7} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \alpha < \frac{37}{24\sqrt{2}} \\ \alpha > -\frac{37}{24\sqrt{2}} \end{cases} \begin{matrix} \text{max} \\ \alpha = 0 \\ \text{подлогн} \end{matrix}$$

Ответ: $\left(-\frac{37}{24\sqrt{2}}; \frac{37}{24\sqrt{2}}\right)$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




$$\sqrt{4} \begin{cases} 5x + 6\alpha y - b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

равно кот. упр
а для кот. найдется b

Нарисуем график системы ур. Это две окр.:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + (y+9)^2 = 4 \end{cases}$$



перешли к 1-ой ур.

$$5x + 6\alpha y - b = 0$$

$$6\alpha y = -5x + b$$

$$y = -\frac{5}{6\alpha}x + \frac{b}{6\alpha}$$

для $\alpha \neq 0$
для $\alpha = 0$
4 корня
но все число $b=0$

определим α -коэффициент

допустимый

$$\frac{5}{6\alpha}$$

различные случаи
внут. касательная
они пересек окр. по
по 1 разу, одна дуга, путь
ид ур.
 $y = -kx + b/c$ - симметрия
 $y = kx + c$

заметьте, что увеличивая c
большую окр., теперь кас-я
пересекает в 2-ух местах,
а второго ни в одном.

Обычно касаясь касательной также пересечем
окр. больше 2-ух раз в сумме. ~~какая~~

Также обычно, что прямые, параллельные в
зад. системе вида $y = k_1x + c$ так же независимо от

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№ 5

$$1) \log_{11}^4(x) - 6 \log_x(11) = \log_{x^3(11)}(1) - 5$$

$$2) \log_{11}^4(0,5y) + \log_{0,5y}(11) = \log_{0,125y^3(11^{-13})}(1) - 5$$

пусть 1)

$$\log_{11}^4(x) - \frac{6}{\log_{11}(x)} - \frac{1}{\log_{11}(x^{-35})} + 5 = 0$$

$$\log_{11}^4(x) - \frac{6}{\log_{11}(x)} + \frac{1}{1,5 \log_{11}(x)} + 5 = 0$$

$$\log_{11} x = t$$

$$t^4 - \frac{6}{t} + \frac{2}{3t} + 5 = 0 \quad | \cdot t, \text{ м.к}$$

$$t^5 + 5t - \frac{16}{3} = 0$$

$$t \neq 0, \text{ м.к}$$

$$\log_{11} x \neq 0$$

$$\text{м.к } x \neq 1$$

пусть 2)

$$\log_{11}^4(0,5y) + \frac{1}{\log_{11}(0,5y)} + \frac{13}{8 \log_{11}(0,5y)} + 5 = 0$$

$$g = \log_{11}(0,5y)$$

$$g^4 + \frac{1}{g} + \frac{13}{8g} + 5 = 0 \quad | \cdot g \neq 0 - \text{но } \textcircled{A3}$$

$$g^5 + 5g + \frac{21}{8} = 0$$

$$g + t = ?$$

$$\log_{11} x + \log_{11} 0,5y = \log_{11}(0,5xy) = g + t$$

$$0,5xy = 11 \quad (g + t)$$

$$xy = 2 \cdot 11 \quad (g + t)$$

0, A3:

$$\left\{ \begin{array}{l} x > 0 \\ x \neq 1 \\ x^3 \neq 1 \\ x^3 \neq 0 \\ 0,5y > 0 \\ 0,5y \neq 1 \\ 0,125y^3 \neq 1 \\ 0,125y^3 > 0 \end{array} \right.$$

$$\Downarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x > 0 \\ x \neq 1 \\ y \neq 2 \\ y > 0 \end{array} \right.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



пусть точка $A(x_1, y_1)$ дана, найдем
подходящие точки B

$$6(x_2 - x_1) + y_2 - y_1 = 48$$

$y_2 = -6(x_2 - x_1) + 48 + y_1$ - прямая


имеет наклон -6 и проходит через точку

$(x_1; y_1 + 48)$

как ~~она~~ ~~сторона~~ параллелограмма
парал.

на такой прямой будет ~~точка~~ $16; 15$ см
0 точек. 16 см ~~сторона~~ $A \in y = 6n; n \in \mathbb{Z}$

это можно показать




отметим жирным точки (целоч. координатами)
и их y координата их всего $\frac{90}{6} + 1 = 16$

для $y = 6n + k; k \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$ точек всего 15.

это так же можно можно показать.

0 у тех точек у которых прямая \perp и не проходит
параллелограмм, т.е.

Найдем, где ~~лежат~~ ~~также~~,
как A_1 .



видно, что у A_2
есть удобная
цел. точки
в параллело-
грамме, $\text{@} y_{A_2}$ и т.д.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




Q (2; 10)

$A_2(2; 10-48)$ $A_3(2; 42)$ и линия на прямой

$y = -6(x-2) + 42$ точки очевидно имеют множество
подлежащих B,

но точки справа
(сверху)




от $y = -6(x-2) + 42$

уже не будут иметь подлежащих B

пусть все точки - как-то подлежащих B, тогда


как параллелограмм будет выглядеть так?



Из этого видно
сделано допустимо
можно увидеть,
что мы имеем
16 рядов по 6, грани-
цей 9, ~~и~~
10-10 6-каши и

получаем
всего:
 $16 \cdot 6 +$
 $+ 15 \cdot 74 \cdot 9 =$
 $= 10950$
пар.

Ответ: 10950



20-16=74 ряда
по 5, грани-
цей 9 (2+5-каши,
н.к. границы
не целые

$y = -6(x-2) + 42$
(9; 0)


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{AB}{BD} = 1,4$$

$EF \parallel BD$, $\angle EFC = \angle BDC = \alpha$

найдём $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$

$$BD = CB \cdot \cos \alpha$$

$$CB = AB \cdot \cos \alpha$$

$$BD = AB \cdot \cos^2 \alpha \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{BD}{AB} = \frac{5}{7}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}}; \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}; \tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, \text{ м.к. } \alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$$

$$\triangle EFC \sim \triangle ABC \Rightarrow \frac{S_{ABC}}{S_{ECF}} = \frac{CF^2}{AB^2}$$

$$AC^2 = CE \cdot CD \text{ - м-кр о/кр. ч сек.}$$

$$CE = CF \cdot \sin \alpha \Rightarrow CF = \frac{CE}{\sin \alpha} = \frac{AC^2}{CD \cdot \sin \alpha}$$

$$AC = AB \cdot \sin \alpha$$

$$CD = CB \cdot \sin \alpha; CB = AB \cdot \cos \alpha \Rightarrow CD = AB \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$CF = \frac{AC^2}{CD \cdot \sin \alpha} = \frac{AB^2 \cdot \sin^2 \alpha}{AB \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha} = \frac{AB}{\cos \alpha}$$

$$AC^2 \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha = AB \cdot CH$$

$$CH =$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



	2	3	5
a	4	8	18
b	2	5	0
c	12	17	14
	18	30	28



$$AC^2 = CE \cdot CD = CF \cdot CL$$

$$AC^2 = CE \cdot CD \Rightarrow CE = \frac{AC^2}{CD}$$

$$\frac{CE}{\cos \alpha} = CF = \frac{AC^2}{CD \cos \alpha}$$

~~$$\frac{CE}{CB} = \frac{AC^2}{CD \cos \alpha \cdot CB}$$~~


~~$$\frac{FB}{FC} = ?$$~~

~~$$\frac{CF}{CB}$$~~

~~$$CD = CB \cdot \sin \alpha$$~~

~~$$AC = CB \cdot \cos \alpha$$~~

~~$$AC^2 = ED \cdot$$~~



~~$$\frac{OC}{OD} = \frac{OB}{AO} \quad OC \cdot AO$$~~

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$ab = k_1 2^6$
 $bc = k_2 2^{14}$
 $ac = k_3 2^{16}$



$$\begin{array}{r} 27 \\ 37 \\ \hline 189 \\ 199 \\ \hline 16 \\ 6 \\ \hline 36 \\ 6 \\ \hline 96 \\ \hline 27 \\ 37 \end{array}$$

$(5-9) + 5(5-9) - \frac{16}{7} - \frac{21}{8} = 0$

$(x_2 - x_1)6 + (y_2 - y_1) = 48$
 $6x_2 + y_2 = 48$
 $y_2 = 48 - 6x_2$

$y_2 = 6(x_2 - x_1) + 48 + y_1$


$x = 0 \text{ или } x_2 = 0$

$16 \cdot 60 + 30 \cdot 37 \cdot 8 =$
 $= 10 \cdot (16 \cdot 6 + 27 \cdot 37)$

$10 \cdot (96 + 999) =$
 $= 10950$

$\frac{13+21+25}{2} = 25+34 = 59$

$11+13+28 =$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$10 \arccos(\cos(\frac{\pi}{2} - x))$$


$$\frac{\pi}{2} - x \in [0; \pi] + 2\pi n$$

$$10(\frac{\pi}{2} - x) = 9\pi - 2x \quad \frac{\pi}{2} - x \in [0; \pi]$$

$$5\pi - 10x = 9\pi - 2x \quad \frac{\pi}{2} - x \in [0; \pi]$$

$$10(\frac{\pi}{2} - x - 2\pi n) = 9\pi - 2x$$

$$5\pi - 10x - 20\pi n = 9\pi - 2x$$



$$n=0$$

$$-2x = -0,5\pi$$

$$x = \frac{0,5\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$8x = -20\pi n - 4\pi \quad \log_2 4 = \log_2 10 \cdot \arccos(-1) = 9\pi + \pi$$

$$x = 2,5\pi n - 0,5\pi$$

$$2\pi n \leq x \leq 2\pi n + \pi$$

$$2\pi n - \frac{\pi}{2} \leq -x \leq 2\pi n + \frac{\pi}{2}$$


$$2\pi n - \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2\pi n + \frac{\pi}{2}$$

$$x =$$

$$\frac{10\pi n - 5\pi}{6}$$

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$

$$\frac{10\pi n + 7\pi}{6}$$



$$81 - 49 = 32$$

$$6a < \frac{5 \cdot 7}{\sqrt{7}}$$

$$a < \frac{37}{2\sqrt{2}}$$

$$6ay = -5x + b$$

$$y = -\frac{5}{6a}x + \frac{b}{6a}$$

$$g = \frac{5 + \frac{21}{3}}{5}$$

$$h = \frac{16 - 15}{3 \cdot 5}$$

$$x \cdot y = \frac{1}{2} (p + t)$$

$$g + t = ?$$

$$\log_{11} 0,5xy = g + t$$

$$0,5xy = 11^{g+t}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$a = 2^{\alpha_2} 3^{\alpha_3} 5^{\alpha_5}$$

$$a_2 + b_2 = 6$$

$$a_3 + b_3 = 13$$

$$a_5 + b_5 = 11$$

$$ab \cdot bc \cdot ac = a^2 \cdot b^2 \cdot c^2 \cdot \text{мм} = 2^{36} \cdot 3^{52} \cdot 5^{29,5}$$

$$6 + 14 + 16 = 36$$

$$13 + 21 + 25 = 59$$

$$11 + 13 + 28 = 52$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$

$$c = 5^{14} \cdot 3^{12} \cdot 2^{10}$$

$$b = 5^{14} \cdot 3^{13} \cdot 2^{10}$$

$$a = 5^{14} \cdot 3^{13} \cdot 2^{10}$$

$$a = 2^3 \cdot 3^7 \cdot 5^6$$

$$b = 2^3 \cdot 3^6 \cdot 5^5$$

$$c = 2^{12} \cdot 3^{17} \cdot 5^{15}$$

$$a = 5^{14} \cdot 3^{20} \cdot 2^{14}$$




$$b = 5^{14} \cdot 3^{14} \cdot 2^{14}$$

$$c = 5^{14} \cdot 3^{17} \cdot 2^{17}$$

$$ab = 5^{14} \cdot 3^{13} \cdot 2^6; \quad bc = 5^{14} \cdot 3^{21} \cdot 2^{14}; \quad ac = 5^{28} \cdot 3^{28} \cdot 2^{26}$$

$$\sqrt{2} z = 7 + b$$

$$\frac{S_{ACD}}{S_{CEEF}} = \frac{(EF)^2}{(CD)^2} = \frac{2BD - AB}{BD \cdot \lg \angle A}$$




$$\frac{AB}{BD} = 1,4$$

$$B \lg \angle A = \frac{CD}{DB}$$

$$S_{ACD} = AB \cdot CD$$

$$\frac{AB}{BD} = 1,4$$

$$LH = AD$$



$$\frac{a_c}{a} = \frac{a}{c} = \frac{h}{b}$$

$$a^2 = a_c \cdot c$$

$$a_c = a \cdot \sin \alpha$$

$$a = c \cdot \cos \alpha$$

$$a_c = a \cdot \cos^2 \alpha \Rightarrow a_c = c \cdot \cos \alpha \cdot \cos^2 \alpha \cdot \sin \alpha$$

$$a = c \cdot \cos^2 \alpha \Rightarrow c = \frac{a}{\cos^2 \alpha}$$

$$EF = AB - 2AD$$

$$EF = 2BD - AB$$

$$CD = BD \cdot \frac{5}{7} = \frac{a_c}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{a_c}{5BD}$$

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}}; \quad \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$$

