



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^9 3^{10} 5^{10}$, bc делится на $2^{14} 3^{13} 5^{13}$, ac делится на $2^{19} 3^{18} 5^{30}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 3 : 1$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 \quad \text{и} \quad \log_3^4(5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-14; 42)$, $Q(6; 42)$ и $R(20; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 90, $SA = BC = 12$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1, BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача #1.

$$\begin{aligned} \text{Пусть } a &= 2^{x_a} \cdot 3^{y_a} \cdot 5^{z_a} \cdot V_a; & (x_a, y_a, z_a \in \mathbb{Z}^+, V_a \in \mathbb{N}) \\ b &= 2^{x_b} \cdot 3^{y_b} \cdot 5^{z_b} \cdot V_b; \\ c &= 2^{x_c} \cdot 3^{y_c} \cdot 5^{z_c} \cdot V_c. \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } ab = 2^{x_a+x_b} \cdot 3^{y_a+y_b} \cdot 5^{z_a+z_b} \cdot V_a \cdot V_b = 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10}.$$

$$\text{Значит, } x_a+x_b \geq 9; y_a+y_b \geq 10; z_a+z_b \geq 10.$$

$$\text{Аналогично, } bc: 2^{14} \cdot 3^{13} \cdot 5^{13} \Rightarrow x_b+x_c \geq 14; y_b+y_c \geq 13; z_b+z_c \geq 13.$$

$$ac: 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30} \Rightarrow x_a+x_c \geq 19; y_a+y_c \geq 18; z_a+z_c \geq 30.$$

Сложив нерав-ва с x , получаем:

$$x_a+x_b + x_b+x_c + x_a+x_c = 2(x_a+x_b+x_c) \geq 9+14+19 = 23+19 = 42$$

Аналогично,

$$2(y_a+y_b+y_c) \geq 10+13+18 = 41$$

$$2(z_a+z_b+z_c) \geq 10+13+30 = 53$$

$$\text{Значит, } x_a+x_b+x_c \geq 21; y_a+y_b+y_c \geq 20,5 \text{ (а значит и } 21, \text{ т.к. целые)};$$

$$z_a+z_b+z_c \geq 26,5 \text{ (а значит и } 27, \text{ т.к. целые).}$$

$$\text{В то же время } z_b \geq 0, z_a+z_c \geq 30 \Rightarrow z_a+z_b+z_c \geq 30.$$

$$\text{Значит, } abc = 2^{x_a+x_b+x_c} \cdot 3^{y_a+y_b+y_c} \cdot 5^{z_a+z_b+z_c} \cdot V_a V_b V_c \geq 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{30}$$

$$\text{Равенство достигается при } a = 2^7 \cdot 3^8 \cdot 5^{10}; b = 2^2 \cdot 3^2; c = 2^{12} \cdot 3^{11} \cdot 5^{20}.$$

$$\text{Ответ: } 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{30}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача 2.

Дано:

$\triangle ABC$

CC — прямая

CD — высота

$AD:DB = 3:1$

Окр. ω касается

BC в B ,


$CD \cap \omega = F$, $AC \cap \omega = E$,

$EF \parallel AB$.

Найти:

Выражение $\frac{S(\triangle CEF)}{S(\triangle ABC)}$.

$C = (0,0)$



Решение:

Пусть CM — медиана.

В $\triangle CMB$ высота CD является медианой, значит $CM = CB$.

Но $CM = MB$, т.е. $\angle ACB = 90^\circ$.

Значит, $\triangle CMB$ — равнобедренный,
т.е. $\angle CMB = 60^\circ$.

$$AC = BC \cdot \tan 60^\circ = BC \cdot \sqrt{3}.$$

Пусть $BC = a$, радиус окружности r , $CE = x$.

Из точки C к окружности ω :

$$CE \cdot (2r - CE) = d^2 \quad (\text{если } AC \text{ повторно пересекает } \omega \text{ в точке } P,$$

то ω симметрично отн. центра к EP , как и AC , значит

длина y -координаты центра окружности ω — средняя y -координат

$$E \text{ и } P), \text{ т.е. } r = \frac{CE + CP}{2} \Rightarrow \text{т.е. } CP = 2r - CE).$$

$$x \cdot (2r - x) = d^2. \quad \text{Но } r = \frac{a}{2} \Rightarrow d^2 = \frac{a^2}{4} - 2x^2 + x^2 = \frac{a^2}{4} - x^2 = 0$$

$$\angle ECF = 90^\circ - \angle CDB = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ. \quad (r = \frac{x}{2}, \text{ т.е. } CP \perp EP, \text{ т.е. } \triangle CFP$$

$$\text{т.е. } CF \perp AB \text{ и } EF \parallel AB. \quad x(F) = CF \cdot \cos 30^\circ = \frac{x}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x\sqrt{3}}{4}.$$

$$y(F) = CF \cdot \sin 30^\circ = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{x}{4}. \quad OF^2 = (r - \frac{x}{4})^2 + (a - \frac{x\sqrt{3}}{4})^2 = r^2.$$



На одной странице можно оформить только одну задачу.
 Отметьте крестиком номер задачи.
 решение которой представлено на странице:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Липа QR-кода неопустима!



Задана аз прогори:

$$P^2 = \left(r - \frac{q}{x}\right)^2 + \left(a - x\sqrt{3}\right)^2 = r^2 - 2r\frac{q}{x} + \frac{q^2}{x^2} + a^2 - 2ax\sqrt{3} + 3x^2 = r^2$$

$$4x^2 - r\frac{q}{x} - a\sqrt{3} + a^2 = 0$$

$$4x^2 - (r+a\sqrt{3})\frac{q}{x} + a^2 = 0$$

$$4x^3 - (r+a\sqrt{3})q + a^2x = 0$$

$$r = \frac{a^2 + x^2}{2x}$$

$$x^2 - \left(a^2 + x^2\right) \frac{q}{2x} + a\sqrt{3}\frac{q}{2} + a^2 = 0$$

$$x^2 - (a^2 + x^2) - 2ax\sqrt{3} + 4a^2 = 0$$

$$3a^2 - 2ax\sqrt{3} = 0$$

$$x = \frac{3a}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3}a$$

Но $\Delta CEF \sim \Delta ABC$ с коэффициентом подобия $\frac{CE}{AB} = \frac{CF}{BC} = \frac{EF}{AC} = \frac{\sqrt{3}a}{4a} = \frac{\sqrt{3}}{4}$

Значит, $\frac{S(CEF)}{S(ABC)} = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = \frac{3}{16}$

$\frac{S(ABC)}{S(CEF)} = \frac{16}{3}$

Ответ: $\frac{16}{3}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача #3.

$$5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad (\arcsin t + \arccos t = \frac{\pi}{2})$$

$$\Leftrightarrow 5 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \arccos(\cos x) \right) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$2\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = x + 5 \arccos(\cos x)$$

$$2\pi = x + 5 \arccos(\cos x)$$

$$\textcircled{1} x \in [2\pi k; 2\pi k + \pi] \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\arccos(\cos x) = x - 2\pi k$$

Значим, исходное уравнение ~~равносильно~~ становится:

$$2\pi = x + 5(x - 2\pi k)$$

$$2\pi + 10\pi k = 6x$$

$$\pi + 5\pi k = 3x$$

$$x = \pi \cdot \frac{(1+5k)}{3}$$

$$2\pi k \leq x < 2\pi k + \pi$$

$$2\pi k \leq \pi \cdot \frac{(1+5k)}{3} < 2\pi k + \pi$$

$$6k \leq 1+5k < 6k+3$$

$$k \leq 1 < k+3$$

$$-2 < k \leq 1$$

$$\text{Значим, } x \in \left\{ -\frac{4\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; 2\pi \right\}$$

$$\textcircled{2} x \in [2\pi k - \pi; 2\pi k) \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\arccos(\cos x) = 2\pi k - x$$

Значим, исходное уравнение становится:

$$2\pi = x + 5 \cdot (2\pi k - x)$$

$$4x = 10\pi k - 2\pi$$

$$x = \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot (5k - 1)$$

$$2\pi k - \pi \leq x < 2\pi k$$

$$2\pi k - \pi \leq \frac{\pi}{2} (5k - 1) < 2\pi k$$

$$4k - 2 \leq 5k - 1 < 4k$$

$$-2 \leq k - 1 < 0$$

$$-1 \leq k < 1$$

$$\text{Значим, } x \in \left\{ -3\pi; -\frac{\pi}{2} \right\}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ -3\pi; -\frac{4\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; 2\pi \right\}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача #4

$$ax + 2y - 3b = 0$$

$$(x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \quad (\Leftrightarrow)$$

$$\begin{cases} 2y = 3b - ax \\ x^2 + y^2 - 9 = 0 \\ x^2 + y^2 - 12x + 32 = 0 \end{cases} \quad (\Leftrightarrow)$$

$$\begin{cases} y = \frac{3b - ax}{2} \\ y^2 = \frac{9b^2 - 6abx + a^2x^2}{4} \\ \begin{cases} x^2 + y^2 - 9 = 0 \leftarrow \text{кв. ур.} \\ x^2 + y^2 - 12x + 32 = 0 \leftarrow \text{кв. ур.} \end{cases} \end{cases}$$

4 корня могут быть только тогда, когда у обеих искомых уравнений есть 2 различные корня, и их корни не совпадают.

Их корни не совпадают: $\begin{cases} x^2 + y^2 - 9 = 0 \\ x^2 + y^2 - 12x + 32 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 9 = 0 \\ 12x - 41 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 9 \neq 0 \\ x \neq \frac{41}{12} \end{cases}$

У 1-го есть 2 корня:

$$x^2 + \left(1 + \frac{a^2}{4}\right)x^2 - \frac{3ab}{2}x + \frac{9b^2}{4} - 9 = 0$$

$$D = \frac{9a^2b^2}{4} - 4 \cdot \left(1 + \frac{a^2}{4}\right) \cdot \left(\frac{9b^2}{4} - 9\right) = \frac{1}{4} \cdot (9a^2b^2 - (4+a^2)(9b^2 - 36)) = \frac{1}{4} \cdot (9a^2b^2 - 9a^2b^2 - 36b^2 - 36a^2 + 36 \cdot 4) = 36 - 9a^2 - 9b^2 > 0.$$

У 2-го есть 2 корня:

$$\left(1 + \frac{a^2}{4}\right)x^2 - \left(\frac{3ab + 24}{2}\right)x + \frac{9b^2}{4} + 32 = 0$$

$$D = \frac{9a^2b^2}{4} + \frac{2 \cdot 3ab \cdot 24}{4} + \frac{24^2}{4} - 4 \cdot \left(1 + \frac{a^2}{4}\right) \cdot \left(\frac{9b^2}{4} + 32\right) =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot (9a^2b^2 + 4 \cdot 4 \cdot 9ab + 24^2 - (4+a^2)(9b^2 + 128)) =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot (4 \cdot 4 \cdot 9ab + 24^2 - 4 \cdot 9b^2 - 128 \cdot a^2 - 128 \cdot 4) = 36ab + 9b^2 - 32a^2 + 16 \cdot 9 - 16 \cdot 8 =$$

$$= 36ab - 9b^2 - 32a^2 + 16 > 0.$$

~~$9b^2 > 36$~~ $\begin{cases} b^2 < 4 - a^2 \\ 9b \cdot (4a - b) > 32a^2 - 16 \end{cases}$

Значит, $a^2 < 4 \Leftrightarrow |a| < 2$

ЭВ: \rightarrow Корни: $b = \frac{36a^2 \pm 12\sqrt{4a^2 + 9}}{18}$

~~$9b^2 - 36ab + 32a^2 - 16 < 0$~~

$$D = (36a)^2 - 4 \cdot 9 \cdot (32a^2 - 16) = 36 \cdot (36a^2 - 32a^2 + 16) = 36 \cdot (4a^2 + 16) = 12^2 \cdot (a^2 + 4)$$

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача #5

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad (\log_3 x)^4 + \frac{6}{\log_3 x} = \frac{\log_x (3^5)}{2} - 8$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad (\log_3 x)^5 + 6 = \frac{5}{2} - 8 \log_3 x$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad 2(\log_3 x)^5 + 7 + \frac{16}{3} \log_3 x = 0$$

возрастающая ф-ция,
т.ч. нуля не имеет

$$\log_3^4 (5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8$$

$$\begin{cases} 5y > 0 \\ 5y \neq 1 \end{cases} \quad (\log_3 (5y))^4 + \frac{2}{\log_3 (5y)} = \frac{11 \log_{5y} (3)}{2} - 8$$

$$\begin{cases} 5y > 0 \\ 5y \neq 1 \end{cases} \quad (\log_3 (5y))^5 + 2 = \frac{11}{2} - 8 \log_3 (5y)$$

$$\begin{cases} 5y > 0 \\ 5y \neq 1 \end{cases} \quad 2(\log_3 (5y))^5 - 7 + 16 \log_3 (5y) = 0$$

возрастающая ф-ция.

* ф-ция на 0^+ отрицательная, на $+\infty$ положительная.

~~$$\log_3^4 (5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} 3^2$$~~

Заметим, что

если x - корень первого
ур-я, то $y = 3^{\frac{-\log_3 x}{5}} = \frac{1}{5^x}$

- корень второго, и

наоборот: если y - корень
второго, то $x = 3^{\frac{-\log_3 (5y)}{5}} = \frac{1}{5y}$ - корень первого.

Докажем это:

пусть $z = \log_3 x, v = \log_3 (5y)$

первое ур-е:

$$2z^5 + 16z + 7 = 0$$

второе:

$$2v^5 + 16v - 7 = 0$$

При замене $v = -z$ или $z = -v$
переходим в первое; при
замене $z = -v$ первое во второе.

Значит, попарно корни
каждого ур-я единственные
(слева возр. ф-ция, справа 0),
то если корень первого x ,
то корень второго $\frac{1}{5x}$.

$$xy = x \cdot \frac{1}{5x} = \frac{1}{5}$$

Ответ: $\frac{1}{5}$.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача #6, передел.

Рассчитаем для каждого значения $f(B)$ от 0 до 60.

кач-во подходящих пар (A, B) такая, что $f(A) - f(B) = 33$.

Это и будет ответ.

~~Эт~~ Выбрать B у нас есть

Пусть $f(B) = x$ тогда $f(A) = 33 + x$

Выбрать B у нас есть $K(x)$ способов.

Если $33 + x > 60$, то у нас 0 способов выбрать A ,
иначе так как $K(33 + x) = K(x)$.

Значит, ответ равен $\sum_{x=0}^{27} (K(x))^2 = \sum_{x=0}^9 (K(3x))^2 + \sum_{x=0}^8 (K(3x+1))^2 +$

$$+ \sum_{x=0}^8 (K(3x+2))^2 = 10 \cdot 15^2 + 9 \cdot 14^2 + 9 \cdot 14^2 + 10 \cdot 15^2 + 18 \cdot 14^2$$

$$= 2250 + 1764 \cdot 2 = 2250 + 3528 = 5778.$$


Ответ: 5778 способов

14
14

~~196~~

$$196 \cdot 9 =$$
$$= 1960 - 196$$

$$\begin{array}{r} 1960 \\ - 196 \\ \hline 1764 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача #6, начало.


$$\text{Пусть } f(A) = 3x(A) + y(A).$$

Нас ~~просят~~ просят посчитать кол-во целочисленных точек (A, B) в параллелограмме такие, что $f(A) - f(B) = 33$.

Заметим, что $\{M \mid f(M) = \text{const}\}$ — прямая $(3x + y = c \Leftrightarrow y = c - 3x)$,

с углом наклона -3 . При этом сторона PO нашего параллелограмма параллельна каждой из этих прямых,

$$\text{т.е. } f(P) = f(O) = 0.$$



Значит, целочисленные решения

$$f(A) = c \text{ будут лежать}$$

внутри параллелограмма, если

$$1) c \in [f(O); f(R)] = [0; 60]$$

$$2) y(A) \in [y(O); y(P)] = [0; 4] \text{ (т.к.)}$$

так как стороны PQ и OR параллельны оси Ox .

Посчитаем кол-во ~~таких~~ решений $f(A) = c$ внутри параллелограмма $(c \in [0; 60])$

~~или $f(A) = 3x + y = c, y \in [0; 4], x \in [0; 6]$~~ Пусть это кол-во будет $k(c)$.

$$y = c - 3x; \quad 3x + y = c, \quad y \in [0; 4]$$

$$y = c - 3x; \quad x \in \left[\frac{c}{3} - 4; \frac{c}{3} \right]. \quad \text{Значит, это кол-во}$$

равно кол-ву целых точек на $\left[\frac{c}{3} - 4; \frac{c}{3} \right]$, т.е. 15 при $c \div 3$,
иначе 14.

$$k(c) = \begin{cases} 15, & c \div 3 \\ 14 & \text{иначе} \end{cases}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>						



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 9) = 0 \\ x^2 + y^2 - 12x + 32 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 32 + 9 - 12x &= 0 \\ 41 &= 12x \\ x &= \frac{41}{12} \end{aligned}$$

$$y = \frac{3b - ax}{2}$$

$$\left| \frac{3b - ax}{2} \right| < 2$$

~~g~~

$$(x^2 + t - 9) = 0$$

$$t < 9$$

$$x^2 + t - (2x + 32) = 0$$

$$D/4 = 36 - 32 - t = 4 - t$$

$$t < 4$$

$$t < 4$$

$$y^2 = \frac{9b^2 - 6abx + a^2x^2}{4}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{aligned} x+y &= a \\ xy+z &= b \\ x+z &= c \end{aligned}$$

$$x+y+z = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\frac{9+14+19}{2} = \frac{23+19}{2} = \frac{42}{2} = 21$$

$x = 5$

$$\frac{2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{27}}{}$$

$$\frac{10+13+18}{2} = \frac{10+31}{2} = \frac{41}{2} = 20,5$$



$$a = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$b = 2^2 \cdot 3^2$$

$$c = 2^3 \cdot 3^{11} \cdot 5^{16/7}$$

$$3 \cdot 3 + 11$$



$$\frac{10+13+30}{2} = \frac{40+3}{2} = \frac{53}{2} = 26,5 (27)$$



C

$$\frac{\sqrt{3}x^2}{2x} = \frac{\sqrt{3}x}{2}$$

B



$$\frac{a'}{b'} = \frac{\sqrt{a^2 - h^2}}{\sqrt{b^2 - h^2}} = \frac{1}{3}$$

$$\sqrt{b^2 - h^2} = 3\sqrt{a^2 - h^2}$$

$$b^2 - h^2 = 9a^2 - 9h^2$$

$$b^2 = 9a^2 - 8h^2$$

$$9a^2 - b^2 = \frac{8a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\begin{aligned} 9x - y &= \frac{8xy}{x+y} \\ 9x^2 + 9xy - yx - y^2 &= 8xy \\ 9x^2 &= 2y^2 \\ 3x &= y \end{aligned}$$

$$b = a\sqrt{3}$$

$$h = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

9a

$$9a^2 - b^2 = \frac{8a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$x > 0 \quad x \neq 1$$

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_x^2 (243) - 8$$

$$(\log_3 x)^4 + 6 \log_x 3 = \frac{\log_x 243}{2} - 8$$

$$2t = 3^5$$

$$\log_3 x = t$$

$$a^t = b$$

$$b^{1/t} = a$$

$$\left(\frac{1}{\log_x 3}\right)^4 + 6 \log_x 3$$


$$(\log_3 x)^4 + \frac{6}{(\log_3 x)} = \frac{2 \cdot 15}{\log_3 x} - 8$$

$$t^4 + \frac{6}{t} = \frac{10}{t} - 8$$

$$t^5 + 6 - 10 + 8t = 0$$

$$t^5 + 8t - 4 = 0$$

$$t^5 = 4 - 8t$$



$$\frac{1}{\sqrt{3x}} + \frac{\sqrt{3x}}{2} = \frac{1+3x^2}{2\sqrt{3x}}$$

$$5t^5 + 30 - 2 + 40t = 0$$

$$5t^5 = 28 - 40t$$

$$\log_3(5y)^4 + \frac{2}{\log_3(5y)} = \frac{4 \log_3 5y (3^{11})}{2} - 8$$

$$(\log_3 x)^4 + 6 \log_x 3 = \log_x^2 (243) - 8$$

$$(\log_3 x)^4 + \frac{6}{\log_3 x} = \frac{\log_x 243}{2} - 8$$

$$(\log_3 x)^4 + \frac{6}{\log_3 x} = \frac{5 \log_x 3}{2} - 8$$

$$t^4 + \frac{6}{t} = \frac{5}{2t} - 8$$

$$2t^5 + 12 - 5 + 16t = 0 \quad \frac{1}{16}, 1$$

$$2t^5 = 16t - 7 \quad -16t - 7$$

$$-2t^5 = 16t + 7$$

$$2(x + \log_3 5)$$

$$x = \log_3 3$$

$$2 \cdot (\log_3 3)^5$$

$$2 \log_3(5y)^4 + \frac{4}{\log_3(5y)} = \frac{11}{\log_3(5y)} - 16$$

$$2u^5 + 4u - 11u + 16u = 0$$

$$\begin{cases} 2u^5 + 7 + 16u = 0 \\ 2t^5 - 7 + 16t = 0 \end{cases}$$

$$u = t \quad 2u^5 + 16u + 7 = 0$$

$$2x^5 + 16x = 7$$

$$2x^5 + 16x - 7 = 0$$

$$x \approx \frac{7}{16}$$

$$u + t = 0$$

