



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^9 3^{10} 5^{10}$, bc делится на $2^{14} 3^{13} 5^{13}$, ac делится на $2^{19} 3^{18} 5^{30}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 3 : 1$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 \quad \text{и} \quad \log_3^4(5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-14; 42)$, $Q(6; 42)$ и $R(20; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 90, $SA = BC = 12$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1, BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№1 $a, b, c \in \mathbb{N}$

$$ab : 2^9 3^{10} 5^{10}$$

$$bc : 2^{14} 3^{13} 5^{13}$$

$$ac : 2^{19} 3^{18} 5^{30}$$

т.к. $a, b, c \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow Q = abc$ и $Q \in \mathbb{N}$

$$ab = k_1 \cdot 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10}$$

$$k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 28 \\ 14 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 28 \\ 13 \\ \hline 41 \end{array}$$

$$bc = k_2 \cdot 2^{14} \cdot 3^{13} \cdot 5^{13}$$

$$ac = k_3 \cdot 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30}$$

$$ab \cdot bc \cdot ac = a^2 b^2 c^2 = 2^{9+14+19} \cdot 3^{10+13+18} \cdot 5^{10+13+30} \cdot k_1 k_2 k_3$$

$$= 2^{42} \cdot 3^{41} \cdot 5^{48} k_1 k_2 k_3$$

т.к. все натуральные
но все положительные

$$\Rightarrow abc = \sqrt{a^2 b^2 c^2} \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2^{42} \cdot 3^{41} \cdot 5^{48} k_1 k_2 k_3} = 2^{21} \cdot 3^{20} \cdot 5^{24} \sqrt{3 k_1 k_2 k_3}$$

$\Rightarrow$ наименьшее натуральное значение

$$\sqrt{3 k_1 k_2 k_3} \text{ это } 3 \text{ например } \sqrt{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1} = 3$$

$$k_1 = 1 \quad k_2 = 3 \quad k_3 = 1 \Rightarrow \sqrt{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1} = 3$$

$\Rightarrow$ наименьшее значение

$$abc = 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{24}$$

$$\text{Ответ: } 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{24}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№7.



$$EF \parallel AB \Rightarrow FE \perp CD$$

$$\omega: \omega - \text{касается в } CD = T.O$$

$$\omega \cap CD = F$$

$$\omega \cap AC = E$$

$$\angle EFD = 90^\circ$$

$\Rightarrow$ ~~продолжить~~ F

восстановим перпен.

уг. т. B и CB

т.е. Окруж. касаемая в т. B но
эти высота будет радиусом.

пусть $FD \cap \omega = T$

$$\Rightarrow \angle EFT = 90^\circ$$



и вписанный

$\Rightarrow ET$ - диаметр.

т.о центр окружности.

$\Rightarrow$ т.о лежит на перпен. к BC
и делит ET пополам $FO = EO$ т.е. радиус

$\Rightarrow$ т.о лежит на сер.пер. к EF
построим его. OH - сер.пер. к EF



$$a^2 = t(t + \dots)$$

$$\begin{aligned} z &= y \cdot 4x \\ ab &= 3x \cdot h \\ a^2 + b^2 &= 16x^2 \\ a^2 &= \\ ab &= 4\sqrt{3}x^2 \\ (a+b)^2 &= \end{aligned}$$

$$R \cos x = x + y$$

$\triangle CEF \sim \triangle ABC$ по двум углам

$$\Rightarrow \frac{S_{CEF}}{S_{ABC}} = k^2 = \left(\frac{CF}{CB}\right)^2$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№ 2 (продолжение)

по теореме о касательной и секущей

$$CB^2 = CF \cdot FT$$

$$\frac{CF}{CB^2} = \frac{1}{FT} \Rightarrow \left(\frac{CF}{CB}\right)^2 = \frac{CF}{FT}$$

пусть $EF = y$ и BF пересечен ω в т. L

тогда $BL = 2x + y$ т.к. ~~мы~~ $\Rightarrow$ то следует из

интерпретации EF BL
т.к. они выис ома
PIR

$$\Rightarrow DL = x + y$$

$$FT^2 + EF^2 = 4R^2$$

$$FD \cdot DT = DB \cdot DL = x(x + y)$$

$$FD = x\sqrt{3} - CF$$

$$\frac{y}{2} + x = R \cos \kappa = R \frac{CA}{4x} = R \frac{\sqrt{16x^2 - CB^2}}{4x}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№3

$$5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$5 \arcsin(\sin(\frac{\pi}{2} - x)) = x + \frac{\pi}{2}$$

0.13

$$y = \arcsin x, \quad y \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \quad \text{и} \quad x \in [-1; 1]$$

$$\Rightarrow \text{т.к. } (\sin(\frac{\pi}{2} - x)) \in [-1; 1] \quad \Rightarrow 5y \in [\frac{5\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}]$$

$$\text{но } \underline{\text{знаем}} \quad \varphi = \frac{\pi}{2} - x \quad \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq x + \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2}$$

$$x \in [-3\pi; 2\pi]$$

$$\text{Пусть } x = t + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad t \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$$

$$\Rightarrow 5 \arcsin(\sin(\frac{\pi}{2} - t - 2\pi k))$$

$$\arcsin(\sin \varphi) = \varphi \quad \text{при } \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{Значит } \varphi = \varphi_0 + 2\pi n \quad \text{иногда } \varphi_0 \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{но } \arcsin(\sin \varphi) \text{ берем } \varphi_0 \quad \text{т.е.}$$

$$\arcsin(\sin(\varphi_0 + 2\pi k)) = \varphi_0$$

$$\Rightarrow 5 \arcsin(\sin(\frac{\pi}{2} - t - 2\pi k)) = t + 2\pi k + \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{5\pi}{2} - 5t = t + 2\pi k + \frac{\pi}{2}$$

$$6t = 2\pi - 2\pi k \quad t = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi k}{3}$$

$$x = t + 2\pi k = \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{т.к. } x \in [-3\pi; 2\pi]$$

$$\text{но } x = \frac{\pi}{3}; \quad x = 2\pi \quad x = -\frac{4}{3}\pi \quad x = -\frac{9}{3}\pi = -3\pi$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{3}; \quad 2\pi; \quad -\frac{4}{3}\pi; \quad -3\pi$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№ ~~13~~ 14. а

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \quad (1) \end{cases}$$

Реш (1)

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 9 = 0 \quad (1.1) & (1.1) \quad x^2 + y^2 = 9 & \text{— ур. Окр.} \\ x^2 + y^2 - 12x + 32 = 0 \quad (1.2) & & \text{с центром } (0, 0) \\ & & \text{и радиусом } 3 \end{cases}$$

(1.2)

$$x^2 - 12x + 36 + y^2 - 36 + 32 = 0$$

$$(x - 6)^2 + y^2 = 4 \quad \text{— ур. окр. с центром } (6, 0) \\ \text{и радиусом } 2$$

$$ax + 2y - 3b = 0 \quad y = -\frac{a}{2}x + \frac{3}{2}b$$

$$y = Ax + B \quad A = -\frac{a}{2} \quad B = \frac{3}{2}b$$

узок прямой который ездит вверх вниз
с данным коэфф А — зависит только от а
и коэфф В — зависит только от b

⇒ Для фиксированного параметра В
у узка общая точка (0; B)

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



14 (продолжение)

$$\sin x = \frac{5}{6} \quad \cos x = \sqrt{1 - \frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{11}}{6}$$

$$\Rightarrow \operatorname{tg} x = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{\sqrt{11}}{6}} = \frac{5\sqrt{11}}{11}$$

$$A_2 = \operatorname{tg} x = \frac{5\sqrt{11}}{11} \quad \Rightarrow A_1 = -A_2 = -\frac{5\sqrt{11}}{11}$$

$$A \in (-\frac{5\sqrt{11}}{11}; \frac{5\sqrt{11}}{11})$$

$$-\frac{5\sqrt{11}}{11} \leq -\frac{a}{2} \leq \frac{5\sqrt{11}}{11}$$

$$\frac{10\sqrt{11}}{11} \geq a \geq -\frac{10\sqrt{11}}{11}$$

Ответ: $a \in (-\frac{10\sqrt{11}}{11}; \frac{10\sqrt{11}}{11})$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№5

$$1) \log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8$$

$$2) \log_3^4 (5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3'') - 8$$

$$1) \log_3^4 x + 6 \frac{1}{\log_3 x} = \frac{1}{2} \cdot 5 \log_x 3 - 8$$

Заменим $t = \log_3 x$

$$\log_x 3 = \frac{1}{\log_3 x} = \frac{1}{t}$$

$$t^4 + \frac{6}{t} = \frac{5}{2t} - 8$$

$$t^4 + \frac{4}{t} + 8 = 0$$

$$t^5 + 8t + 4 = 0$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 8 \ 4$$

Анализ

$$2) \log_3^4 (5y) + \frac{2}{\log_3 5y} = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{\log_3 5y}} - 8$$

Пусть $xy_1 = A \Rightarrow \log_3 xy_1 = \log_3 A$ $\log_3 x + \log_3 y_1 = \log_3 A$

Если $y_1 = 5y$

то $5xy = A \Rightarrow xy = \frac{A}{5}$

$\Rightarrow \log_3 x + \log_3 y_1 = \log_3 A$ но при этом $xy = \frac{A}{5}$

$\Rightarrow$ придем к такому выводу

где $x = x$ а $y_1 = 5y$

а какому A все возможные A

Заменим $a = \log_3 x$ $b = \log_3 5y$ $a \neq 0, b \neq 0$

$$\begin{cases} a^4 + \frac{6}{a} = \frac{25}{a} - 8 \\ b^4 + \frac{2}{b} = \frac{55}{b} - 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^5 + 8a + 4 = 0 \\ b^5 + 8b - \frac{7}{2} = 0 \end{cases}$$

$$2 - \frac{1}{2} = -\left(6 - \frac{8}{3}\right)$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№5 (продолжение)

$$a^5 + 8a + \frac{7}{2} = 0$$

$$b^5 + 8b - \frac{7}{2} = 0$$

$$\oplus \quad a^5 + b^5 + 8(a+b) + \frac{7}{2} = 0$$

$$(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) + 8(a+b) = 0$$

$$\Rightarrow a+b = 0$$

и вторая скобка всегда больше 0

$$\Rightarrow \log_3 x + \log_3 sy = \log_3 1$$

$$\log_3 sxy = \log_3 1$$

$$xy = \frac{1}{s}$$

$$\text{Ответ: } xy = \frac{1}{s}$$

~~$x = \frac{1}{s}$~~
 ~~$y = \frac{1}{s}$~~
 ~~$y = -\frac{1}{s}$~~
 ~~$x = -\frac{1}{s}$~~

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N 6

$O(0;0)$; $P(-14;42)$; $Q(6;42)$; $R(20;0)$

$A(x_1; y_1)$; $B(x_2; y_2)$



$$3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$$

$$3(x_2 - x_1) + y_2 - y_1 = 33$$

$$\vec{C} = \vec{B} - \vec{A} = \{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$$

$$\vec{A} = \{x_1; y_1\} \quad \vec{B} = \{x_2; y_2\}$$

$$\vec{C} = \vec{B} - \vec{A}$$

$$y = y_2 - y_1$$

$$x = x_2 - x_1 \Rightarrow y = -3x + 33$$

Найдем функции проходящие стороны
параллелограмма.

$$y_{QR} : \Delta x = 6 - 20 \quad \Delta y = 42$$

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = -3$$

$$y_{QR} = -3x + b$$

$$0 = -3 \cdot 20 + b \quad b = 60$$

$$y_{PO} = -3x$$

$$y_{QR} = -3x + 60$$

$$y_{PQ} = 42$$

$$y_{OR} = 0$$

$$y = -3x + 33$$

$$(3 \cdot 14)^2 + 14^2 = 14^2 \cdot 10$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№ 6 (продолжение)

~~Каждо найми кои-во~~


$$\frac{\partial}{\partial t} \text{const} \quad \vec{A} \{x_1, y_1\} \quad \vec{B} \{x_2, y_2\}$$

$$C = \tilde{B} - A = \begin{Bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{Bmatrix}$$

Каждо намери кол-во нар векторов $\vec{A}$ и $\vec{B}$ лежащи в плоскостта на паралел.

матриц $\tilde{C} = B - A^T$

Вершина с координатами $\vec{C}$ лежит на прямой $y = -3x + 33$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



№ 7 SABC



$$S_{ABC} = 90$$

$$SP = QM$$

$$SA = SC = 12$$

Можно найти
пересечение диаметра
2:1 считая от вершины

$$S = 90 = \frac{SC \cdot h}{2} \Rightarrow h = \frac{90 \cdot 2}{12} = 15$$


$$AA_1 = \sqrt{\frac{2c^2 + 2b^2 - a^2}{2}}$$

$$BB_1 = \sqrt{\frac{2c^2 + 2a^2 - b^2}{2}}$$

$$CC_1 = \sqrt{\frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{2}}$$

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin \angle A}{2}$$

Нарисуем сечение пирамиды плоскостью AAS



$$SA = 12$$

по т. о кас. и секущей

$$SL^2 = SP \cdot SQ$$

$$MK^2 = MQ \cdot MP$$

$$MQ = SP \quad QP \text{ — диаметр}$$


$$\Rightarrow SL^2 = MK^2 \Rightarrow MK = SL$$

$$LA = AK$$

$$LA + SL = AK + MK = 12$$

$$\Rightarrow MA = SA = 12 \Rightarrow A, M = 6 \Rightarrow AA_1 = 18$$

Нарисуем основание



$$BA_1 = 6$$

$$AA_1^2 = AA_1^2 - HA^2$$

$$\Rightarrow HA_1 = \sqrt{(3 \cdot 6)^2 - 3 \cdot 5^2} = 3\sqrt{11}$$

МН

проведем МН, — высоту на ВС из т. М

$$\Rightarrow MH_1 = \frac{1}{3} AH = 5$$

$$HA_1 = \sqrt{36 - 25} = \sqrt{11} \Rightarrow BH_1 = 6 - \sqrt{11}$$

$$H_1C = 6 + \sqrt{11}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№ (продолжение).

$$BM^2 = BH_1^2 + H_1M^2 = (6 - \sqrt{11})^2 + 25 = 36 - 12\sqrt{11} + 11 + 25 = 72 - 12\sqrt{11} \quad \text{③}$$

$$CM^2 = CH_1^2 + H_1M^2 = (6 + \sqrt{11})^2 + 25 = 36 + 12\sqrt{11} + 11 + 25 = 72 + 12\sqrt{11}$$

$$BD_1 = \frac{3}{2} BM = \frac{3}{2} \sqrt{72 - 12\sqrt{11}} = 3\sqrt{3(6 - \sqrt{11})}$$

$$CC_1 = \frac{3}{2} CM = \frac{3}{2} \sqrt{72 + 12\sqrt{11}} = 3\sqrt{3(6 + \sqrt{11})}$$


$$AA_1 \cdot BD_1 \cdot CC_1 = 18 \cdot 3\sqrt{3(6 + \sqrt{11})} \cdot 3\sqrt{3(6 - \sqrt{11})} =$$

$$= 9 \cdot 9 \cdot 2 \sqrt{3 \cdot 3 (6 + \sqrt{11})(6 - \sqrt{11})} = 9 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 3 \sqrt{36 - 11} =$$


$$= 30 \cdot 81 = 2430$$

а) Ответ: 2430


б)



6 м-м HA_1S



Продлим SN до пересечения с BC в Q
в м-м SAQ



$SN = SL$ — как касательные из
одной точки

$$\Rightarrow LA = 12 - SL = 8$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



N3

$$5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$$

2π

$$5 \frac{\pi}{2} = 2\pi + \frac{\pi}{2}$$

$\cos x \in [-1; 1] \Rightarrow$ ограниченности на x нем.

Пусто

$$\cos x \geq 0$$

$$\cos x = \frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\sin x = \frac{b}{c} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\arcsin(\sin x) = x$$

$$\sin x = \cos x$$

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\Rightarrow 5 \arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$5\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$f(y) = \arcsin(y)$$

$$y \in [-1; 1]$$

$$F(f) : f(y) \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\Rightarrow \exists f(y) = 5 \arcsin(y) \quad f(y) \in \left[-\frac{5\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right]$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

$$-\frac{5\pi}{2} \leq x + \frac{\pi}{2} \leq \frac{5\pi}{2}$$

$$-3\pi \leq x \leq 2\pi$$

$$\Rightarrow \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$



$$5 \arcsin(\cos x) = 5 \arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = 5\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

8x

$$5\frac{\pi}{2} - 5x = x + \frac{\pi}{2}$$

$$6x = 2\pi \quad x = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{\pi}{3}$$



$$\frac{5\pi}{2} - 5y = y + 2\pi k + \frac{\pi}{2}$$

$$6y = 2\pi + 2\pi k$$

$$y = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3}k$$

$$x = \frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{3}k + 2\pi k =$$

$$= \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3}k$$

