МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 9

1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{14}7^{10}$, bc делится на $2^{17}7^{17}$, ac делится на $2^{20}7^{37}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc.

2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь
$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}.$$
При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω, хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 7$. Найдите длину AB, если известно, что радиусы ω и Ω равны 1 и 5 соответственно.

4. [5 баллов] Решите уравнение
$$\sqrt{2x^2-5x+3}-\sqrt{2x^2+2x+1}=2-7x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-12;24)$, $Q(3;24)$ и $R(15;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2-2x_1+y_2-y_1=12$.

6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a, для каждого из которых найдётся значение параметра b, при котором система
$$\begin{cases} ax-y+10b=0, \\ \left((x+8)^2+y^2-1\right)\left(x^2+y^2-4\right) \leqslant 0 \end{cases}$$
имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B. Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC, если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответсвенно равны 4,5 и 2.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

№1

$a, b, c \in \mathbb{N}$

$ab \,\vdots\, 2^{14}\cdot 7^{10}$

$bc \,\vdots\, 2^{17}\cdot 7^{17}$

$ac \,\vdots\, 2^{20}\cdot 7^{37}$

abc – мин. – ?

a, b и c должны состоять только из простых множителей 2 и 7, чтобы abc было минимал., т.к. иначе другие множит. не повлияют на выполн. услов. к a, b и c, не повлияют на abc, точнее – увеличат. (т.к. любой прост. множ. > 1)

Лучший вариант: (т.к. ab, bc и ac ≠ 0, т.к. a, b, c ∈ N)

$$\begin{cases} 1\cdot ab = 2^{14}\cdot 7^{10} \\ 1\cdot bc = 2^{17}\cdot 7^{17} \\ 1\cdot ac = 2^{20}\cdot 7^{37} \end{cases}$$

: (т.к. $b \neq 0$, $a \neq 0$)

$$\begin{cases} \frac{c}{a} = 2^{3}\cdot 7^{7} \\ ac = 2^{20}\cdot 7^{37} \end{cases}$$

$c^2 = 2^{23}\cdot 7^{44}$

это невозможно т.к. $\sqrt{2^{23}} \notin \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ Представим
$$\begin{cases} a = 2^{x}7^{y} \\ b = 2^{z}\cdot 7^{f} \\ c = 2^{e}\cdot 7^{g} \end{cases}$$
, где $x, y, z, f, e, g \in \mathbb{N}$ или $=0$

$$\begin{cases} 2^{x}7^{y}\cdot 2^{z}\cdot 7^{f} = 2^{14}\cdot 7^{10}\cdot 2^{k}\cdot 7^{l} \\ 2^{z}\cdot 7^{f}\cdot 2^{e}\cdot 7^{g} = 2^{17}\cdot 7^{17}\cdot 2^{u}\cdot 7^{u} \\ 2^{x}\cdot 7^{y}\cdot 2^{e}\cdot 7^{g} = 2^{20}\cdot 7^{37}\cdot 2^{o}\cdot 7^{r} \end{cases}$$

т.к. лучший вариант невозможен, то для рав-ва домножим на 2 и 7 в нуж. степ.; т.к., что $k, l, u, u, o, r \in \mathbb{N}$ или $=0$

$\Leftrightarrow$
$$\begin{cases} x+z = 14+k \\ y+f = 10+l \\ z+e = 17+u \\ f+g = 17+u \\ x+e = 20+o \\ y+g = 37+r \end{cases}$$

, а $abc = 2^{x}7^{y}\cdot 2^{z}\cdot 7^{f}\cdot 2^{e}\cdot 7^{g} = 2^{x+z+e}\cdot 7^{y+f+g}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

№1 (продолжение)

$$\begin{cases} x+z=14+k \\ y+f=10+l \\ z+e=17+m \\ f+g=17+n \\ x+e=20+o \\ y+g=37+r \end{cases}$$

k, l, m, n, o, r — наименьш. подходящ. числа

Найти

$2^{x+z+e}\cdot 7^{y+f+g}$

$$\begin{cases} x+z\geq 14 \\ y+f\geq 10 \\ z+e\geq 17 \\ f+g\geq 17 \\ x+e\geq 20 \\ y+g\geq 37 \end{cases}$$

А как помним, это все $\mathbb{Z}$ числа

$y-f\geq 20$
$y+f\geq 10$
$2y\geq 30$
$y\geq 15$
$y=15$ (наим.)

$g\geq 37-y$
$g\geq 22$
$g=22$ (наим.)
$f+g\geq 17$
$f\geq -5$
$f=0$ (наим.)

$y+g+f=37$

$x-z\geq 3$
$x+z\geq 14$
$2x\geq 17$
$x\geq 8{,}5$
$\Rightarrow x=9$ (наим. x)
$9+z\geq 14$
$z\geq 5$
$z=5$ (наим. z)

$5+e\geq 17$
$e\geq 12$
$e=12$ (наим. e)

$x+z+e=14+12=26$

$\Rightarrow$ Ответ: $2^{26}7^{37}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№2

$\frac{a}{b}$ - несократима $\Rightarrow$ НОД $(a,b) = 1$

$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}$$

можно сократить на m

$\Rightarrow$ А у нас a и b - взаимно прост., т.к. НОД $(a;b)=1$

$a^2-6ab+b^2=$

$=2a^2-4ab+2b^2-(a^2+2ab+b^2)=$

$=2(a-b)^2-(a+b)^2$

или

$a^2-6ab+b^2=$

$=a^2+2ab+b^2-8ab=(a+b)^2-8ab$

Пусть $a+b=m\cdot x$, где $m, x \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \frac{m\cdot x}{(mx)^2-8ab}=\frac{m\cdot x}{m^2\cdot x^2-8ab}$$

$\Rightarrow$ чтобы сократить на m надо, чтобы $8ab \vdots m$

$\Rightarrow \begin{cases} a+b=xm \not\vdots a \\ a+b=xm \not\vdots b \end{cases}$

$\Rightarrow a \not\vdots m$

$b \not\vdots m$

$\Rightarrow 8ab \vdots m$

$\Rightarrow$ макс. $m=8$, т.к. a, b и m не им. общ. простых множит.

$\Rightarrow$ Ответ: $m=8$.

Заметим, что сумма взаимно простых чисел $\not\vdots$ на каждое из них, ведь чтобы сумма дел. $(\vdots)$ на y, надо чтобы каждое слагаемое дел. $(\vdots)$ на y.

№3



Провед. OC – рад. в т. касан.

⇒ $OC \perp AB$ (как рад. провед. в т. касан.)

Провед. O_1O, O_1B и O_1A – рад. Ω

Соед. AO, OB и CO,

Провед. $O_1H \perp AB$ (т. $H \in AB$)

$AC : CB = 7$

т. C – т. касан.

$R_\omega = 1 = r$

$R_\Omega = 5 = R$

введ. обознач.

AB – ?

Пусть $CB = x$, тогда

$AC = 7x$

O_1H – высота в р/б $\triangle O_1AB$ ($O_1A = O_1B$ как рад. одной окр-ти) явл. мед. и биссектр.

$\Rightarrow HA = HB = \frac{AB}{2} = \frac{AC+CB}{2} = \frac{8x}{2} = 4x$

Пусть $AO \cap \omega =$ т. K

$OB \cap \omega =$ т. L

Тогда по св-ву касат. и секущ.

$AC^2 = AK\cdot(AK+2r)$

$BC^2 = BL\cdot(BL+2r)$

$49x^2 = AK^2 + 2AK$

$x^2 = BL^2 + 2BL$

$AK_{1,2} = \frac{-2\pm\sqrt{4+4\cdot 49x^2}}{2} = -1\pm\sqrt{1+49x^2} > 0$

$\Rightarrow AK = -1+\sqrt{1+49x^2}$

$BL_{1,2} = \frac{-2\pm\sqrt{4+4x^2}}{2} = -1\pm\sqrt{1+x^2} > 0$

$\Rightarrow BL = -1+\sqrt{1+x^2}$

$\Rightarrow OA = r + AK = \sqrt{1+49x^2}$

$OB = r + BL = \sqrt{1+x^2}$

⇒ из $\triangle AOB$: (по т. косин.)

$$\cos\angle AOB = \frac{OA^2+OB^2-AB^2}{2\,OA\cdot OB} = \frac{\overbrace{1+49x^2+1+x^2-64x^2}^{2-14x^2}}{2\sqrt{1+49x^2}\cdot\sqrt{1+x^2}} = \frac{1-7x^2}{\sqrt{1+49x^2}\cdot\sqrt{1+x^2}}$$

Заметим, что

$\angle AOB = \frac{\smile AB}{2} = \frac{360-\angle AO_1B}{2} = 180 - \frac{\angle AO_1B}{2}$

$\cos\angle AOB = \cos\left(180 - \frac{\angle AO_1B}{2}\right) = -\cos\frac{\angle AO_1B}{2}$

($\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

$\Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{\frac{\cos 2\alpha - 1}{2}}$)

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

№3 (продолжение)

$\Rightarrow \cos\angle\frac{AO_1B}{2} = -\cos\angle AOB$

Заметим, что O_1H - бисс. (выше док-но)

$\Rightarrow \angle AO_1H = \frac{\angle AO_1B}{2}$

$\Rightarrow \cos\angle AO_1H = -\cos\angle AOB$

Я $\triangle AO_1H$ - пр/уг

$\Rightarrow \cos\angle AO_1H = \frac{O_1H}{AO_1}$

$\frac{O_1H}{AO_1} = \frac{7x^2-1}{\sqrt{1+49x^2}\sqrt{1+x^2}} = \frac{OH}{5}$

$OH = \frac{35x^2-5}{\sqrt{1+49x^2}\sqrt{1+x^2}}$

По т. Пифагора из $\triangle AHO_1$

$AO_1^2 = AH^2 + O_1H^2$

$25 = 16x^2 + \frac{25(7x^2-1)^2}{(1+49x^2)(1+x^2)}$

$\frac{(-25+16x^2)(1+50x^2+49x^4)+25(7x^2-1)^2}{(1+49x^2)(1+x^2)} = 0$

$\cancel{-25} \underbrace{-25\cdot 50x^2} \cancel{-25\cdot 49x^4} \underbrace{+16x^2} + 16\cdot 50x^4 + 16\cdot 49x^6 \cancel{+25\cdot 49x^4} \underbrace{-50\cdot 7x^2} \cancel{+25} = 0 \quad |: x^2 \ (x \neq 0)$

$16\cdot 49x^4 + 16\cdot 50x^2 - 32\cdot 50+16 = 0 \quad |: 16$

$49x^4 + 50x^2 - 100+1 = 0$

$49x^4 + 50x^2 - 99 = 0$

$x^2_{1,2} = \frac{-50 \pm \sqrt{2500+49\cdot 99\cdot 4}}{49\cdot 2} = \frac{-25 \pm \sqrt{625+49\cdot 99}}{49} > 0$

$49 \cdot 99$: 441, 441, 4851, $+625$, 5476

$5476 \mid 74$: 49, 576, 576, 0

$x^2 = \frac{-25+\sqrt{74^2}}{49} = \frac{-25+74}{49} = \frac{49}{49} = 1$

$x = 1$

$\Rightarrow AB = 8x = 8$

Ответ: 8.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$$\sqrt{2x^2-5x+3}-\sqrt{2x^2+2x+1}=2-7x$$

$$\sqrt{2x^2-5x+3}=\sqrt{2x^2+2x+1}+(2-7x) \quad \Big| \cdot {}^\wedge 2$$

$$2x^2-5x+3=2x^2+2x+\cancel{1}+2(2-7x)\sqrt{2x^2+2x+1}+\cancel{4}-28x+49x^2$$

$$\cancel{2x^2}-5x+3-\cancel{2x^2}-2x-1-4+28x-49x^2=2(2-7x)\sqrt{2x^2+2x+1}$$

$$-49x^2+21x-2=2(2-7x)\sqrt{2x^2+2x+1} \quad \Big| {}^\wedge 2$$

$$-\left((7x)^2-14x+1-7x+1\right)=-\left((7x-1)^2-(7x-1)\right)=-\left((7x-1)(7x-1-1)\right)$$

$$-(7x-1)(7x-2)+2(7x-2)\sqrt{2x^2+2x+1}=0$$

$$(7x-2)\left(2\sqrt{2x^2+2x+1}-(7x-1)\right)=0$$

$$x=\frac{2}{7} \qquad 2\sqrt{2x^2+2x+1}=7x-1 \ \Big|{}^\wedge 2 \quad \text{и} \quad 7x-1\geq 0 \quad 7x\geq 1$$

$$4(2x^2+2x+1)=49x^2-14x+1$$

$$8x^2+8x+\cancel{4}-49x^2+14x-\cancel{1}=0 \ \Big| \cdot(-1)$$

$$41x^2-22x-3=0$$

$$x_{1,2}=\frac{11\pm\sqrt{121+41\cdot 3}}{41}$$

~~нет корней~~

$$\begin{array}{r} 123 \\ +121 \\ \hline 244 \end{array}$$

$$x_{1,2}=\frac{11\pm\sqrt{244}}{41}$$

Проверим

$7(11+\sqrt{244})\geq 41$

$77+7\sqrt{244}\geq 41$

$7\sqrt{244}\geq -36$

верно

$7(11-\sqrt{244})\geq 41$

$-7\sqrt{244}\geq -36$

$-7\cdot 15<-36$

$\Rightarrow -7\sqrt{244} \not\geq -36$

неверно

$\Rightarrow$ Ответ: $\frac{11+\sqrt{244}}{41}$; $\frac{2}{7}$.

~~Ответ: $\frac{2}{7}$.~~

Проверим $x=\frac{2}{7}$

$$\sqrt{2\cdot\frac{4}{49}-\frac{10}{7}+3}-\sqrt{2\cdot\frac{4}{49}+\frac{4}{7}+1}=0$$

$$\sqrt{\frac{8}{49}+\frac{11}{7}}=\sqrt{\frac{8}{49}+\frac{11}{7}}$$

$\to 0$ $\to 0$

верно

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 ~~5~~ 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№5



Обознач. т. S и т. K

$\Rightarrow 2(x_2-x_1)+(y_2-y_1)=12$

$(y_2-y_1)\in(-24;24)$

$(x_2-x_1)\in(-15;15)$

$2(x_2-x_1)\in(-30;30)$

$2x_2-2x_1+y_2-y_1=12$

$x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{Z}$

т.к. $x_2, x_1 \in \mathbb{Z}$

то $2(x_2-x_1)$ – чётное число $\in(-30;30)$

Ч + Н. $\neq$ Ч. Ч + Ч = Ч

$\Rightarrow (y_2-y_1)$ – чётное число $\in(-24;24)$

$\Rightarrow y_2, y_1$ – одной чётности

$2(x_2-x_1)$ ~~...~~ $-(y_2-y_1)+12$

При $(y_2-y_1)=24$

$2(x_2-x_1)=-12$ $\quad 2(x_2-x_1)\in(-12;30)$

$2(x_2-x_1)$	-12	-10	-8	-6	-4	-2
x_2-x_1	-6	-5	-4	-3	-2	-1
y_2-y_1	24	22	20	18	16	14
				max 15 и 7	15 и 9	15 и 11

$y_2 \in PQ$

$y_1 \in OR$

x_2 до Q

x_1 до O

$x_1 \in$
$Q+6=3+6=9$
до O

$\Rightarrow$ 9 пар

При нечёт. y кол-во пар на 1 меньше, чем на чёт. рядах

А на чёт. ряд. одинаково из-за пар-ми

При сниж. y_2-y_1 на 2
(x_2-x_1) увел. на 1
Это с двух сторон
$\Rightarrow$ увелич. кол-во на 2

13 на чёт ряду
5 рядов
$13\cdot3+12\cdot2=$
$=39+24=\boxed{63}$

11 и 3
на чёт ряду, кол-во рядов
$11+10+11=\underline{32}$ пар

$15\cdot4+14\cdot3=$
$=60+42=\boxed{102}$

$15\cdot5+14\cdot4=$
$=75+56=\boxed{131}$

$\boxed{15\cdot6+14\cdot5}$

$2(x_2-x_1)$	0	2	4	6	8
x_2-x_1	0	1	2	3	4
y_2-y_1	12	10	8	6	4
	13 и 13	11 и 15	9 и 17	7 и 19	5 и 21

понижение кол-во в чёт. ряду на 2

$2(x_2-x_1)$	10	12	14
x_2-x_1	5	6	7
y_2-y_1	2	0	-2
	7 и 23	9 и 25	7 и 23

только точки x_2 и x_1 поменяются



$2(x_2-x_1)$	16	18	20	22	24	26	28	30
x_2-x_1	8	9	10	11	12	13	14	15
y_2-y_1	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18

5 и 21 $\boxed{3 \text{ и } 19}$ $\boxed{1 \text{ и } 17}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

№6

$$\begin{cases} ax - y + 10b = 0 \\ ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \le 0 \end{cases}$$

$y = ax + 10b$ — прямая

$y_1 y_2 \le 0$, где $y_1 = (x+8)^2 + y^2 - 1$

$(x+8)^2 + y^2 = 1^2$ — окр-ть, центр $(-8;0)$, рад. 1

$y_2 = x^2 + y^2 - 4$

$x^2 + y^2 = 2^2$ — окр-ть, центр $(0;0)$, рад. 2

≤ 0 если y_1 и y_2 — разных знаков, т.к. y_1 и y_2 — окр-ты, у которых внутри <0, окр-ть $=0$, снаружи >0

Заметим, что окр-ти не пересек. $\Rightarrow$ нужные части пов-ти — внутри окртей и на окр-тях (там, где $y_1 > 0$, $y_2 \le 0$; $y_1 \le 0$, $y_2 > 0$)



т.к. нам нужны только 2 реш. то это возмож. только если прямая y — касат. к обеим окр-тям. есть всего 4 таких прямых (см. на чертеже)

для пр. y, a — tg угла наклона пр. y к X

Заметим, что углы м/у ① и Ox и ④ и Ox равны, также углы м/у ② и Ox и ③ и Ox равны

$\Rightarrow a_1 = -a_4$

$a_2 = -a_3$

$\Rightarrow$ Рассмотрим оба случая:

① и ④



нужно найти $tg\alpha = a_1 = -a_4$

Обозначим буквами точки как на чертеже.

$\Rightarrow AC$ — касат. к ω_1 и ω_2

$\Rightarrow \triangle O_1AB \sim \triangle O_2CB$ (пр/уг и $\angle O_1BA = \angle O_2CB$ (верт.)) (по 2 углам)

$\Rightarrow \frac{O_1B}{O_2B} = \frac{O_1A}{O_2C} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2}$ (как сход. ст. подоб. $\triangle$-ов)

$2O_1B = O_2B$

$O_1O_2 = 8 = O_1B + O_2B = 3O_1B$

$\Rightarrow O_1B = \frac{8}{3}$

$\Rightarrow$ из $\triangle O_1AB$ — пр/уг по т. Пифагора

$AB = \sqrt{O_1B^2 - O_1A^2} = \sqrt{\frac{64}{9} - 1} = \frac{\sqrt{55}}{3}$

$tg\,\alpha = tg\angle O_1BA = \frac{O_1A}{AB} = \frac{1}{\frac{\sqrt{55}}{3}} = \frac{3\sqrt{55}}{55} = a_1 = -a_4$

Второй случай

② и ③



$tg\alpha = a_2 = -a_3$

Обозн. точки как показано на чертеже

$\Rightarrow \triangle ABO_1 \sim \triangle ACO_2$ (α — общ. пр/уг т.к. AC — касат. к ω_1 и ω_2)

$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{AO_1}{AO_2} = \frac{BO_1}{CO_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2}$ (как сход. ст. подоб. $\triangle$-ов)

$2A_1O = A_1O + O_1O_2$

$A_1O = O_1O_2 = 8$

⇓ (продолж.)

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№6 (продолжение)

из $\triangle ABO_1$ - пр/уг (как было сказ. выше)
По т. Пифагора,

$AB = \sqrt{AO_1^2 - O_1B^2} = \sqrt{64-1} = \sqrt{63}$

$tg\,\alpha = tg\angle BAO_1 = \frac{BO_1}{AB} = \frac{1}{\sqrt{63}} = \frac{\sqrt{63}}{63} = \frac{3\sqrt{7}}{3\cdot 21} = \frac{\sqrt{7}}{21} = a_2 = -a_3$

$\Rightarrow$ При данных a можно будет подобрать b так, что

прямая y будет касат. к обеим окр-тям

в частности это будут коорд. по Oy т. пересеч.

①/②/③/④ и Oy, (но это совсем другая история)

Ответ: $-\frac{3\sqrt{55}}{55}$; $-\frac{\sqrt{7}}{21}$; $\frac{\sqrt{7}}{21}$; $\frac{3\sqrt{55}}{55}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7 [x]

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

№7



$AS = SC$

$AL = LB$

~~$\angle K = \angle L$~~

~~$\angle R = \angle S$~~



$AO^2 = AR^2 + OR^2 = AR^2 + \left(\frac{FR}{SF} \cdot NS\right)^2 =$

$= AR^2 + \left(\frac{KT}{TL}\right)^2 \cdot ML^2$

$\frac{KT}{TL} \cdot ML = \frac{FR}{SF} \cdot NS$

$\frac{OT}{TM} \cdot ML = \frac{FO}{FN} NC$

$AO - ?$

$\triangle AML \sim \triangle COR$

$\Rightarrow \frac{ML}{OR} = \frac{AL}{RC}$

$\triangle KOB \sim \triangle SNA$

$\Rightarrow \frac{SN}{OK} = \frac{AS}{KB}$

$\triangle MLT \sim \triangle OKT$

$\Rightarrow \frac{ML}{OK} = \frac{LT}{TK}$

$\triangle NSF \sim \triangle ORF$

$\Rightarrow \frac{NS}{OR} = \frac{SF}{FR}$

$\frac{ML}{OR} = \frac{LT + TK + KB}{RC}$

т. $N \in$ бисс. $\angle ABC$ т.к. $AN = NC$ $\Rightarrow \angle ABN = \angle NBC$

т. $M \in$ бисс. $\angle ACB$ т.к. $AM = MB$ $\Rightarrow \angle ACM = \angle MCB$