



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 9



4. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{14}7^{10}$, bc делится на $2^{17}7^{17}$, ac делится на $2^{20}7^{37}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

5. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

6. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 1 и 5 соответственно.

7. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2 - 7x.$$

8. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-12;24)$, $Q(3;24)$ и $R(15;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 12$.

9. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax - y + 10b = 0, \\ ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

10. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 4,5 и 2.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Обозначим через X_p степени вхождения простого числа p в число $x \in \mathbb{N}$. Числа 2 и 7 — простые $\Rightarrow$ если кто-то из них входит в число y в степени n ($y_2 = n$ напр.), в число z в степени m ($z_2 = m$), то в число xy в степени $m+n$. Если число $X : p^k$, то $X_p \geq k$. Тогда условия:

$$+ \begin{cases} a_2 + b_2 \geq 14 \\ b_2 + c_2 \geq 17 \\ a_2 + c_2 \geq 20 \end{cases} \quad \begin{matrix} 2(a_2 + b_2 + c_2) \geq 51 \\ a_2 + b_2 + c_2 \in \mathbb{Z} \Rightarrow a_2 + b_2 + c_2 \geq 26 \end{matrix}$$

Т.о. в абе 2 входит в хотя бы 26 степени

$a_2 + c_2 \geq 37 \Rightarrow$ т.к. $b_2 \geq 0$, то $a_2 + c_2 + b_2 \geq 37$, то в абе 7 входит в хотя бы 37 степени

$$\Rightarrow abc \geq 2^{26} \cdot 7^{37}$$

Пример на $abc = 2^{26} \cdot 7^{37}$:

$$\begin{aligned} a &= 2^9 \cdot 7^{10} \\ b &= 2^6 \\ c &= 2^{11} \cdot 7^{27} \end{aligned}$$

Нетрудно убедиться, что усл. на кратности выполн.

Ответ: $2^{26} \cdot 7^{37}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Заметим, что $a^2 - 8ab + b^2 = (a+b)(b-7a) + 8a^2$.

По усл. $\frac{a}{b}$ несокр., т.е. a и b взаимно просты:
 $(a; b) = 1 \Rightarrow (a+b; b) = 1$ и $(a+b; a) = 1$.

Нужно найти наибольшее m такое, что $(a+b) : m$
и $((a+b)(b-7a) + 8a^2) : m$.

$(a+b)(b-7a) : (a+b) : m \Rightarrow ((a+b)(b-7a) + 8a^2) : m$, только
если $8a^2 : m$. Т.к. $(a+b; a) = 1$, то и $(a+b; a^2) = 1$
 $\Rightarrow (a^2; m) = 1 \Rightarrow 8 : m \Rightarrow m \leq 8$.

Примир на 8: $a=1, b=7$

Тогда $\frac{1}{7}$ - несокр., $a+b=8, a^2 - 8ab + b^2 = 8 \Rightarrow$ ищем
сокр. на 8, ч.т.д.

Ответ: 8.


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Пусть O - центр $\omega \Rightarrow OC \perp AB$
(радиус перпендикулярен касательной); $BC = x \Rightarrow AC = 7x$.

По т. Пиф. $\triangle OCB$ и $\triangle OCA$:

$$OB = \sqrt{x^2 + 1}, \quad OA = \sqrt{49x^2 + 1}$$

Пусть $\angle AOB = \alpha$. Тогда для $\triangle AOB$:

$$S = \frac{1}{2} OC \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 8x = 4x$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot AO \cdot OB \cdot \sin \alpha = \frac{\sin \alpha}{2} \cdot \sqrt{(x^2 + 1)(49x^2 + 1)}$$

По т. син: $\frac{AB}{\sin \alpha} = 2R \Rightarrow \frac{8x}{\sin \alpha} = 10 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{4x}{5}$

$$4x = \frac{1}{2} \cdot \frac{4x}{5} \cdot \sqrt{(x^2 + 1)(49x^2 + 1)}; \quad x \neq 0 \quad (x - \text{длина})$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x^2 + 1)(49x^2 + 1)} = 10$$

$$49x^4 + x^2 + 49x^2 + 1 = 100$$

$$49x^4 + 50x^2 - 99 = 0$$

$$x^2 = t \Rightarrow t > 0$$

$$49t^2 + 50t - 99 = 0$$

$$625 + 49 \cdot 99 = 5476 = 74^2$$

$$\frac{D}{4} = 25^2 + 49 \cdot 99 = 625 + 4851 = 5476 = 74^2$$

$$\Rightarrow t = \frac{-25 \pm 74}{49}; \quad t > 0 \Rightarrow t = \frac{74 - 25}{49} = 1$$

Т.о. $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$; так $x > 0$, то $x = 1$

$$\Rightarrow AB = 8x = 8.$$

Ответ: 8.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Заметим, что $(2x^2 - 5x + 3) - (2x^2 + 2x + 1) = 2 - 7x$. Сделаем
замену $\sqrt{2x^2 - 5x + 3} = a$ и $\sqrt{2x^2 + 2x + 1} = b$. Тогда:

$$a - b = a^2 - b^2$$

$$(a - b)(a + b) - (a - b) = 0$$

$$(a - b)(a + b - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = b \\ a + b = 1 \end{cases}$$

Вернём замену. Сначала найдём x , а потом проверим
ограничения.

$$\begin{aligned} 1) \quad \sqrt{2x^2 - 5x + 3} &= \sqrt{2x^2 + 2x + 1} \\ 2x^2 - 5x + 3 &= 2x^2 + 2x + 1 \\ 7x - 2 &= 0 \Rightarrow x = \frac{2}{7} \end{aligned}$$

Заметим, что для $2x^2 + 2x + 1$ $\Delta_1 = 1 - 2 = -1 < 0 \Rightarrow$
 $2x^2 + 2x + 1 > 0$ при любых x .

$$2x^2 - 5x + 3 = 2(x - 1)(x - \frac{3}{2})$$

$$\text{при } x = \frac{2}{7}: \quad = 2 \cdot \underset{0}{(\frac{2}{7} - 1)} \cdot \underset{0}{(\frac{2}{7} - \frac{3}{2})} \Rightarrow > 0 \Rightarrow x = \frac{2}{7} \text{ подходит.}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1} &= 1 \\ 2x^2 - 5x + 3 + 2x^2 + 2x + 1 + 2 \cdot \sqrt{(2x^2 - 5x + 3)(2x^2 + 2x + 1)} &= 1 \\ 4x^2 - 3x + 3 + 2\sqrt{(2x^2 - 5x + 3)(2x^2 + 2x + 1)} &= 0 \end{aligned}$$

Заметим, что для $4x^2 - 3x + 3$ $\Delta = 9 - 4 \cdot 12 = -39 < 0 \Rightarrow$

$4x^2 - 3x + 3 > 0$ при любых x . Т.к. $\sqrt{\dots} \geq 0$, то
лев. части $> 0 \Rightarrow$ равенство 0 не и.б.

Ответ: $\frac{2}{7}$.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☒

6
☐

7
☐

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{aligned} 2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 &= 12 \\ 2(x_2 - x_1) + y_2 - y_1 &= 12 \end{aligned} \Rightarrow y_2 \text{ и } y_1 \text{ одной чётности}$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) $((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0$

$$\begin{cases} (x+8)^2 + y^2 - 1 = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) < 0 \end{cases}$$


$\Rightarrow$ скобки разного знака.

Рассмотрим график это кер-ва.

$(x+8)^2 + y^2 = 1$ - окр. с центром $(-8; 0)$, $R=1$

$x^2 + y^2 = 4$ - окр. с центром $(0; 0)$, $R=2$.

Тогда очев., что эти окр. не имеют общих точек $\Rightarrow$ если в третьей скобке в совокупности
выражении скобки должны быть разного знака,
то это области внутри одной и вне другой
окружностей $\Rightarrow$ просто области внутри окр.
т.е. график:



2) $y = ax + 106$

график - прямая, $\text{tg угла наклона} = a$, пересек. ось oy
в т. $(0; 106)$.

По усл. должно быть ровно 2 рещ. $\Rightarrow$ ровно 2
общие точки этой пр. и построенных окр. 4
их внутр. обл. Если пр. пересекет какую-то окр.,
то общих точек сразу станет бесконечное мн-во.

Значит, она может их только касаться. Но тогда
всего с каждой окр. по ≤ 1 общ. т. $\Rightarrow$ всего
 $\leq 2 \Rightarrow$ т.к. нужно 2, то пр. кас. обеих
окр. $\Rightarrow$ мн-во подходящих пр. - ~~н~~ общие касат. окр.
сн. продолжение на другой листе

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Всего 2 внешние и 2 внутр. кас. Линии центров окр.
пек. на оси $Ox \Rightarrow$ внеш. кас. симм. относит. Ox
и внутр. тоже симм. отн. $Ox \Rightarrow$ найдём углы
наклона 1 внутр. и 1 внеш. кас, а через
них из симметрии найдём дв. функции кас.
Проведём эти кас. на графике, пусть m и n .
 A и B - центры окр., т. кас. и пересек. обознач. на
рис.

• m : $BL = 2$, $BL \perp m$; $AK = 1$, $AK \perp m$ (рад. в т. кас.), $\angle LPB = \alpha$
- общ. $\Rightarrow \triangle PKA \sim \triangle PLB$ по 2 углам. $AB = 8$

$$\Rightarrow \frac{PB}{PA} = \frac{BL}{AK}$$

$$\frac{PA+8}{PA} = \frac{2}{1} \Rightarrow \frac{8}{PA} = 1 \Rightarrow PA = 8$$

$$\Rightarrow \text{по т. Пиф. } PK = \sqrt{PA^2 - AK^2} = 3\sqrt{7}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{AK}{PK} = \frac{1}{3\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{21}$$

• n : аналог. $AQ = 1$, $AQ \perp n$; $BZ = 2$, $BZ \perp n$, $\angle QHA = \angle ZHB = \varphi$
(вертик) $\Rightarrow \triangle QHA \sim \triangle ZHB \Rightarrow \frac{BZ}{AQ} = \frac{BH}{AH}$

$$\frac{2}{1} = \frac{8-AH}{AH} \Rightarrow \frac{8}{AH} = 3 \Rightarrow AH = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow \text{по т. Пиф. } QH = \sqrt{AH^2 - AQ^2} = \sqrt{\frac{64}{9} - 1} = \frac{\sqrt{55}}{3}$$

$$\Rightarrow \tan \varphi = \frac{AQ}{QH} = \frac{3}{\sqrt{55}} = \frac{3\sqrt{55}}{55}$$

$$\text{т.о. } \alpha = \tan^{-1} \frac{\sqrt{7}}{21}, \quad \alpha = \tan(180^\circ - \alpha) = -\frac{\sqrt{7}}{21}, \quad \alpha = \tan \varphi = \frac{3\sqrt{55}}{55},$$

$\alpha = \tan(180^\circ - \varphi) = -\frac{3\sqrt{55}}{55}$. Т.р. только в таких углах
какая-то касат., а коэф. сов. осев.
подбирается, чтобы подвигать пр. вверх/вниз
и попасть в касание.

$$\text{Ответ: } \frac{\sqrt{7}}{21}, -\frac{\sqrt{7}}{21}, \frac{3\sqrt{55}}{55}, -\frac{3\sqrt{55}}{55}.$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☒

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Т.к. M и N - середины
 $\angle AB$ и $\angle AC$, то перп.
из M и N на AB и AC
являю. отв. отв. пер-ах
и пересек. в центре
окр. τ . O . $OA = R$ отв.
Пусть I - центр
 $\triangle ABC \Rightarrow BI$ попадает в
 τ . N , CI в τ . M . То
же самое о треугольнике
 $IN = AN = NC$, $IM = MA = MB$,
 $IK = BK = CK$.

То τ . Пусть $\triangle OAY$ и $\triangle OAX$: $AY^2 = R^2 - (R-2)^2$, $AX^2 = R^2 - (R-4,5)^2$
 $AY = \sqrt{4R-4}$, $AX = \sqrt{9R-4,5^2}$
 $AC = 2\sqrt{4R-4}$, $AB = 2\sqrt{9R-4,5^2}$

$\triangle ANY$ и $\triangle AMX$: $AM^2 = AX^2 + 4,5^2 = 9R$, $AN^2 = 4R$
 $AM = 3\sqrt{R}$, $AN = 2\sqrt{R}$

Отсюда τ . I : $AI \cdot IK = IB \cdot IN = IC \cdot IM$

24
 24
 36
 48
 576
 $AX^2 = R^2 - (R-2)^2 =$
 $= 4R - 4$
 $AY = 2\sqrt{R-1} = R^2 - 9R + 4,5^2$
 $AX^2 = R^2 - (R-4,5)^2 =$
 $= 9R - 4,5^2$

