


Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.




4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости C газа (в единицах универсальной газовой постоянной R) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1 $T_1 = 400$ К, универсальная газовая постоянная $R = 8,31$ Дж/(моль·К).



1) Найдите работу A_2 газа в процессе 1-2.

2) Найдите КПД η цикла.

3) Постройте график цикла в координатах $(P/P_1, V/V_1)$, где P_1 и V_1 давление и объём в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.




5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной b (см. рис.). Масса каждого шарика m , заряд q .

1) Найдите силу T натяжения нитей.

Одну нить пережигают.

2) Найдите скорость V любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.

3) На каком расстоянии d от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)?



Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.



Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



1. Мяч, посланный теннисистом вертикально вверх, поднимается на максимальную высоту за $T = 2$ с.


1) Найдите начальную скорость V_0 мяча.

2) Теннисист посылает мяч с начальной скоростью V_0 под различными углами к горизонту в направлении высокой вертикальной стенки, находящейся на расстоянии $S = 20$ м от места броска. На какой максимальной высоте мяч ударяется о стенку?

Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление во здуха считайте пренебрежимо малым. Все высоты отсчитываются от точки старта.

2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол α такой, что $\sin \alpha = 0,8$ (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость $V_0 = 4$ м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте $\mu = \frac{1}{3}$. Движение коробки прямолинейное.



1) За какое время T после старта коробка пройдет в первом опыте путь $S = 1$ м?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью $U = 2$ м/с, и сообщают коробке скорость $V_0 = 4$ м/с.


2) На каком расстоянии L от точки старта скорость коробки во втором опыте будет равна $U = 2$ м/с?

3) На какой высоте H , отсчитанной от точки старта, скорость коробки во втором опыте станет равной нулю? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же скорости V_0 за одинаковое время.

В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом α к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения скорости V_0 действие внешней силы прекращается.



1) Найдите коэффициент μ трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

2) Через какое время T после прекращения действия силы санки остановятся? Ускорение свободного падения g .

Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


 МФТИ

21

$$1) 0 = v_0 - gT \Rightarrow v_0 = gT = 20 \frac{m}{c}$$

2) Чтобы лет шарик максимально высоко от стены, в момент удара от стены он должен

быть в максимальной высоте своей траектории:



$$(1) x: S = v_0 \cos \alpha \cdot T$$

$$(2) y: H = v_0 \sin \alpha \cdot T - \frac{gT^2}{2}$$

$$(3) T = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

α - угол к горизонту
 T - время полета от стены

$$\text{Из (1): } S = \frac{v_0^2 \cdot \sin 2\alpha}{2g} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{2Sg}{v_0^2} = \frac{20 \cdot 20}{20^2} = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{20^2 \cdot 1}{20 \cdot 2} = 10 \text{ м}$$

Ответ: 1) $v_0 = 20 \frac{m}{c}$ 2) $H = 10 \text{ м}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

u2



$$F_{\text{frp}} = \mu N = \mu mg \cos \alpha$$

После ~~разрыва~~ какой максимальной путь пройдет коробка до остановки ($v=0$):

ЗСЭ:

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6$$


$$mg s_1 \sin \alpha - \frac{mv_0^2}{2} = -\mu mg \cos \alpha s_1$$

= 0,6

$$s_1 g \sin \alpha = \frac{v_0^2}{2} = s_1 (g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha)$$

$$s_1 = \frac{v_0^2}{g \cdot 2 (\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} = \frac{16}{20 (0,8 + 0,2)} = 0,8 \text{ м}$$

Это меньше, чем $S=1$ м, поэтому блок сначала пройдет вверх на 0,8 м, а затем скатится на 0,2 м вниз.



$$x: ma = \cos \mu mg + mg \sin \alpha \quad a = g (\mu \cos \alpha + \sin \alpha) = g \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{4}{5} \right) = g$$


$$y: N = mg \cos \alpha$$

$$s_1 = v_0 t_1 - \frac{a t_1^2}{2}$$

$$0,8 = 4t_1 - 5 \cdot t_1^2 \Rightarrow 5t_1^2 - 4t_1 + 0,8 = 0$$

$$D = 16 - 4 \cdot 5 \cdot 0,8 = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{4}{2 \cdot 5} = 0,4 \text{ с}$$

2) коробка скатится вниз: $s_2 = S - s_1 = 0,2$ м



$$ma = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha \Rightarrow a = g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = g (0,8 - 0,2) = 0,6g$$

$$s_2 = \frac{a t_2^2}{2} \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2s_2}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,2}{0,6g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,2}{6}} = \sqrt{\frac{2}{30}} = \sqrt{\frac{1}{15}} \text{ с}$$

$$T = t_1 + t_2 = 0,4 + \sqrt{\frac{1}{15}} \text{ с}$$

- 1 2 3 4 5 6 7


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



2) (прокручено)

2) Перемещаем в С.О., выбираем систему координат. Тогда скорость коробки составит $\vec{v} = \vec{v}_0 - \vec{u}$.

Когда в момент t_0 скорость коробки будет равна 0, то в ЛСО скорость будет $u = 2 \text{ м/с}$



ЗСЗ:

$$mgL \sin \alpha - \frac{m(v_0 - u)^2}{2} = A_{\text{тр}}$$


$$mgL \sin \alpha - \frac{m(v_0 - u)^2}{2} = -\mu mg \cos \alpha \cdot L$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg \cos \alpha$$

$$Lg(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) = \frac{(v_0 - u)^2}{2}$$

$$L = \frac{(v_0 - u)^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} = \frac{(4 - 2)^2}{2 \cdot 9.8(0.8 + 0.2)} = \frac{2^2}{20} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ м}$$

3) Когда в ЛСО скорость коробки равна 0, но скорость в С.О., выходящая с лентой равна $u = 2 \text{ м/с}$ и направлена вниз, вверх лентой



ЗСЗ:

$$mgL \sin \alpha \Rightarrow mg u_0 + \frac{m u^2}{2} - mgL \sin \alpha = A_{\text{тр}} - \mu mg \cos \alpha \cdot s$$

$$g u_0 + \frac{u^2}{2} - gL \sin \alpha = -\mu g \cos \alpha \frac{L \sin \alpha - u_0}{\sin \alpha}$$

$$g u_0 + \mu g \cos \alpha L - \mu g \frac{u_0}{\sin \alpha} = -\frac{u^2}{2} + gL \sin \alpha$$

$$u_0 g \left(1 - \frac{\mu}{\sin \alpha}\right) = -\frac{u^2}{2} + gL(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

$$u_0 = \frac{-u^2}{2g \left(1 - \frac{\mu}{\sin \alpha}\right)} + \frac{L(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{\left(1 - \frac{\mu}{\sin \alpha}\right)}$$

$$= \frac{-4}{20 \left(1 - \frac{0.2}{0.8}\right)} + \frac{0.2(0.8 - 0.2)}{(1 - 0.25)}$$

$$= -\frac{4}{15} + \frac{4}{25} = -\frac{8}{75} \text{ м}$$

$$u = L \sin \alpha + u_0 =$$

$$= \frac{4}{25} - \frac{8}{75} = \frac{4}{75} \text{ м}$$

Ответ: 1) $4 + \sqrt{\frac{1}{15}}$ с 2) $L = 0.2 \text{ м}$ 3) $u = \frac{4}{75} \text{ м}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:


1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


13

1) Как начальная скорость ролика, чтобы развить скорость v за определенное время, нужно иметь определенное ускорение \Rightarrow в формулах ускорения определенное



$$\begin{aligned} x: ma_x &= F \cos \alpha - \mu N \\ y: mg &= N + F \sin \alpha \Rightarrow N = mg - F \sin \alpha \\ a_x &= \frac{F \cos \alpha - \mu mg + \mu F \sin \alpha}{m} \end{aligned}$$

2)




$$\begin{aligned} x: ma_2 &= F - \mu N \Rightarrow a_2 = \frac{F - \mu mg}{m} \\ y: N &= mg \end{aligned}$$

$$a_1 = a_2 \Rightarrow F - \mu mg = F \cos \alpha - \mu mg + \mu F \sin \alpha \Rightarrow F = F \cos \alpha + \mu F \sin \alpha$$

Получим:

Ответ: $\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$

$$1 = \cos \alpha + \mu \sin \alpha \Rightarrow \mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$



1) $a = \frac{\mu mg}{m} = \mu g$ 2) $v = v_0 - aT$

Ответ: $T = \frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{g} \cdot \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

уч

$$Q_1 = Q_{12} = 2R \cdot 3T_1V$$

$$2) \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}, \text{ где: } Q_2 = Q_{23} + Q_{31} = 0,5R(4-2\sqrt{2})T_1 + 2,5R(2\sqrt{2}-1)T_1 = \\ = R(2-\sqrt{2})T_1 + 2,5R(2\sqrt{2}-1)T_1$$

$$\eta = \frac{6RT_1V - (2-\sqrt{2})RT_1V - 2,5RT_1V(2\sqrt{2}-1)}{6RT_1V} = \frac{6-2+\sqrt{2}-2,5\sqrt{2}+2,5}{6} = \\ = \frac{6,5-4\sqrt{2}}{6} \approx 0,2 \Rightarrow \underline{20\%} \quad \text{Ответ: 2) } \eta = 20\%$$

$$1) Q_{12} = \Delta U_{12} + A_{12} \Rightarrow A_{12} = Q_{12} - \Delta U_{12} \Rightarrow A_{12} = 3VRT_1(2 - \frac{3}{2}) = \frac{3}{2}VRT_1 = \frac{3}{2} \cdot 18,31 \cdot 400 =$$

$$Q_{12} = \nu C_{12} \Delta T = 2R \cdot 3T_1V \quad \nearrow$$

$$= 4986 \text{ Дж}$$

Ответ: 1) $A_{12} = 4986 \text{ Дж}$


$$\Delta U_{12} = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = \frac{3}{2} \nu R \cdot 3T_1$$

$$1) A_{12} = \frac{3}{2} \nu RT_1 = \frac{3}{2} p_1 V_1 \quad \text{Так как известно только давление и объём}$$


$$A_{23} = -\frac{1}{2} \nu RT_1(4-2\sqrt{2}) + \frac{3}{2} \nu RT_1(4-2\sqrt{2}) = \nu RT_1(4-2\sqrt{2})$$

$$A_{31} = -\frac{5}{2} \nu RT_1(2\sqrt{2}-1) + \frac{3}{2} \nu RT_1(2\sqrt{2}-1) = -\nu RT_1(2\sqrt{2}-1) =$$

↓
Всего совершена работа



2) В процессе 12 температура увеличилась в 4 раза $\Rightarrow PV$ увеличится в 4 раза
в процессе 13 температура увеличилась в $2\sqrt{2}$ раза (по сравнению с T_1) $\Rightarrow PV$ увеличится в $2\sqrt{2}$ раза
Несколько удивительно, что во всех процессах совершается работа $\Rightarrow V \neq \text{const}$!



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:


1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

25

1) В силу симметрии все напряжения имеют одинаковые значения или Кулона, следовательно, можно рассмотреть шарик




$$F = F_1 + F_2 \cos 45^\circ = F \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = F \cdot 2.707$$

$$T = F_1 + F_2 \cos 45^\circ = k \frac{q^2}{b^2} + \frac{kq^2 \sqrt{2}}{2b^2} = \frac{kq^2}{b^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$F_1 = k \frac{q^2}{b^2}, F_2 = \frac{kq^2}{2b^2}$$


2) Можно считать шарик фиксированным относительно шарика 2)



$$\frac{a_{ш}}{b} = T \quad T = k \frac{q^2}{b^2} + k \frac{q^2}{4b^2} + k \frac{q^2}{9b^2} = \frac{kq^2}{b^2} \cdot \frac{49}{36}$$


$$a = \sqrt{\frac{b \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{kq^2 \cdot 49}{mb \cdot 36}} = \frac{7}{6} g \sqrt{\frac{k}{mb}}$$

3) Рассмотрим систему в инерциальной системе:



Видно, что в силу симметрии результирующая сила на шарик относительно центра равна 0 \Rightarrow система будет двигаться только в горизонтальном направлении

Внешних сил, действующих на систему нет \Rightarrow центр масс не будет смещаться:



Положим шарик в центре по оси x:

$$x = \frac{b}{2}$$

По оси y: $y = b$

$$\Rightarrow d = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + b^2} = \frac{\sqrt{5}}{2} b$$

Ответ: 1) $T = \frac{kq^2}{b^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ 2) $a = \frac{7}{6} g \sqrt{\frac{k}{mb}}$ 3) $d = \frac{\sqrt{5}}{2} b$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



уч

$$2) \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$Q_1 = Q_{31} + Q_{12} = 2R \cdot 3T_1$$

$$Q_2 = Q_{31} + Q_{23} = 2,5RT_1(\sqrt{8}-1) + 0,5RT_1(4-\sqrt{8}) = 2RT_1\sqrt{8} - 0,5RT_1$$

$$\eta = \frac{2R \cdot 3T_1 + 0,5RT_1 - 2,5RT_1\sqrt{2}}{2R \cdot 3T_1} = \frac{6 + 0,5 - 4\sqrt{2}}{6} \approx 0,2 \Rightarrow 20\%$$


$$1,4 - 0,9 \approx 0,2 \Rightarrow 20\%$$

$$12: \Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T = C_{12} \Delta T \quad \frac{3}{2} (\nu R T_2 - \nu R T_1) = C_{12} T_2 - C_{12} T_1$$

$$p_2 V_2 - p_1 V_1 = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - T_1)$$

$$T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T$$

$$F_1 T = \dots$$





$$A_{12} = \frac{3}{2} p_1 V_1$$

C_{12}

$$3 = 3 - 1 \quad 6 \cdot \frac{1}{2}$$

$$A_{23} = Q - \Delta U = \frac{1}{2} R (4 - 2\sqrt{2}) V - \frac{3}{2} \nu R (4 - 2\sqrt{2})$$

$$A_{31} = 2,5 \nu R (2\sqrt{2} - 1) - \frac{3}{2} \nu R T_1 (2\sqrt{2} - 1) = 2 \nu R (2 - 2\sqrt{2}) T_1$$



$$4 \nu R T_1 (2\sqrt{2} - 1) - 2\sqrt{2} \nu R T_1$$

$$4 \nu R T_1 - 2\sqrt{2} \nu R T_1$$

$$4 \nu R T_1 - 2\sqrt{2} \nu R T_1$$

$$1 + \frac{\sqrt{2}}{4}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:


- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

У1

1) $0 = v_0 - gT \Rightarrow v_0 = gT = 20 \text{ м/с}$ $\frac{v_0^2}{2} = gh$ $18 = 10 \cdot 0.8$




$S = v_0 \cos \alpha \cdot t$ $h = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}$
 $t = \frac{S}{v_0 \cos \alpha}$ $h = \frac{v_0 \sin \alpha \cdot S}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g \cdot S^2}{2 \cdot v_0^2 \cos^2 \alpha}$

$h = \frac{v_0 \sin \alpha \cdot S}{v_0 \cos \alpha} - \frac{g \cdot S^2}{2 \cdot v_0^2 \cos^2 \alpha}$ $h = \frac{S \tan \alpha - \frac{g \cdot S^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha}}{1}$ $mg \sin \alpha - \frac{m v_0^2}{2} = A_{TP}$
 $\frac{v_0 \sin \alpha}{g} = t$ $S = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g}$ $m(10 \cdot 0.8 - \frac{16}{2}) = 0$

$S = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{2gS}{v_0^2} = \frac{20 \cdot 20}{20 \cdot 20} = 1 \Rightarrow 2\alpha = 90^\circ$ $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ $\frac{16}{20 \cdot 3} = \frac{4}{15}$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$ $\frac{16}{100} = \frac{4}{25}$ $\frac{4}{25} = \frac{16}{100}$

$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{g v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{20^2 \cdot 1}{20 \cdot 2} = 10 \text{ м}$ $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$



У2



$x: ma = \mu N + mg \sin \alpha$ $y: N = mg \cos \alpha$
 $a = \mu g \cos \alpha + g \sin \alpha$ $a = g(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)$

$S = v_0 T - \frac{a T^2}{2} \Rightarrow S = v_0 T - \frac{g(\mu \cos \alpha + \sin \alpha) T^2}{2}$

$1 = 4T - \frac{5 \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + 0.8 \right) T^2}{2}$ $0_1: \frac{4}{15} T + \frac{4}{25} T^2 - 20 = 12 \Rightarrow \frac{4}{15} T + \frac{4}{25} T^2 = 32$
 $1 = 4T - 5T^2$ $5T^2 - 4T + 1 = 0$ $0_2: 20 - 8 = 12$
 $T = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 5}}{2 \cdot 5}$ 0.175 $0.8 - 0.16 = 0.64$



$CP = Cv + R$ 0.175 $0.8 - 0.16 = 0.64$
 $\frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $200 \mid 30$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$ $\frac{1}{5}$ $72 - 8 = 64$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$ $\frac{4}{25}$ $64 - 8 = 56$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$ $\frac{3}{25}$ $56 - 8 = 48$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$ $\frac{4}{25}$ $48 - 8 = 40$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$ $\frac{3}{25}$ $40 - 8 = 32$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$ $\frac{4}{25}$ $32 - 8 = 24$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$ $\frac{3}{25}$ $24 - 8 = 16$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$ $\frac{4}{25}$ $16 - 8 = 8$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$ $\frac{3}{25}$ $8 - 8 = 0$
 $\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{25}$ $\frac{4}{25}$ $L = \frac{4}{5} \sin \alpha$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

