



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 6



1. [4 балла] Решите уравнение

$$4 \operatorname{tg} 2x + 1 + \operatorname{ctg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 0.$$

2. [4 балла] Сколько существует троек целых чисел $(a; b; c)$ таких, что они образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию, а их произведение abc равно $3^{240} \cdot 7^{240}$?

3. [5 баллов] Решите неравенство

$$\ln^2(x+2) - (x+1)\ln(4x+8) + (\ln 4)\ln(x+2) \geq 0.$$

4. [4 балла] На координатной плоскости нарисован квадрат, все вершины которого лежат на графике функции $y = -2x^3 - ax$. Известно, что одна из диагоналей квадрата лежит на прямой $y = 5x$, а центр совпадает с началом координат. Найдите значение параметра a и площадь квадрата.

5. [6 баллов] Вокруг треугольника ABC описана окружность Ω . Точки D и E – середины сторон AC и AB соответственно, CF – биссектриса треугольника ABC . Лучи DE и CF пересекаются в точке G , принадлежащей Ω . Найдите углы треугольника ABC , если известно, что $\frac{CF}{DF} = \sqrt{\frac{2}{11}}$.

6. [5 баллов] Числа x , y и z не все равны между собой, и при этом

$$x^3 + \frac{10}{y^3} = y^3 + \frac{10}{z^3} = z^3 + \frac{10}{x^3}.$$

Найдите максимально возможное значение произведения xyz .

7. [6 баллов] В основании четырёхугольной пирамиды $SABCD$ лежит четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC = \sqrt{10}$, $AD = DC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$. Ребро SD – высота пирамиды. Известно, что $SA + SB = 2\sqrt{2} + \sqrt{10}$. Найдите:

а) объём пирамиды;

б) радиус шара, касающегося граней $ABCD$, SAB , SBC и ребра SD .

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Печать QR-кода недопустима!



$$\sim 1) \quad 4 \operatorname{tg} 2x + 1 + \operatorname{ctg} \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0;$$

$$\frac{4 \cdot 2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x} + 1 + \frac{\operatorname{ctg} x \cdot 1 - 1}{\operatorname{ctg} x + 1} = 0;$$

$$\frac{8 \cdot \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x} + 1 + \frac{\operatorname{ctg} x - 1}{\operatorname{ctg} x + 1} = 0;$$

Пусть $\operatorname{tg} x = t$. Тогда $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{t}$.
(лучше рассмотреть случай $\operatorname{tg} x = 0$)

$$\frac{8t}{1-t^2} + 1 + \frac{\frac{1}{t} - 1}{\frac{1}{t} + 1} = 0;$$

$$\frac{8t + 1 - t^2}{1 - t^2} = \frac{1 - \frac{1}{t}}{\frac{1}{t} + 1};$$

$$8 + \frac{1}{t} - t + 8t + 1 - t^2 = 1 - \frac{1}{t} - t^2 + t;$$

$$8t + 8 + \frac{2}{t} = 0; \quad (*t, \text{ т.к. } t \neq 0).$$

$$8t^2 + 8t + 2 = 0;$$

$$3t^2 + 4t + 1 = 0;$$

$$\frac{D}{4} = 4 - 3 = 1 > 0 \Rightarrow 2 \text{ корня}$$

$$t_1 = \frac{-2-1}{3} = -1 \text{ не подходит по О.Д.З.}$$

$$t_2 = \frac{-2+1}{3} = -\frac{1}{3} \Rightarrow \operatorname{tg} x = -\frac{1}{3} \Rightarrow x = \operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{3}\right) + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Сделаем проверку. $\operatorname{tg} x = -\frac{1}{3} \Rightarrow \operatorname{ctg} x = -3$

$$4 \operatorname{tg}^2 x + 1 + \operatorname{ctg} \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4 \cdot 2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x} + 1 + \frac{\operatorname{ctg} x - 1}{\operatorname{ctg} x + 1} = \frac{8 \cdot 9}{3 \cdot 8} + 1 + \frac{(-4)}{(-2)} = -3 + 1 + 2 = 0. \quad \textcircled{V}$$

$$\text{Ответ: } x = \operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{3}\right) + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{О.Д.З: } \cos 2x \neq 0 \Rightarrow 2x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x + \frac{\pi}{4} \neq \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\Rightarrow x \neq -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Из этого } \Rightarrow \operatorname{tg} x \neq \pm 1 \\ \operatorname{ctg} x \neq \pm 1$$

Если $\operatorname{tg} x = 0$, то

$$x = \pi k, \quad \text{Тогда:}$$

$$4 \operatorname{tg} 2\pi k + 1 + \operatorname{ctg} \left(\pi k + \frac{\pi}{4}\right) \neq 0;$$

$$4 \cdot 0 + 1 + 1 \neq 0$$

$$\Downarrow \\ \operatorname{tg} x \neq 0$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Печать QR-кода недопустима!



№2) Пусть q - знаменатель прогрессии $\Rightarrow q \neq 1$.

Тогда $b = aq$, $c = bq = aq^2 \Rightarrow abc = a^3 \cdot q^3$.

По условию $abc = 3^{240} \cdot 7^{240} \Rightarrow a^3 \cdot q^3 = 3^{240} \cdot 7^{240} \Rightarrow$

$\Rightarrow aq = 3^{80} \cdot 7^{80}$, $aq = b \Rightarrow b = 3^{80} \cdot 7^{80}$.

Заметим, что $q \in \mathbb{Q}$, т.к. $c \in \mathbb{Z}$ по условию и

$c = 3^{80} \cdot 7^{80} \cdot q$. Тогда $q = \frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $|m|$ и n взаимно просты.

Тогда $a = \frac{b}{q} = \frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot n}{m}$, $c = bq = \frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot m}{n} \Rightarrow$
 $\Rightarrow 3^{80} \cdot 7^{80} : |m|$ и $3^{80} \cdot 7^{80} : n \Rightarrow$ есть несколько вариантов

- для $\frac{m}{n}$:
- 1) $\frac{m}{n} = \pm 3^\alpha \cdot 7^\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \alpha, \beta \leq 81$, но кроме $\alpha = \beta = 0$
 - 2) $\frac{m}{n} = \pm \frac{1}{3^\alpha \cdot 7^\beta}$
 - 3) $\frac{m}{n} = \pm \frac{3^{\alpha\delta}}{7^{\alpha\delta}}$, $\alpha, \delta \in \mathbb{Z}$, $0 < \alpha, \delta \leq 81$
 - 4) $\frac{m}{n} = \pm \frac{7^\delta}{3^\alpha}$

Для 1) кол-во способов выбрать α и $\beta = 82 \cdot 82 - 1$ (исключаем $\alpha = \beta = 1$).

т.к. m может быть < 0 , получаем кол-во различных

$\frac{m}{n} = 2(82 \cdot 82 - 1)$ (для каждого из них $b = 3^{80} \cdot 7^{80} \Rightarrow$

a и $c = \frac{b}{q}$ различны \Rightarrow различны a и $c \Rightarrow$ различны значения чисел)

Для 2), очевидно, столько же вариантов, т.к.

во 2)-м случае мы берем обратные q из 1)-го случая. (По сути, в 1) возрастающая прогрессия, здесь - убывающая)

Для 3) вариантов $(81 \cdot 81) \cdot 2$, для 4) по аналогии столько же. Тогда суммарно $4(82 \cdot 82 - 1) + 4 \cdot 81 \cdot 81 =$
 $= 4 \cdot (82^2 + 81^2 - 1) = 4 \cdot (6724 + 6560) = 4 \cdot 13284 = 53136$

Ответ 53136.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Печка QR-кода непустима!



23) $\ln^2(x+2) - (x+1) \cdot \ln(4x+8) + \ln 4 \cdot \ln(x+2) \geq 0$; О.О.З.: $x > -2$

$\ln^2(x+2) - (x+1) \cdot \ln 4 - (x+1) \cdot \ln(x+2) + \ln 4 \cdot \ln(x+2) \geq 0$;

$(\ln(x+2) - (x+1)) (\ln(x+2) + \ln 4) \geq 0$;

$\ln(4x+8) \cdot (\ln(x+2) - (x+1)) \geq 0$;

$$\begin{cases} \ln(4x+8) = 0 \\ \ln(x+2) - (x+1) = 0 \\ \ln(4x+8) > 0 \\ \ln(x+2) - (x+1) > 0 \\ \ln(4x+8) < 0 \\ \ln(x+2) - (x+1) < 0 \end{cases}$$

$\downarrow \ln(4x+8) = 0 \Rightarrow 4x+8=1 \Rightarrow 4x=-7 \Rightarrow x=-1,75$
 $\uparrow \ln(x+2) - (x+1) = 0$
 при $x \in (-2; -1,75)$ $\ln(4x+8) < 0$,
 при $x = -1,75$ $\ln(4x+8) = 0$,
 при $x \in (-1,75; +\infty)$ $\ln(4x+8) > 0$

1. $\ln(x+2) - (x+1) = 0$;

$\ln(x+2) = (x+1)$. Рассмотрим

кр-ки этих ф-ий

$y_1 = (x+1)$

$y_2 = \ln(x+2)$

Иная точка $(-1; 0) \Rightarrow$

\Rightarrow есть решение $x = -1$

~~$y_2(0) < y_1(0) \Rightarrow$ если есть другие пересечения, т.е. $x_1 \neq -1$ и x_2 корень, то $x_1 \in (-2; 0)$.~~

~~Тогда возьмем x_1 и x_2~~

~~$y_2 > y_1$, т.е. $\ln(x_1+2) > (x_1+1)$~~

~~при $x \in (-2; -1)$~~

~~при $x \in (-2; 0)$, $x_1+2 \in (0; 2)$, $x_1+2 \in (0; 2)$~~

$y_1' = \frac{1}{x+2}$

Тогда получим ур-е касательной

в той же точке с коорд $x = -1$ ур-е кас-й $y = x+1 \Rightarrow$


\Rightarrow ур-е явл-е касательной для $y_2 \Rightarrow$ только один

корень $x = -1$

$\ln(4x+8)$	-	+	+
$\ln(x+2) - (x+1)$	-	-	-



Ответ: $x \in (-2; -1,75] \cup (-1; +\infty)$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

24) Диагонали кв-га t -ки, равной, делятся точкой O на равные отрезки.

Из перпендикулярности второй диагонали линии на $y = -\frac{x}{5}$

Пусть вершина квадрата в I коорд. четверти имеет коорд-ты $(d; 5d)$, (т.к. $\in y = 5x$)



$C(-d; -5d)$ из симметрии q -б $y = 5x$ и $y = -\frac{x}{5}$ относительно начала координат. (четет. q -ли); $B(5d; -d)$, $D(-5d; d)$.

Тогда для y_1 : $-2d^3 - ad = 5d$
 для y_2 : $-2(5d)^3 - a \cdot 5d = -d$

$$\begin{cases} -2d^3 - ad = 5d & (-5) \\ -250d^3 - 5ad = -d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10d^3 + 5ad = -25d \\ -250d^3 - 5ad = -d \end{cases} +$$

$$\begin{aligned} -240d^3 &= -26d; \quad d \neq 0, \text{ иная} \\ -240d^2 &= -26 \quad \text{квартат верха} \\ &\quad \text{падает в} \\ &\quad \text{точку } (0; 0) \\ d &= \sqrt{\frac{26}{240}} = \sqrt{\frac{13}{120}} \quad (d) \end{aligned}$$

Подставим $d = \sqrt{\frac{13}{120}}$ в I ур-е

$$-2\left(\sqrt{\frac{13}{120}}\right)^3 - a\sqrt{\frac{13}{60}} = 5\sqrt{\frac{13}{120}}$$

$$-\frac{2 \cdot 26^{1.5}}{120 \cdot 60} - a = 5 \Rightarrow a = -\frac{313}{60}$$

Проверим, подставив до II ур-е:

$$-250 \cdot \left(\sqrt{\frac{13}{120}}\right)^3 + \frac{5 \cdot 313}{60} \cdot \sqrt{\frac{13}{120}} = -\sqrt{\frac{13}{120}}$$


$$-\frac{250 \cdot 13}{120 \cdot 60} + \frac{5 \cdot 313}{60} = -1$$

$-1 = -1$ - Верно

$$S_{\text{кв}} = \frac{d^2}{2}; \quad OA = \sqrt{d^2 + 25d^2} = d\sqrt{26} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_{\text{кв}} = 52d^2 = \frac{52 \cdot 13}{120} = \frac{169}{30}$$

Ответ: $a = -\frac{313}{60}$, $S_{\text{кв}} = \frac{169}{30}$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\underline{6)} \quad x^3 + \frac{10}{y^3} = y^3 + \frac{10}{z^3} = z^3 + \frac{10}{x^3}$$

$$x^3 + \frac{10}{y^3} = z^3 + \frac{10}{x^3} \Rightarrow \text{I. } x^3 - z^3 = \frac{10(y^3 - x^3)}{x^3 y^3}$$

$$y^3 + \frac{10}{z^3} = x^3 + \frac{10}{y^3} \Rightarrow \text{II. } y^3 - x^3 = \frac{10(z^3 - y^3)}{z^3 y^3}$$

$$z^3 + \frac{10}{x^3} = y^3 + \frac{10}{z^3} \Rightarrow \text{III. } z^3 - y^3 = \frac{10(x^3 - z^3)}{x^3 z^3}$$

то член. ил. все
числа равны
и друг с другом \Rightarrow
 \Rightarrow хотя бы одно
из них равно
другому $\neq 0$

Пусть $x \neq z$:

$$x^3 - z^3 = \frac{10 \cdot 10(z^3 - y^3)}{x^3 y^3 z^3 y^3} = \frac{1000(x^3 - z^3)}{x^6 y^6 z^6}$$

Тогда $x^3 - z^3 \neq 0 \Rightarrow (:(x^3 - z^3)) \Rightarrow 1 = \frac{1000}{x^6 y^6 z^6} \Rightarrow x^2 y^2 z^2 = 10$

тогда
 $xyz = \pm \sqrt{10} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \max \text{ знат. } xyz = \sqrt{10}$

(Если $x = z$, тогда по усл. $y \neq x, y \neq z \Rightarrow$
 $\Rightarrow z^3 - y^3 \neq 0$.

$$z^3 - y^3 = \frac{10(x^3 - z^3)}{x^3 z^3} = \frac{1000(y^3 - x^3)}{x^6 z^3 y^3} = \frac{1000(z^3 - y^3)}{(x^6 y^6 z^6)}$$

$1000 = x^6 y^6 z^6$. Числа получены $xyz = \pm \sqrt{10}$

Order: $\sqrt{10}$.




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,


решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

с.)





$$\frac{EF}{OF} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2\phi}}$$

G, E, D — одна прямая
 G, E, O — одна прямая
 D, E, G — одна прямая
 G, E, O — одна прямая

$f(x) = \ln(x+2) \quad (-1)$
 $f'(x) = \frac{1}{x+2}$

~~$y = \ln(x+2) - (x-x) + f'(x)$~~
 ~~$(x+2)$~~



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Итого $4 \cdot 3 + 10 + 12 = 84$

$$x^3 + \frac{10}{y^3} = y^3 + \frac{10}{z^3} = z^3 + \frac{10}{x^3}$$

$$x^3 + \frac{10}{y^3} = z^3 + \frac{10}{x^3}$$

$$z^3 - x^3 = \frac{10}{y^3} - \frac{10}{x^3}$$

$$x^3 - z^3 = \frac{10}{x^3} - \frac{10}{y^3}$$

$$x^3 - z^3 = \frac{10(y^3 - x^3)}{x^3 y^3}$$

$$y^3 - x^3 = \frac{10(z^3 - y^3)}{y^3 z^3}$$

$$x^3 - z^3 = \frac{10 \cdot 10 (z^3 - y^3)}{y^3 \cdot z^3 \cdot x^3 \cdot y^3}$$

$$z^3 - y^3 = \frac{10(x^3 - z^3)}{x^3 \cdot z^3}$$

$$\frac{x^3 - z^3}{z^3} = \frac{1000(x^3 - z^3)}{x^3 \cdot y^3 \cdot z^3}$$

$$1 = \frac{1000}{x^3 \cdot y^3 \cdot z^3}$$

$$x^3 \cdot y^3 \cdot z^3 = 1000$$

$$x^2 \cdot y^2 \cdot z^2 = 10$$

$$xyz = \pm \sqrt{10} \Rightarrow xyz_{\max} = \sqrt{10}$$

$$x=1, z=1, y=\sqrt{10}$$

$$1 + \frac{10}{10\sqrt{10}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{10 + \sqrt{10}}{10}$$

$$xyz = \sqrt{10}$$

$$x=z = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$y = \sqrt{10}$$

$$10\sqrt{10} + 10$$

$$\left(-\sqrt{10}\right)^3 + \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \mp \sqrt{10} = 0$$

$$\sqrt{10} - \frac{10}{\sqrt{10}} = 0$$

$$-\sqrt{10} \mp -\sqrt{10} =$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



будем считать, что корни y $\ln(x+2) - (x+1)$


$\ln(x+2) - (x+1) < 0$ всегда, $x = -1$
 или $-2x < -1$
 кроме $x < -2$ (ошибка) $\ln(0,5) - 0,5 < 0$
 $x = -1 (=)$



$x \in (-2; -1,75] \cup (-1; -1)$

или $x > -1$
 $\ln(2) -$
 $\ln(x+2) - (x+1) > 0$
 или

4)



$$-250\alpha^2 = \frac{-325}{12}$$

$$\alpha^2 = \sqrt{\frac{325 \cdot 250}{12}}$$

$$y_1 = 5x$$

$$y_2 = -\frac{x}{5}$$

$$y_{\text{кр}} = -2x^3 - ax$$

$$b = 5a$$

$$-2x^3 - ax = 5x$$

имеет корни α и $-\alpha$

$$-2\alpha^3 - a\alpha = 5\alpha$$

$$+2\alpha^3 + a\alpha = -5\alpha$$

$$-2x^3 - ax = -\frac{x}{5}$$

$$-2x^3 - ax = -\frac{x}{5}$$

$$-2x^3 - ax = y(x)$$

$$+2x^3 + ax = y(-x) = -y(x)$$

$$y(x) = y$$

$$\text{или } x = 5\alpha$$

$$\text{или } x = -5\alpha$$

$$-2 \cdot 125\alpha^3 - 5a\alpha = -\alpha$$

$$\alpha = 250\alpha^3 + 5a\alpha$$

$$\begin{cases} -2\alpha^3 - a\alpha = 5\alpha \\ -2 \cdot 125 \cdot \alpha^3 - 5a\alpha = -\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2\alpha^3 - a\alpha = 5\alpha \cdot (-5) \\ -250\alpha^3 - 5a\alpha = -\alpha \end{cases}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{13}{120}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{13}{30}}$$

$$\begin{cases} 10\alpha^3 + 5a\alpha = -25\alpha \\ -250\alpha^3 - 5a\alpha = -\alpha \end{cases}$$

$$-240\alpha^3 = -26\alpha$$

$$\alpha^2 = \frac{26}{240} = \frac{13}{120}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$d = \sqrt{\frac{13}{120}}$ прообраз и найдем a

$$-2 \left(\sqrt{\frac{13}{120}} \right)^2 - a \sqrt{\frac{13}{120}} = 5 \cdot \sqrt{\frac{13}{120}}$$

$$-\frac{2 \cdot 13}{120 \cdot 60} - a = 5 \quad a = -\frac{13}{60} - 5 = \frac{-15 - 300}{60}$$

$$-2 \left(\sqrt{\frac{13}{120}} \right)^2 + \frac{313}{60} \cdot \sqrt{\frac{13}{120}} = -\frac{1}{5} \cdot \sqrt{\frac{13}{120}}$$


$$-\frac{2 \cdot 13}{220 \cdot 60} + \frac{313}{60} = \frac{313 - 13}{60} = 5 \quad (h(x+2))' = \frac{1}{x+2} \quad (-1) \cdot 1$$

$$-2x^2 + \frac{313}{60} x = -\frac{x}{5} \quad \& \quad h(x-x_0) + y_0 = 260 + 50$$

$$-2x^2 + \frac{313}{60} = -\frac{1}{5}$$

$$2x^2 = \frac{313}{60} + \frac{1}{5} = \frac{313 + 12}{60} = \frac{325}{120}$$

$$x = \sqrt{\frac{325}{120}} \quad ? \quad \sqrt{\frac{13}{120} \cdot 5} = \sqrt{\frac{13 \cdot 25}{120}} = \sqrt{\frac{260 + 50 + 15}{120}} \quad \textcircled{1}$$



$$\sqrt{a^2 + 25a^2} = a\sqrt{26}$$

$$\frac{d}{2} = a\sqrt{26}$$

$$d = a\sqrt{26} \Rightarrow \frac{d^2}{2} = \frac{a^2}{2} = \frac{4a^2 \cdot 26}{2} = 2a^2 \cdot 26$$

$$125 \cdot 13 = 1250 + 300 + 75 = -1625 + 1565 =$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$(\ln(x+2) + \ln 4) (\ln(x+2) - (x+1)) \geq 0$$

~~$$\ln(x+2) + \ln 4 = 0$$~~

$$\ln(4x+8) \cdot (\ln(x+2) - (x+1)) \geq 0$$

$$a = \ln \frac{1}{b} \quad b = \ln a$$

$$a = b e^b$$

$$-a = \ln b$$

$$e^{-a} = b \Rightarrow b = \frac{1}{e^a}$$

$$\begin{cases} \ln(4x+8) = 0 & (1) \\ \ln(x+2) - (x+1) = 0 & (2) \\ \ln(4x+8) > 0 & (3) \\ \ln(x+2) - (x+1) > 0 & (4) \\ \ln(4x+8) < 0 & (5) \\ \ln(x+2) - (x+1) < 0 & (6) \end{cases}$$

$$1) \ln(4x+8) = 0$$

$$4x+8=1$$

$$4x = -7$$

$$\text{при } x \in (-2; -1,75) \quad \ln(4x+8) < 0$$

$$\text{при } x \in (-1,75; +\infty) \quad \ln(4x+8) > 0$$

~~$$e^b = \ln \left(\frac{1}{b} \right) \left(\frac{1}{b} \right)^{e^b}$$~~

$$x = -\frac{7}{4} = -1,75 \quad \checkmark$$

$$2) \ln(x+2) - (x+1) = 0$$

$$\ln(x+2) = (x+1)$$

$$(\ln(x+2) - (x+1))' =$$

$$= \frac{1}{x+2} - 1$$

$$y = \ln x$$

$$y' = \frac{1}{x}$$

$$e^{x+1} = x+2$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2}$$

0 только

$$x = -1 \quad \checkmark \quad e^0 = 1 \quad \checkmark$$

$$y = \log_2 x$$

$$1 = \log_2 2$$

$$2 = \log_2 4$$

$$3 = \log_2 8$$

$$\frac{1}{2} - 1 = \log_2 \frac{1}{2}$$

$$-2 = \log_2 \frac{1}{4}$$

поведение функции
ка $x \rightarrow -2$
не определено

$$\ln(1) = 0 \quad (-1; 0)$$

$$\ln(e) = 1$$

$$c = 2,7$$

$$= 0,7$$


$$3,2 \Rightarrow (1,1; 1)$$

ln если $x+1$ нас

$$x+1 > 0 \quad \text{при } x > -1$$

$$\ln(x+2) > 0 \quad \text{при } x > -2$$

$$\text{при } x > 0$$



$$y = a^x$$

$$a^x = \log_a x$$

$$a^{ax} = x$$

$$a = -\log_a b = -\frac{1}{\log_a e}$$

$$b = \ln a$$

$$\frac{1}{x+2}$$

$$y = \log_a x$$




$$e = 2,7$$

$$y = 1 \quad \text{при } x = 1,27$$

$$y = 2 \quad \text{при } x+2 = 20 \quad x = 18$$

$$-a = \log_a b$$

$$y = \log_a x \quad b = \log_a a$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{m}{n} = \frac{3^x}{7^y}$$

$$0 < \alpha \leq 80 \quad 80 \text{ бар}$$

$$0 < \beta \leq 80 \quad 80 \text{ бар}$$

$$\frac{5^x}{7^y} \quad \text{где } \alpha \text{ } 81 \text{ бар}$$

где β 81 бар

$$(81 \cdot 81 - 1) - \text{где } +$$

$$2(81 \cdot 81 - 1) - \text{где } +$$

$$4(81 \cdot 81 - 1) - \text{где } 9192$$

еще есть $q_3 = \pm 3^{8 \cdot 5}$

$$\frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot 3^x}{7^y}, \quad \frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot 7^x}{3^x}$$

короче

$$q \in \mathbb{Q}$$

$$q_1 = \pm \frac{3^x}{7^y}$$

или $q_1 = \pm \frac{7^x}{3^y}$

$$\begin{array}{r} 13 \ 284 \\ 4 \\ \hline 53 \ 136 \end{array}$$

т.е. $601-60$

$$y_1(0) = 1$$

$$y_2(0) = \ln 2 < 1$$

$$q_1 = 2q_2 = 2q_3$$

второй корень заменим $z = x + 2 \in (-2; 0)$

$$\ln(x+2) \rightarrow -\infty; 21$$

$$(x+2) \rightarrow -1; 1$$

$x \neq 0, \delta \neq 0$, т.к. у нас несутано

тогда по 80 бар.

$$80 \cdot 80 \cdot 2 \cdot 2$$

$$\ln(x+2) > (x+2)$$

$$e^{x+2} < x+2$$

$$4(81 \cdot 81 - 1) + 4 \cdot 80 \cdot 80 = 4(81^2 - 1 + 80^2) =$$

$$82^2 = (80+2)^2 = 4 \cdot (6560 + 6400) =$$

$$= 6400 + 4 \cdot 80 + 4 = 4 \cdot 12960 = 51840 \quad \text{O}$$

$$= 6400 + 320 + 4 = 6724$$

$$81^2 = (80+1)^2 = 6400 + 160 + 1 = 6561$$

$$\begin{array}{r} 12 \ 960 \\ 4 \\ \hline 51 \ 840 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \ 1 \\ 8 \ 1 \\ \hline 6 \ 4 \ 8 \\ 6 \ 5 \ 6 \ 1 \end{array}$$

$$80 \cdot 80 = 6400$$

$$\ln^2(x+2) - (x+2) - \ln 4(x+2) + \ln 4 \cdot \ln(x+2) \geq 0$$

$$\ln^2(x+2) = t$$

$$t^2 - (x+2) \cdot (\ln 2 + t) + \ln 4 \cdot t \geq 0;$$

$$t^2 - (x+2) \cdot \ln 2 - t(x+2) + 2 \ln 2 \cdot t \geq 0;$$

$$\ln(x+2) \cdot \ln(x+2) - (x+2) \cdot (\ln 2 + \ln(x+2)) + \ln 4 \cdot \ln(x+2) \geq 0$$

$$\ln(x+2) (\ln(x+2) - (x+2)) + \ln 4 (\ln(x+2) - (x+2)) \geq 0;$$

$$(\ln(x+2) + \ln 4) (\ln(x+2) - (x+2)) \geq 0;$$

$x > -2$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице.

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Печать QR-кода недопустима!

$$\begin{aligned} \text{tg}(\alpha + \beta) &= \frac{\text{tg}\alpha + \text{tg}\beta}{1 - \text{tg}\alpha \cdot \text{tg}\beta} \\ \text{tg} 2\alpha &= \frac{2\text{tg}\alpha}{1 - \text{tg}^2\alpha} \end{aligned}$$

$$\text{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{\text{ctg}\alpha \cdot \text{ctg}\beta - 1}{\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\beta}$$

$$\frac{8\text{tg}\alpha}{1 - \text{tg}^2\alpha} + 1 + \frac{\text{ctg}\alpha \cdot 1 - 1}{\text{ctg}\alpha + 1} = 0;$$

поскольку $\text{tg} x = t$

$$\frac{8t}{1 - t^2} + 1 + \frac{\frac{1}{t} - 1}{\frac{1}{t} + 1} = 0;$$

$$\frac{8t + 1 - t^2}{1 - t^2} = \frac{1 - \frac{1}{t}}{1 + \frac{1}{t}}$$

$$\frac{t^2 + 8t - 1}{t^2 - 1} = \frac{t - \frac{1}{t}}{t + \frac{1}{t}}$$

$$t^2 + 8t - 1 + t - \frac{1}{t} = t^2 - 1 - t + \frac{1}{t}$$

$$-7t - 9 - \frac{1}{t} = -1 - t + \frac{1}{t}; \quad (\cdot t)$$

$$-7t^2 - 9t - 1 = -t - t^2 + 1;$$

$$6t^2 + 8t + 2 = 0;$$

$$3t^2 + 4t + 1 = 0;$$

$$D = 4 - 3 = 1$$

$$t_1 = \frac{-2 - 1}{3} = -1 \quad \text{— не подходит}$$

$$t_2 = \frac{-2 + 1}{3} = -\frac{1}{3} \quad \text{— проверить}$$

0, 2, 3: $\text{tg} = \frac{\sin}{\cos} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \cos 2x \neq 0$$

$$2x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$$

$$x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \neq 0$$

$$x + \frac{\pi}{4} \neq \pi k$$

$$x \neq -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{tg} x \neq \pm 1$$

$$\text{ctg} x \neq -1$$

обязательно проверить

$$\text{tg} x = 0$$

если $\text{tg} x = 0 \Rightarrow$

$$\sin x = 0$$

$$x = \pi k$$

$$4 \text{tg}(2\pi k) + 1 + \text{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + \pi k\right) =$$

$$= 0 + 1 + 1 = 2 \Rightarrow t \neq 0$$

$$\text{tg} x = -\frac{1}{3} \Rightarrow \text{ctg} x = -3$$

$$\text{tg} 2x = \frac{-\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{9}} = -\frac{2}{3} : \frac{8}{9} = -\frac{2 \cdot 9^3}{3 \cdot 8^3} = -\frac{3}{4}$$

$$-\frac{3 \cdot 4}{4} + 1 + \left(\frac{-3 \cdot 1 - 1}{-3 + 1}\right) =$$

$$= -3 + 1 + \frac{-4}{-2} = -3 + 1 + 2 = 0$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



aza

$$b = aq, c = bq = aq^2 \Rightarrow abc = a^3 \cdot q^3 = (aq)^3$$

$$(aq)^3 = 3^{240} \cdot 7^{240} \Rightarrow aq = 3^{80} \cdot 7^{80}$$

Сначала разберемся с $q > 1$

Все q выписыв ~~$81 \cdot 81 \cdot 1 = (9^2 - 1) \cdot 2$~~ $(9^3 - 1) \cdot 2$

Кстати $9^3 = 27$
 $9^2 = 81$
 $9 = 9$

~~если $q < 1$ однозначна q как $\frac{1}{q'}$, где $q' > 1$~~

$$\frac{a}{q'} = \frac{3^{80} \cdot 7^{80}}{\dots} \quad a = 3^{80} \cdot 7^{80} \cdot q \quad \text{мы не опуск}$$

$$q = \frac{1}{2} \quad \dots \quad q = 2$$

$$b^2 = ac \quad \text{если } q < 0, \text{ то } b_+, c_-, a_- \Rightarrow b = \sqrt{ac}$$

$$\sqrt{ac} \cdot ac = (ac)^{3/2} = (aq)^3$$

$$ac = dq^2 \cdot a$$

если $q = \frac{1}{3}$

$$a = 3^{81} \cdot 7^{80} \quad b = 3^{80} \cdot 7^{80}$$

$$b = aq = 3^{80} \cdot 7^{80}$$

$$c = aq^2$$

$$c = 3^{82} \cdot 7^{80}$$

$$a = \frac{3^{80} \cdot 7^{80}}{q}$$

$$c = \frac{3^{80} \cdot 7^{80}}{q^2}$$

если $q \in \mathbb{Z}$
 то разобьем

$$\text{если } q = \frac{m}{n}$$

$$3^{80} \cdot 7^{80} : q$$

$$\frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot n}{m}$$

$$\frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot n}{n}$$

а для \mathbb{Z} (или $\frac{1}{q}$)
 если $q < 0$ и \mathbb{Z} , тогда
 это просто проверяем,
 к-то мы уже посчитали
 тогда получается
 всего $4(9^3 - 1)$

$$m = 3 \quad n = 7 \Rightarrow q = \frac{3}{7}$$

$$\frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot 7}{3} = 3^{79} \cdot 7^{81}$$

$$m = \pm 3^{\alpha_1} \cdot 7^{\beta_1}$$

$$n = 3^{\alpha_2} \cdot 7^{\beta_2}$$

$$\frac{3^{80} \cdot 7^{80} \cdot 3^{\alpha_1} \cdot 7^{\beta_1}}{3^{\alpha_2} \cdot 7^{\beta_2}}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{3^{\alpha_1}}{7^{\beta_2}} \cdot \frac{7^{\beta_1}}{3^{\alpha_2}} = \frac{3^{\alpha_1 - \alpha_2} \cdot 7^{\beta_1 - \beta_2}}{1}$$

рассмотрим