



МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"  
ПО МАТЕМАТИКЕ



## 11 КЛАСС. Вариант 3

- [4 балла] Натуральные числа  $a, b, c$  таковы, что  $ab$  делится на  $2^8 3^{14} 5^{12}$ ,  $bc$  делится на  $2^{12} 3^{20} 5^{17}$ ,  $ac$  делится на  $2^{14} 3^{21} 5^{39}$ . Найдите наименьшее возможное значение произведения  $abc$ .
- [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник  $ABC$ . Окружность, касающаяся прямой  $BC$  в точке  $B$ , пересекает высоту  $CD$ , проведённую к гипотенузе, в точке  $F$ , а катет  $AC$  – в точке  $E$ . Известно, что  $AB \parallel EF$ ,  $AD : DB = 5 : 2$ . Найдите отношение площади треугольника  $ABC$  к площади треугольника  $CEF$ .
- [4 балла] Решите уравнение  $10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$ .
- [5 баллов] Найдите все значения параметра  $a$ , для каждого из которых найдётся значение параметра  $b$ , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

- [5 баллов] Некоторые числа  $x$  и  $y$  удовлетворяют равенствам

$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3, \quad \text{и} \quad \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3.$$

Найдите все возможные значения произведения  $xy$ .

- [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках  $O(0;0)$ ,  $P(-16;80)$ ,  $Q(2;80)$  и  $R(18;0)$ . Найдите количество пар точек  $A(x_1; y_1)$  и  $B(x_2; y_2)$  с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что  $5x_2 - 5x_1 + y_2 - y_1 = 45$ .
- [6 баллов] Дано треугольная пирамида  $SABC$ , медианы  $AA_1$ ,  $BB_1$  и  $CC_1$  треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $M$ . Сфера  $\Omega$  касается ребра  $AS$  в точке  $L$  и касается плоскости основания пирамиды в точке  $K$ , лежащей на отрезке  $AM$ . Сфера  $\Omega$  пересекает отрезок  $SM$  в точках  $P$  и  $Q$ . Известно, что  $SP = MQ$ , площадь треугольника  $ABC$  равна 100,  $SA = BC = 16$ .
  - Найдите произведение длин медиан  $AA_1$ ,  $BB_1$  и  $CC_1$ .
  - Найдите двугранный угол при ребре  $BC$  пирамиды, если дополнительно известно, что  $\Omega$  касается грани  $BCS$  в точке  $N$ ,  $SN = 4$ , а радиус сферы  $\Omega$  равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                   | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 1.

$$\begin{aligned} ab &= 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} \quad (1) \\ a, b, c \in \mathbb{N}^0 & \\ bc &= 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} \quad (2) \\ ac &= 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33} \quad (3) \end{aligned}$$

Задача 1, 200 если  $a, b, c$  генерируют сумму 1000000 - то нечетные числа, кроме 2, 3, 5, то их можно разложить на эти числа и умножить на первое вырожденное.

Значит, ~~abc~~, где мин. произд =

$$a = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3}$$

$$b = 2^{b_1} \cdot 3^{b_2} \cdot 5^{b_3}$$

$$c = 2^{c_1} \cdot 3^{c_2} \cdot 5^{c_3}$$

$a, b, c$  генерируют сумму 2, 3, 5.

$$\text{Тогда } a \text{ из (1): } a_1 + b_1 \geq 8 \quad (4) \quad (2): b_1 + c_1 \geq 12$$

$$a_2 + b_2 \geq 14 \quad (5)$$

$$a_3 + b_3 \geq 9 \quad (6)$$

$$b_2 + c_2 \geq 20$$

$$b_3 + c_3 \geq 17$$

$$(3): a_1 + c_1 \geq 14$$

$$a_2 + c_2 \geq 21$$

$$a_3 + c_3 \geq 39$$

Рассмотрим случаи 2:

Задача 1, 200 при  $a_1 = 5, b_1 = 3, c_1 = 9$  все поб-бы вырождены, т.е., соответствующие минимальные значения 2  $\Rightarrow a_1 = 5, b_1 = 3, c_1 = 9$

Случай 3:

Задача 1, 200 если все поб-бы вырождены, то

$$2a_2 + 2b_2 + 2c_2 \leq 55 \quad \text{или} \quad a_2 + b_2 + c_2 \leq 27.5 \quad \text{или} \quad a_2 + b_2 + c_2 \leq 27$$

$$\text{Тогда } a_1 + c_1 = 14 \quad \text{и} \quad a_2 + c_2 = 22 \quad \text{тогда} \quad a_2 + c_2 + b_2 \leq 14 + 22 = 36$$

$$\Rightarrow b_2 = 7$$

$$\Rightarrow a_2 = 7 \Rightarrow c_2 = 13$$

т.е. рабочий (минимальный) набор из трех чисел



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

- |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                   | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ.

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Рассмотрим случай 5:

Всеобщее

Задача 5, то есть ~~всеобщее~~ равенство в пределах Ферма, т.е.,  
третье число

$$a_3 + c_3 = 39, \text{ то при } a=17, c=27, b=0$$

первое и второе решения верно, а если третье верно, то  
то включаются третье  $\Rightarrow$  это узкий вариант.

Получаем, что:

$$a = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} = 2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^{12}$$

$$b = 2^{b_1} \cdot 3^{b_2} \cdot 5^{b_3} = 2^3 \cdot 3^9 \cdot 5^0 = 2^3 \cdot 3^9$$

$$c = 2^{c_1} \cdot 3^{c_2} \cdot 5^{c_3} = 2^9 \cdot 3^{13} \cdot 5^{27} \quad \text{и это наилучший вариант}$$

$$\text{тогда } abc = 2^{(5+3+9)} \cdot 3^{(7+9+13)} \cdot 5^{(12+27)} = 2^{17} \cdot 3^{29} \cdot 5^{39}$$

$$\text{Отв: } 2^{17} \cdot 3^{29} \cdot 5^{39}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.



Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

- |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 2.



Дано:

$\triangle ABC$ ,  
 $\angle ACB = 90^\circ$ ,  
 $CD \perp AB$ ,  $D \in AB$ ,  
 $AD = 5x$  и  $DB = 2x$ ,  
 $AC = 5x$  и  $BC = 2x$ ,  
 $E \cap CD = F$ ,  
 $E \cap AC = D$

$AB \parallel EF$ ,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{5}{2}$$

Найди:  $S(\triangle ABC)$

$$S(\triangle ABC)$$

Решение: 1) Найдем  $AD = 5x$ ,  $DB = 2x$

2)  $\triangle CDB$  - искомый треугольник

$\angle ECA = 90^\circ$

$\angle CEF = \angle CDA$  как соответственные при  $EF \parallel AB$ ,  $\angle CFE = \angle CAD = 90^\circ$

$\angle CEF = \angle CDA$  как  $CD \perp AB$ .  $\angle CFE = \angle CAD = 90^\circ$

3) По теореме о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике

$$CD = \sqrt{AD \cdot DB} = \sqrt{5x \cdot 2x} = \sqrt{10x^2} = x\sqrt{10}$$

Тогда  $CB = \sqrt{10x^2 + 4x^2} = \sqrt{14x^2} = x\sqrt{14}$  ( $\triangle ABC$  по теореме Пифагора)

$AC = \sqrt{10x^2 + 25x^2} = \sqrt{35x^2} = x\sqrt{35}$  ( $\triangle ACD$  по теореме Пифагора)

4)  $EF \perp BC$   $\Rightarrow$   $P$

5)  $\triangle PCE \sim \triangle BCA$  (по 2 углам,  $AB \parallel EF$ )

$$\Rightarrow \frac{PE}{AB} = \frac{CP}{BC} \Rightarrow \text{поскольку } \frac{CP}{BC} = k$$

$$\text{тогда } PE = k \cdot AB$$

~~$\triangle CEF \sim \triangle CAD$  и  $\triangle PCF \sim \triangle BCD$  (по 2 углам,  $-''-$ )~~

$$\Rightarrow \frac{PE}{DB} = \frac{CP}{CB} = k$$

$$\Rightarrow PE = k \cdot DB = 2k$$

$$6) PB = BC - CP = BC - BC \cdot k = BC(1 - k)$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                   | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

7) Заметим, что РВ-нас. и W,  $\left\{ \begin{array}{l} \text{если } P \\ P \rightarrow F - F - \text{однозначн} \end{array} \right.$

$$\Rightarrow PB^2 = PF \cdot PE$$

$$BC \cdot (k-h)^2 \leq h^2 \cdot 2x - 7x$$

$$(4x^2 \cdot (k-h)^2) \leq M^2 \cdot h^2$$

$$14x^2 \cdot (h^2 - (k-h)^2) \leq 0$$

т.к.  $x \neq 0$  (так как  $AB=0$ ), то

$$h^2 - (k-h)^2$$

$$h^2 = h^2 - 2kh + k^2$$

$$4-2k \leq 0$$

$$k \geq 2$$

$\Rightarrow CP = \frac{BC}{2} \Rightarrow$  т.к.  $PF \parallel AB$ ,  $P$ -с.п.  $BC$ , то  $PE$ -ср.л.  $BC$   $\parallel ABC$   
(из призм.)

$\Rightarrow S(\triangle EFC) = EP \cdot \frac{7x}{2}$ ,  $FP = \frac{7x}{2} = x \Rightarrow EF = \sqrt{\frac{7x \cdot 2x}{2}} = \frac{5x}{2}$

8) Заметим, что  $S(\triangle CEF) = \frac{EF}{EP} \cdot S(\triangle PEC) = \frac{EF}{EP} \cdot S(\triangle ABC) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 =$

$$= \frac{5}{2} \cdot S(\triangle ABC) = \frac{5}{2} S(\triangle ABC)$$

$$\Rightarrow \frac{S(\triangle CEF)}{S(\triangle ABC)} = \frac{28}{5}$$

Найд:  $\frac{28}{5}$ .

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:



- |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                                   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**МФТИ.**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача № 3.

$$10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

т.к.  $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$ ,  $\arcsin(x) = \frac{\pi}{2} - \arccos(x)$

$$10 \cdot \frac{\pi}{2} - 10 \arccos(\cos x) = \pi - 2x$$

$$4\pi = 10 \arccos(\cos x) - 2x$$

$$x + 2\pi = 5 \arccos(\cos x)$$

$$y = \arccos(\cos x)$$

$$1. \quad x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi):$$

$$\Rightarrow \arccos(\cos x) = x$$

$$x + 2\pi \leq 5x$$

$$2\pi = 4x$$

$$x = \frac{\pi}{2}$$

$$2. \quad x \in [\pi; 2\pi]:$$
  
$$\arccos(\cos x) = 2\pi - x$$

$$x + 2\pi \leq 10\pi - 5x$$

$$6x \leq 8\pi$$

$$x \leq \frac{4\pi}{3}$$

$$3. \quad x \in [2\pi, 3\pi)$$

$$x + 2\pi \leq 5x - 10\pi$$

$$12\pi \leq 4x$$

$x \geq 3\pi$ , т.к. при  $x < 3\pi$  график промежутка пуст.

$$4. \quad x \in [3\pi, 4\pi): \arccos(\cos x) = 4\pi - x$$

$$x + 2\pi \leq 8\pi - 20\pi - 5x$$



$$6x \leq 18\pi \quad x \leq 3\pi$$

$$5. \quad x \in [-\pi; 0): \arccos(\cos x) = -x$$

$$2\pi + x \leq -x + 5$$

~~$$2\pi + 6x = -2\pi$$~~

$$x = -\frac{\pi}{3}$$



$$\begin{cases} y = \arccos(\cos x) \text{ (1)} \\ y = x + 2\pi \text{ (2)} \end{cases}$$

$$6. \quad x \in [-2\pi; \pi): \arccos(\cos x) \leq x + 2\pi$$

$$x + 2\pi \leq 5 \cdot (x + 2\pi)$$

$$4(x + 2\pi) \leq 0$$

$$x = -2\pi$$



На одной странице можно оформлять **ТОЛЬКО ОДИНУ** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

- |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                                   | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**МФТИ.**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача № 3  
Заданы,  $x \in \mathbb{R}$ . Область значений  
 $\arccos(x) = [0; \pi]$ , т.е.

Область значений  $\operatorname{arcos}(\cos x) = [0; 5\pi]$

$$\text{при } x > 3\pi \quad x + 2\pi > 5\pi$$

$$\text{при } x < -2\pi \quad x + 2\pi < 0$$

$\Rightarrow$  на  $(-\infty; -2\pi) \cup (3\pi; +\infty)$  нет корней

$\Rightarrow$  мы можем рассмотреть  $[2\pi; 3\pi]$  и начать деление на 3, то  $\pi$ -ые части  
законного промежутка

$$\Rightarrow \text{Ответ: } -2\pi, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}; 3\pi.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**МФТИ**



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 4.

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 \end{cases}$$

$$(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0$$

точка  $(0, 10)$  лежит в 2 кв. и не попадает

на окружность

$$\text{Задача 4, 2020} \quad (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + (y-10)^2 = 36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$(x^2 + (y-10)^2 = 36)$$

$$\begin{cases} y = \frac{ax + 4b}{3} \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$(x^2 + (y-10)^2 = 36)$$

Задача 4, 2020  
однажды в системе, где

одн-сдн, а первое ур-е - прямая  
линей.  $\frac{a}{3}$  и точка пересечения  
с осью ординат

(Рассмотрим при  $a \geq 0$ )

Найдем ур-е окружности в координатах и углы между осн-сдн:

$O_1, O_2$  - центры,  $A, B$  - точки касания,  $M = O_1O_2 \cap AB$

Рисунок 1

$O_1A = 1$  (радиус)

$O_2B = 6$

$O_1O_2 = 10$



$\triangle O_1M O_2$  (по 2 углам, один-прям.)  
гипотенуз.

$$\Rightarrow \frac{O_1M}{O_1O_2} = \frac{O_2M}{O_2B} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow O_1M = \frac{1}{6+1} \cdot 10 = \frac{10}{7}$$

$$\text{Тогда } AM = \sqrt{O_1M^2 - O_1A^2} = \sqrt{\frac{100}{49} - 1} = \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$\text{Тогда } AK = \sqrt{O_2M^2 - O_2B^2} = \sqrt{\frac{100}{49} - 36} = \frac{\sqrt{53}}{7}$$

$$\sin \angle O_2 = K \quad \angle MKO_2 = 90^\circ - \angle O_2A = \angle AOM$$

1-

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**МФТИ.**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




8 Тогда т.к.  $\angle A = \angle B$  при  $\angle AOB = 90^\circ$

так как  $\angle AOB = 90^\circ$  между  $Ox$  и  $AB$  то

$$\frac{a}{3} = \tan \angle AOM = \frac{\sqrt{3}}{7}, \text{ а } \frac{4b}{3} = \frac{10}{7} - \text{ ордината точки } M$$
$$\Rightarrow ab = \frac{3\sqrt{3}}{7}, \quad b = \frac{30}{28}$$

Задача 2) Рассмотрим

Рисунок  
3.



В задаче сперва треугольник  
а потом вертикально

$$AO_1 = OM + \cos \alpha \cdot AM$$
$$O_2 B = ON - \cos \beta \cdot NO_2 < O_2 N - \cos \beta \cdot ON$$
$$\Rightarrow AO_1 + O_2 B < \cos \alpha \cdot AM + (ON + O_2 N) < \cos \alpha \cdot AM + O_2 N = b \cos \beta \cdot ON$$

Задача 2) при  $\tan \angle AOM = \frac{\sqrt{3}}{7}$   $\cos \alpha \cdot AM = \frac{9}{10}$

значит, при  $\tan \angle AOM = \frac{\sqrt{3}}{7} \cos \alpha \cdot AM > \frac{9}{10}$  (и  $\tan 14^\circ \approx \frac{9}{10}$ )

Получаем, что  $AO_1 + O_2 B > \frac{9}{10}$   $\Rightarrow$   $RDX$  существоование

значит можно это из рассмотреть от прямой  $y = \frac{ax + b}{3}$

то есть от определенной прямой, то есть

$\Rightarrow$  будем считать что  $O$  тоже пересекает, а нам нужно, чтобы

в квадрате оп-состои было 2 точки пересечения (то есть 2 раза)

Также задача 2) при  $\tan \angle AOM = \frac{\sqrt{3}}{7}$  наклон, проходящий через

$M(0; \frac{10}{7})$  и имеющая уравнение  $y = \frac{ax + b}{3}$  наклон, проходящий через  $A(0, a)$ , пересекающуюся с прямой  $y = \frac{ax + b}{3}$

пересекает от определенной  $\Rightarrow$  имеем 4 точки пер.

$\Rightarrow$  система ведет к решению

На одной странице можно оформлять **ТОЛЬКО ОДИНУ** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:



- |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                                   | 5                        | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

**МФТИ**

Получаем, что при  $a > \frac{3\sqrt{54}}{7}$   $\alpha$   
может быть цифра  $B = \frac{30}{28}$  и будет 4 точка пересечений,

а при  $a < \frac{3\sqrt{54}}{7}$  то получим, что в 50% чётных

пересечений

~~Найдено:~~: график

Задача 4, 200 Ур-8 симметрична оси. Всё ограничено  
~~некоторой~~  
своей

Значит, при  $a < 0$  будет всё тоже самое, но с зеркальной

т.е., если подумать о  $-a$ , то это зеркальное

значит, при  $a < 0$  получим  $a < -\frac{3\sqrt{54}}{7}$

Ответ:  $(-\infty; -\frac{3\sqrt{54}}{7}) \cup (\frac{3\sqrt{54}}{7}; +\infty)$ .

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:



- |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                   | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 5.

$$\log_5^4(2x) - 3\log_2 5 = \log_{8x^3} 625 + 3$$

Пусть  $\log_5(2x) = t$ , тогда

$$\text{т.ч. } \log_{2x} 5 = \frac{t}{\log_5 2x}, \text{ т.о.}$$

$$\log t^4 - \frac{3}{t} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{t} - 3, \text{ т.к. } \log_{8x^3} 625 < \log_{2x} 5 \Leftrightarrow$$
$$= \frac{4}{3} \log_2 5$$

$$\frac{3t^5 - 9 - 4 + 3t}{3t} = 0$$

$$\frac{3t^5 + gt - 13}{3t} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3t^5 + gt - 13 = 0 \\ 3t \neq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\log_5 y + 4 \log_5 5 = \log_5 0,2 - 3$$

Пусть  $\log_5 y = p$ , тогда

$$p^4 + 4 = -\frac{1}{3p} - 3$$

$$\frac{3p^5 + 12 + g + gp}{3p} = 0 \quad (2) \quad \begin{cases} 3p^5 + gp + 13 = 0 \\ p \neq 0 \end{cases}$$

Задача 5, 20  
Для этого нужно  $3t^5 + gt - 13 = 0$

$$g(p) = 3p^5 + gp + 13$$

$$f'(t) = 15t^4 + g$$

для того

$$g'(p) = 15p^4 + g$$

Задача 5, 20 т.к.  $f'(t) > 0$  при  $t > 0$ ,  $g'(p) > 0$  при  $p > 0$

т.к. везде, за исключением конца на  $R$   
(т.е. обласк за исключением конца на  $R$ )

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



- |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                   | 6                        | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Также заметим, что если есть  $p = t_0$ , то любое  
решением чиселей (1) то  $p = -t_0$  является решением  
(2).

см. схема (2):

$$\begin{aligned} & \cancel{5t_0^5 + 9t_0 - 1350} - \text{первое уравнение (1)} \quad (\text{пуск при } t_0 \text{ впр}) \\ & \cancel{-3t_0^5 - 9t_0 + 1350} \quad \text{последний в 5-м первом уравнении (2) } \cancel{3 - t_0} : \\ & \cancel{3t_0^5 + 9t_0 + 1350} \quad -3t_0^5 - 9t_0 + 1350 = 0 \\ & \cancel{3t_0^5 + 9t_0 - 1350} \end{aligned}$$

Вернули предыдущий.

Заметим, что  $f(1) = 3+9-13 = -1 < 0$

$$\begin{aligned} f(2) &= 3 \cdot 32 + 9 \cdot 2 - 13 = 96 + 5 = 101 > 0 \\ \Rightarrow \text{в силу непрерывности } f \text{ и } g \quad & f \text{ и } g \text{ (т.к. это непрерывно) } \\ \text{существует } & \text{решение уравнения } 1 < t_0 < 2: f(t) = 0 \end{aligned}$$

Значит, есть  $\begin{cases} \log_5 2x = t_0 \\ \log_5 y = -t_0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \log_5 2x + \log_5 y &= 0 \\ \log_5 2xy &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2xy = 1 \\ xy = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Но: } \frac{1}{2}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

- |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 6.



Задача 6, ч. 1) Решение:

$$y = -5x$$

т.е.,  $y + 5x = 0$



Рассмотрим прямыеугольник

$$y + 5x = 0 \text{ при } 0 \leq n \leq 18$$

при  $n=0$  — ОР,  $n=12$  — RQ, при  $0 < n < 18$  — прямая по направлению, проходящая через целочисленные точки на OR

Тогда задача, что  $y$  содержит в себе 18 различных

чисел

$$l_1: y + 5x = 5n$$

$$l_2: y + 5x = 5(n+1)$$

абсцисс  $A_1, A_2, \dots, A_{18}$  подчиняющие условию  $(5x_1 - 5x_2 + y_2 - y_1)^2 = 25$

формулирует

Значит, если бы каждым все изображенные числа не были

$$l_1: y + 5x = 5n$$

$$y + 5x = 5(n+1)$$

некоторые из которых?

таких квадратов 10



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

- |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                   | 7                        |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Далее рассмотрим, сколько вершинов будет между с  $y/z$  координатами на каждой прямой

$$y+5x = 5n$$

значит, что  $0 \leq y \leq 80$ , а значит, что

$$x \in \mathbb{N} - \frac{y}{5}$$
 значит,

$$\begin{cases} 0 \leq y \leq 80 \\ y \equiv 0 \pmod{5} \end{cases}$$

$$y = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80$$

17 вершинов будет между с  $y/z$  координатами на прямой

значит, что между 2-ю прямыми (на каждой из 2 прямых по одному)

$$17 \cdot 17 = 289 \text{ вершинов}$$

10

Значит, у нас ~~10~~ наборов по 289 вершинов (нужно, потому что вершинов не повторяется)

$$\Rightarrow \text{ всего} \ 10 \cdot 289 = 2890$$

289  
289  
2890

Ответ: 2890.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                   | 2                        | 3                                   | 4                        | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



3) Док- $\Delta ABC$  т.к.  $AB = BC$ ,  $AC \perp BC$ ,  $AB = BC$ ,  $AC = AC$ .  
Найдем  $\Delta ABC$ .  $\Delta ABC$  - равнобедренный с вершиной  $C$ ,  $AB = BC$ ,  $AC \perp BC$ .  
Решение? Решение? Решение?  
1)  $\angle A = \angle B$ ,  $\angle C = 90^\circ$ .  
2)  $AB = BC$  - средина  $SM$  - середина  $AB$ .  
3)  $\angle A = \angle B$ ,  $AB = BC$ ,  $AC = AC$ .  
Найдем  $\angle A$ .  $\angle A = \angle B$ .  
 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ .  
 $2\angle A + 90^\circ = 180^\circ$ .  
 $2\angle A = 90^\circ$ .  
 $\angle A = 45^\circ$ .



4)  $\angle A = \angle B = 45^\circ$ ,  $\angle C = 90^\circ$ .  
 $\sin A = \frac{BC}{AB}$ ,  $\sin B = \frac{AC}{AB}$ ,  $\cos A = \frac{AC}{AB}$ ,  $\cos B = \frac{BC}{AB}$ .  
 $\sin 45^\circ = \frac{BC}{AB}$ ,  $\sin 45^\circ = \frac{AC}{AB}$ ,  $\cos 45^\circ = \frac{AC}{AB}$ ,  $\cos 45^\circ = \frac{BC}{AB}$ .  
 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{BC}{AB}$ ,  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{AC}{AB}$ ,  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{AC}{AB}$ ,  $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{BC}{AB}$ .  
 $AB = \sqrt{2}AC$ ,  $AB = \sqrt{2}BC$ .  
 $AC^2 + BC^2 = AB^2$ ,  $AC^2 + BC^2 = (\sqrt{2}AC)^2$ ,  $AC^2 + BC^2 = 2AC^2$ ,  $BC^2 = AC^2$ ,  $BC = AC$ .  
 $AB = \sqrt{2}AC$ ,  $AB = \sqrt{2}BC$ ,  $AB = \sqrt{2}AC = \sqrt{2}BC$ ,  $AB = BC$ .  
 $AB = BC$ ,  $AC = AC$ ,  $AB \perp BC$ .  
 $\Delta ABC$  - равнобедренный с вершиной  $C$ ,  $AB = BC$ ,  $AC \perp BC$ .  
 $\angle A = \angle B = 45^\circ$ ,  $\angle C = 90^\circ$ .

5)  $x_1 + y_1 = 5x_2 + 5y_2 = 55$ ,  $x_1 - y_1 = 144$ ,  $y_1 = 169$ ,  $x_1 = 198$ ,  $x_2 = 25$ ,  $y_2 = 289$ ,  $x_3 = 324$ ,  $y_3 = 361$ ,  $x_4 = 400$ ,  $y_4 = 445$ ,  $x_5 = 512$ ,  $y_5 = 576$ ,  $x_6 = 625$ ,  $y_6 = 684$ ,  $x_7 = 784$ ,  $y_7 = 848$ ,  $x_8 = 900$ ,  $y_8 = 1024$ ,  $x_9 = 1025$ ,  $y_9 = 1156$ ,  $x_{10} = 1225$ ,  $y_{10} = 1375$ .

6)  $x_1 + y_1 = 5x_2 + 5y_2 = 55$ ,  $x_1 - y_1 = 144$ ,  $y_1 = 169$ ,  $x_1 = 198$ ,  $x_2 = 25$ ,  $y_2 = 289$ ,  $x_3 = 324$ ,  $y_3 = 361$ ,  $x_4 = 400$ ,  $y_4 = 445$ ,  $x_5 = 512$ ,  $y_5 = 576$ ,  $x_6 = 625$ ,  $y_6 = 684$ ,  $x_7 = 784$ ,  $y_7 = 848$ ,  $x_8 = 900$ ,  $y_8 = 1024$ ,  $x_9 = 1025$ ,  $y_9 = 1156$ ,  $x_{10} = 1225$ ,  $y_{10} = 1375$ .