




Олимпиада «Физтех» по физике,
февраль 2023

Вариант 10-01


Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.




4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости C газа (в единицах универсальной газовой постоянной R) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1 $T_1 = 400$ К, универсальная газовая постоянная $R = 8,31$ Дж/(моль·К).



- 1) Найдите работу A_{12} газа в процессе 1-2.
- 2) Найдите КПД η цикла.
- 3) Постройте график цикла в координатах $(P/P_1, V/V_1)$, где P_1 и V_1 давление и объём в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.



5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной b (см. рис.). Масса каждого шарика m , заряд q .



- 1) Найдите силу T натяжения нитей. Одну нить пережигают.
- 2) Найдите скорость V любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.
- 3) На каком расстоянии d от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)?

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.



Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



1. Мяч, посланный теннисистом вертикально вверх, поднимается на максимальную высоту за $T = 2$ с.


1) Найдите начальную скорость V_0 мяча.

2) Теннисист посылает мяч с начальной скоростью V_0 под различными углами к горизонту в направлении высокой вертикальной стенки, находящейся на расстоянии $S = 20$ м от места броска. На какой максимальной высоте мяч ударяется о стенку?

Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление воздуха считайте пренебрежимо малым. Все высоты отсчитываются от точки старта.

2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол α такой, что $\sin \alpha = 0,8$ (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость $V_0 = 4$ м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте $\mu = \frac{1}{3}$. Движение коробки прямолинейное.



1) За какое время T после старта коробка пройдет в первом опыте путь $S = 1$ м?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью $U = 2$ м/с, и сообщают коробке скорость $V_0 = 4$ м/с.

2) На каком расстоянии L от точки старта скорость коробки во втором опыте будет равна $U = 2$ м/с?

3) На какой высоте H , отсчитанной от точки старта, скорость коробки во втором опыте станет равной нулю? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же скорости V_0 за одинаковое время.


В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом α к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения скорости V_0 действие внешней силы прекращается.

1) Найдите коэффициент μ трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

2) Через какое время T после прекращения действия силы санки остановятся? Ускорение свободного падения g .

Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.





На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


$\sqrt{g}$



1) Заметим, что в вершине траектории мяч имеет ~~то~~ направление движения, значит в этот момент скорость мяча равна 0. По закону равноускоренного движения:

$$0 = V_0 - gT \Rightarrow V_0 = gT = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 2 \text{с} = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

ответ к п. 1): $V_0 = 20 \text{ м/с}$



Пусть H - максимальная высота на которую поднялся мяч в процессе движения при произвольном угле α между вектором скорости и горизонталью.

$H = V_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}$, где t - время движения до удара о стену. Выразим t по y и по x :

$$H = V_0 \sin \alpha t - g \frac{t^2}{2}; \quad S = V_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{S}{V_0 \cos \alpha}$$

$$H = V_0 \sin \alpha \frac{S}{V_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \frac{S^2}{V_0^2 \cos^2 \alpha} = S \tan \alpha - \frac{g}{2} \frac{S^2}{V_0^2 \cos^2 \alpha}$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \tan \alpha = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1}; \quad \text{Пусть } \frac{1}{\cos^2 \alpha} = x, \text{ тогда:}$$

$H = S \sqrt{x-1} - \frac{g}{2} \frac{S^2}{V_0^2} x$. Про дифференцируем и найдем максимум (формула не нужна; $S'(x) = 0$).

$$H' = S \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \cdot 1 - \frac{g}{2} \frac{S^2}{V_0^2} \cdot 1 = 0$$

$$\frac{S}{2\sqrt{x-1}} = \frac{g}{2} \frac{S^2}{V_0^2} \Rightarrow \sqrt{x-1} = \frac{V_0^2}{gS} \Rightarrow x = \frac{V_0^4}{g^2 S^2} + 1$$

$$x = \frac{20^4 \cdot 20^2}{100 \cdot 20^2} + 1 = \frac{400}{100} + 1 = 5 \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 5 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\text{при } \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}};$$

$$H = 5 \sqrt{2-1} - \frac{q s^2}{2 V_0^2} 00 = 20 \cdot \sqrt{1} - \frac{10 \cdot 400}{2 \cdot 400} \cdot 5 =$$

$$40 - 25 = 15 \text{ м}$$

ответ к п. 2): 15 м


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) Запишем II З.Н. в проекциях на x и y (рис.):

$$\begin{cases} 0 y: mg \cos \alpha = N \\ 0 x: ma = mg \sin \alpha + F_{тр} \end{cases}$$

$$F_{тр} = \mu N = \mu mg \cos \alpha \Rightarrow$$

$$ma = mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha \Rightarrow a = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha).$$

Запомним, что, на скл. тр. коэффициент $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} =$

$$\sqrt{1 - 0,64} = \sqrt{0,36} = 0,6 \Rightarrow a = g\left(0,8 + \frac{0,6}{3}\right) = g$$


Ищем S_{max} — расстояние, на которое "подпрыгнет" груз. В этот момент его скорость $v_k = 0$.

$$0 = v_0 - at = v_0 - gt \Rightarrow t = \frac{v_0}{g}$$

$$S_{max} = v_0 t - \frac{at^2}{2} = \frac{v_0^2}{g} - \frac{g v_0^2}{2g^2} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{4 \cdot 4}{2 \cdot 10} = \frac{16}{20}$$

$= 0,8$ м. Значит, в первом опыте груз подпрыгнет и уже спускается при значении пути S .

Рассмотрим процесс спуска:



$$ma_2 = mg \sin \alpha - \mu N = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha \Rightarrow$$

$$a_2 = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = g\left(0,8 - \frac{0,6}{3}\right) = 0,6g$$

$$S - S_{max} = \frac{a_2 t_2^2}{2} \Rightarrow t_2^2 = \frac{2(S - S_{max})}{a_2} = \frac{S - S_{max}}{0,3g} \Rightarrow$$

$$T = t + t_2 = \frac{v_0}{g} + \sqrt{\frac{S - S_{max}}{0,3g}} = \frac{4}{10} + \sqrt{\frac{0,2}{3}} = \frac{312}{300}$$

$$0,4 + \frac{1}{\sqrt{15}} = \frac{0,4\sqrt{15} + 1}{\sqrt{15}}$$

$$\text{Ответ к п.1): } T = 0,4 + \frac{1}{\sqrt{15}} = \frac{6 + \sqrt{15}}{15}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Поря QR-кода недопустима!

2) Перебрав в CO_1 "транспортер". Рассмотрев движение относительно этой CO . Заметим, что ускорение и силы, действующие на груз такие же, как в пункте 1). $\Rightarrow a_2 = g$ (a_2 - уск. груза)

Если $v_2 = u$, то груз в CO_1 "транспортер" покоится $\Rightarrow v_{отн} = 0$. Тогда:

$V_0 - g t_3 = 0 \Rightarrow t_3 = \frac{V_0}{g}$. Из пункта 1) следует, что т.к. в CO_2 "транспортер" движение происходит как в ЛСО в п. 1), то $S_2 = S_{max}$ (перемещение относительно транспортера). Тогда:

$$L = ut + S_{max} = \frac{uV_0}{g} + S_{max} = \frac{2 \cdot 4}{10} + 0,8 = 1,6 \text{ м}$$

Ответ к п. 2): $L = 1,6 \text{ м}$

3) Если в ЛСО $v_{груза} = 0$, то в CO_1 "транспортер"

$v_{отн. груза} = u$. Из п. 1) следует, что $a_{груза} = 0,6g$ при движении вниз, $\Rightarrow u = 0,6g t_k$ (t_k - время от движения транспортера момента из пункта 2) и до остановки и в CO_1 "транспортер")

$$t_k = \frac{u}{0,6g} \Rightarrow L_2 = \frac{at_k^2}{2} = \frac{0,5g u^2}{2 \cdot (0,6g)^2} = \frac{u^2}{2 \cdot 0,6g}$$

В ЛСО перемещение груза за это время:

$$\Delta L = ut_k - \frac{u^2}{2 \cdot 0,5g} = \frac{u^2}{0,6g} - \frac{u^2}{2 \cdot 0,6g} = \frac{u^2}{1,2g} \Rightarrow$$

$$H = (L + \Delta L) \sin \alpha = \left(1,6 + \frac{1}{3}\right) 0,8 = \frac{5,8}{3} \cdot 0,8 = \frac{4,64}{300} \cdot \frac{116}{75} \text{ м}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) Рассмотрим I случай.
II.3.н.:

$$ma = F \cos \alpha - F_{\text{тр}}; F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg \Rightarrow$$

$$ma = F \cos \alpha - \mu mg; F_{\text{тр}} = \mu N = \mu (mg - F \sin \alpha) \Rightarrow$$

$$ma = F \cos \alpha - \mu mg + \mu F \sin \alpha = F (\cos \alpha + \mu \sin \alpha) -$$

μmg

II случай:


$$ma_2 = F - \mu N = F - \mu mg$$

$t_1 = t_2$ (по условию время разгона в обоих случаях 1 из 2 одинаково)

$$\frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{a_2} \Rightarrow a = a_2 \Rightarrow F (\cos \alpha + \mu \sin \alpha) = F \Rightarrow$$

$$\cos \alpha + \mu \sin \alpha = 1 \Rightarrow \mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

ответ к н. 1): $\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$



II.3.н.

$$ma_3 = F_{\text{тр}}$$

(N') - сила реакции
(m - масса саней)
(a_3 - ускорение)

$$ma_3 = \mu N' = \mu mg \Rightarrow$$

$a_3 = \mu g$. При остановке скорость равна 0 $\Rightarrow$

$$0 = v_0 - a_3 T = v_0 - \mu g T \Rightarrow T = \frac{v_0}{\mu g} = \frac{v_0}{g(1 - \cos \alpha)} \sin \alpha$$

ответ к н. 2): $T = \frac{v_0 \sin \alpha}{(1 - \cos \alpha) g}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) В процессе 1-2 $c_{12} = \text{const}$

$$Q = c_{12} \Delta T_{12} = A_{r12} + \Delta U_{12} \quad (\text{по I закону термодинамики})$$

$$c_{12} \Delta T_{12} - \Delta U_{12} = A_{r12}$$

$$A_{r12} = c_{12}(4T_1 - T_1) - \frac{3}{2} \nu R (4T_1 - T_1)$$

$$= 2R \cdot 3T_1 - \frac{3}{2} R \cdot 3T_1 = 3T_1(2R - 1.5R) = \frac{3}{2} R T_1 =$$

$$\frac{3}{2} \cdot 8,31 \cdot 400 = 4986 \text{ Дж} \leftarrow \text{ответ к п 1)}$$

2) $\eta = \frac{A_r}{Q_H}$ - работа газа

Q_H - теплота на нагрев $\eta = 1 - \frac{|Q_X|}{Q_H}$

$$\eta = \frac{A_{12} + A_{23} + A_{31}}{Q_H}$$

$$\eta = \frac{A_r}{6RT_1}$$

$$\begin{cases} Q_{12} = c_{12} \Delta T_{12} = 2R \cdot 3T_1 > 0 \\ Q_{23} = c_{23} \Delta T_{23} = \frac{R}{2} T_1 (2^{1.5} - 4) < 0 \\ Q_{31} = c_{31} \Delta T_{31} = 2.5R T_1 (1 - 2^{1.5}) < 0 \end{cases}$$

$Q_H = Q_{12} \quad (Q_{23} \text{ и } Q_{31} < 0)$

$$A_r = Q_H A_{12} + c_{23} \Delta T_{23} - \frac{3}{2} \nu R \Delta T_{23} + c_{31} \Delta T_{31} - \frac{3}{2} \nu R \Delta T_{31}$$

$$= A_{12} + R T_1 \left(\frac{2^{1.5} - 4}{2} + \frac{5}{2} (1 - 2^{1.5}) \right) - \frac{3}{2} \nu R (T_1 (2^{1.5} - 4 + 1.5))$$

$$= \frac{3}{2} R T_1 + R T_1 \left(\frac{2^{1.5} - 4 + 5 - 5 \cdot 2^{1.5}}{2} \right) - \frac{3}{2} R T_1 (-3) =$$

$$R T_1 \left(\frac{3}{2} + \frac{9}{2} + \frac{-4 \cdot 2^{1.5} + 1}{2} \right) = \frac{831 \cdot 4}{2} (1 - 4 \cdot 2^{1.5}) =$$

$$1662 (1 - 4 \cdot 2^{1.5}) = 1662 \cdot 4 (3 - 2^{1.5}) \approx 6648 \cdot 0,24$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МОТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Печать QR-кода недопустима!



$$\eta = 1 - \frac{|Q_x|}{Q_n} = 1 - \frac{|Q_{23} + Q_{41}|}{6RT_1} = 1 - 1 \cdot \frac{0,5 \cdot 4\sqrt{2}}{6} =$$

$$1 - \frac{1 - 8\sqrt{2}}{12} = \frac{11 + 8\sqrt{2}}{12} \approx \text{ответ к н.2)}$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) Запишем II З.Н. для шарика 1
а - угол между диаг. и стороной,
 F_{K1} и F_{K2} , T - см. рис.


$$2T \cos d = 2F_{K1} \cos d + F_{K2} = 2k \frac{q^2}{b^2} \cos d + k \frac{q^2}{b^2} =$$

$$kq^2 \left(\frac{2}{b^2} \cos d + \frac{\cos^2 d}{b^2} \right) = kq^2 \frac{1}{b^2} \left(2 \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \right) =$$

$$\frac{kq^2}{b^2} \left(\frac{2\sqrt{2}+1}{2} \right)$$

ответ к п. 1) $T = \frac{kq^2}{b^2} \frac{2\sqrt{2}+1}{2\sqrt{2}}$

2) по ЗСЭ:



$$\frac{mv^2}{2} = q(\varphi_k - \varphi_n), \text{ где } \varphi_k \text{ и } \varphi_n - \text{потенциалы}$$

для точек нахождения шарика 1.

Тогда по принципу суперпозиции:

$$\frac{mv^2}{2} = q \left(k \frac{q}{b} + k \frac{q}{2b} + \frac{kq}{3b} - \frac{kq}{b} - \frac{kq}{b} - \frac{kq}{b} \cos d \right)$$

$$= kq^2 \frac{1}{b} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (-1) = \frac{kq^2}{b} \left(\frac{2}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{kq^2}{b} \left(\frac{2+\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{3+3\sqrt{2}-2}{6} \frac{kq^2}{b} = \frac{1+3\sqrt{2}}{6} \frac{kq^2}{b}$$

$$v = \sqrt{\frac{7+3\sqrt{2}}{3} \frac{kq^2}{bm}} \leftarrow \text{ответ к п. 2)} \right)$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐



МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



3) На ЦМ внешние силы не действуют $\Rightarrow$
он не изгибается. $\Rightarrow$ искомое расстояние

7) начальные положения: 2. конечное;



ЦМ геометрии:

$$\begin{cases} r_1 = b \\ r_2 = \frac{b}{2} \end{cases} \Rightarrow x \quad d = b^2 + \frac{b^2}{4} = \frac{5}{4} b^2$$

$$d = \frac{\sqrt{5} b}{2} \leftarrow \text{ответ на 3).$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице.


1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порука QR-кода недопустима!



$\sin \alpha = 0,8$ 1) Запишем II з.Н.



Потом $m \sim$ масса
пузыря. Плагин x и y (мкс.);

$$ma = mg \sin \alpha + F_{tr}$$

$F_{tr} = \mu N$ — сила трения, N — реакция опоры.

$$ma = mg \sin \alpha + \mu N$$

$$N = mg \cos \alpha \Rightarrow ma = mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha = mg(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow a = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

Потом, м.к. движение равноускоренное, по оси x :

$$S = v_0 t - \frac{at^2}{2} = v_0 t - \frac{g}{2} t^2 (\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

$$\frac{at^2}{2} - v_0 t + S = 0. \text{ Дискриминант } D = v_0^2 - 4 \frac{a}{2} S = v_0^2 - 2as$$

$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2as}}{a}$$

(со знаком - перед $\sqrt{D}$ $t < 0$)

$$a = g(0,8 + \mu \sqrt{1 - 0,64}) = g(0,8 + \frac{\sqrt{1 - 0,64}}{3}) = g(0,8 + \frac{0,6}{3}) = g$$

$$t = \frac{4 + \sqrt{16 - 20 \cdot 1}}{10} =$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Поря QR-кода недопустима!



$$\sin \alpha = 0,8$$

$$1) \text{ о.у.: } N = mg \cos \alpha$$

$$ma = mg \sin \alpha + \mu N = mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha$$

$$a = g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha$$

$$s = V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$s = 8$$

$$V_0^2 - 2as = 0$$

$$V_0^2 - 2as = 0$$

$$V_0^2 - 2as = 0$$

$$t = \frac{V_0 + \sqrt{V_0^2 - 2as}}{a}$$

2) Импульсный транспортер:

$$s = \frac{V_0^2 - 0^2}{2a} = \frac{V_0^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

$$L = ut + \frac{V_0^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$


$$L = \frac{uV_0}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} + \frac{V_0^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

$$0 = V_0 - at \Rightarrow$$

$$t = \frac{V_0}{a} = \frac{V_0}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

$$\begin{array}{r} 58 \\ \times 8 \\ \hline 464 \\ 3 \quad 176 \\ \hline 464 \end{array}$$

3) Импульсный транспортер:



$$ma = mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha \Rightarrow a = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

$$s = \frac{u^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

$$u = at \Rightarrow t = \frac{u}{a}$$

$$L = ut - s \Rightarrow L = \frac{u^2}{g} - \frac{u^2}{2a} = \frac{u^2}{2a}$$

$$L' = L + s; H = L' \sin \alpha$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) I вариант

$$ma_1 = F \cos \alpha - \mu N$$


$$dQ = \Delta U + p \Delta V$$

$$N = mg - F \sin \alpha \Rightarrow$$

$$ma_1 = F \cos \alpha - \mu mg + \mu F \sin \alpha =$$

$$F(\cos \alpha + \mu \sin \alpha) - \mu mg$$

$$dQ = C \Delta T$$



$$ma_2 = F - \mu mg$$

$$p \Delta V + \frac{3}{2} R \Delta T = C \Delta T$$

$$t_1 = \frac{V_0}{a_1}; t_2 = \frac{V_0}{a_2} \Rightarrow a_1 = a_2 \Rightarrow$$

$$\cos \alpha = C = p \frac{dV}{dT} \tan \alpha$$

$$p \frac{dV}{dT} = \cos \alpha$$


$$\cos \alpha + \mu \sin \alpha = 1$$

$$\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$p(V) = \gamma R \Delta T; \Delta T$$

$$p \Delta V + V \Delta p = \gamma R \Delta T$$


$$p \gamma V \cos \alpha \Delta T$$



$$ma_3 = \mu mg \Rightarrow a_3 = \mu g$$

$$0 = V_0 - a_3 t = V_0 - \mu g T \Rightarrow \mu g T = V_0 \Rightarrow$$

$$T = \frac{V_0}{\mu g} = \frac{V_0}{(1 - \cos \alpha) g} \sin \alpha$$



$$Q = C \Delta T$$

$$\frac{A_r + \Delta U}{C} = \Delta T$$

$$A_{12} = C \Delta T - \Delta U$$

$$A_{12} = C_{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{2} T_2 - T_1 \right) - \frac{3}{2} \gamma R (4 T_2 - T_1)$$

$$8.31 \cdot 3 \cdot 2$$

$$\times 8.31 \cdot \dots$$

$$\frac{49.86}{8.31}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порядок QR-кода неопустима!



$$2) \eta = \frac{A_r}{Q_n}$$

$$Q_{12} = C_{12} \Delta T_{12}$$


$$Q_{13} = C_{13} \Delta T_{13}$$

$$Q_{23} = C_{23} \Delta T_{23}$$

$$A_{r12} = C_{12} \Delta T_{12} - \frac{3}{2} \sqrt{R} \Delta T_{12}$$

$$A_{r13} = C_{13} \Delta T_{13} - \frac{3}{2} \sqrt{R} \Delta T_{13}$$

$$A_{r23} = C_{23} \Delta T_{23} - \frac{3}{2} \sqrt{R} \Delta T_{23}$$



$$1) 2T \cos \alpha = F_{k2} + 2F_{k1} \cos \alpha$$

$$2T \cos \alpha = K \frac{q^2}{2b^2} + 2K \frac{q^2}{b^2} \cos \alpha$$

$$2) \eta = \frac{RT_1}{RT_2}$$

$$\frac{Mv^2}{2} = q(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = K \frac{q}{b} + K \frac{q}{b} + K \frac{q}{\sqrt{2}b}$$

$$H = S \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - \frac{qS^2}{2\sqrt{1-\beta^2}} = 0$$


$$2) H = V_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

$$1) 0 = V_0 - gt \Rightarrow$$

$$t = \frac{V_0}{g}$$

$$V_0 = gt$$

$$t = \frac{S}{V_0 \cos \alpha}$$



$$V_0 \cos \alpha t = S$$

$$H = V_0 \sin \alpha t = \frac{gt^2}{2}$$

$$H = \frac{SV_0 \sin \alpha}{V_0 \cos \alpha} = \frac{gS^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} = S \tan \alpha - \frac{gS^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} =$$

$$S \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1} - \frac{gS^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} = 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$H = S \sqrt{x-1} - \frac{gS^2}{2V_0^2} x$$

$$H) = S \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x-1}} - \frac{gS^2}{2V_0^2} = 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x-1}} = \frac{gS}{2V_0^2} \quad \sqrt{x-1} = \frac{V_0^2}{gS^2}$$

$$x-1 = \frac{V_0^4}{g^2 S^2} \Rightarrow x = \frac{g^2 T^4}{g^2 S^2} + 1 = \frac{g^2 T^4}{S^2} + 1$$

$$\frac{100 \cdot 16}{400} = \frac{16}{1} = 4$$

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 4 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

$$V_0 \cos \alpha$$

$$0 = V_0 \sin \alpha - gt \Rightarrow$$

$$t = \frac{V_0 \sin \alpha}{g}$$

$$L = \frac{V_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$$