



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

9 КЛАСС. Вариант 14



1. [4 балла] Натуральные числа a , b , c таковы, что ab делится на $3^{14}7^{13}$, bc делится на $3^{19}7^{17}$, ac делится на $3^{23}7^{42}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-9ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{3x^2-5x+6}-\sqrt{3x^2+x+1}=5-6x.$$

4. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , диаметр AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC=1$ и $BC=25$. Найдите длину общей касательной к окружностям ω и Ω .

5. [4 балла] Ненулевые действительные числа x , y , z удовлетворяют равенствам

$$5x-y=3z \quad \text{и} \quad \frac{8}{x}+\frac{1}{y}=\frac{15}{z}.$$

Найдите наименьшее возможное значение выражения $\frac{25x^2-y^2-z^2}{y^2+3z^2}$.

6. [5 баллов] Из пункта A в пункт B выезжают одновременно велосипедист и мотоциклист. Оба они движутся с постоянной скоростью, и мотоциклист прибывает в пункт B на 1 час раньше велосипедиста. Если бы велосипедист ехал со своей скоростью в течение того времени, что понадобилось мотоциклисту на дорогу от A к B , а мотоциклист – в течение того времени, что понадобилось велосипедисту на этот путь, то мотоциклист проехал бы на 49 километров больше. Если бы скорость каждого из них возросла на 7 км/ч, то велосипедист приехал бы в B на 36 минут позже велосипедиста. Найдите расстояние между A и B .
7. [6 баллов] Вписанная окружность ω прямоугольного треугольника ABC с прямым углом B касается его сторон CA , AB , BC в точках D , E , F соответственно. Луч ED пересекает прямую, перпендикулярную BC , проходящую через вершину C , в точке Y ; X – вторая точка пересечения прямой FY с окружностью ω . Известно, что $EX=\sqrt{2}XY$. Найдите отношение $AD:DC$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N=1

Пусть ~~$a = 3^{\alpha} \cdot 7^{\beta}$~~ , $2a, 2b, 2c, \beta a, \beta b, \beta c$ -

наибольшие такие, что $a : 3^{2a} \cdot 7^{\beta a}$,

$b : 3^{2b} \cdot 7^{\beta b}$, $c : 3^{2c} \cdot 7^{\beta c}$.

Т.к. $ab : 3^{14}$, $bc : 3^{19}$, $ac : 3^{23}$, то

$$\begin{cases} 2a + 2b \geq 14, \\ 2b + 2c \geq 19, \\ 2c + 2a \geq 23, \end{cases} \text{ отсюда } 2a + 2b + 2c \geq \frac{23 + 14 + 19}{2} = 28$$

Т.к. $ab : 7^{13}$, $bc : 7^{17}$, $ac : 7^{42}$, то

$$\begin{cases} \beta a + \beta b \geq 13, \\ \beta b + \beta c \geq 17, \\ \beta c + \beta a \geq 42, \end{cases} \text{ отсюда } \beta a + \beta b + \beta c \geq \frac{13 + 17 + 42}{2} = 36$$

$$\text{Следовательно, } abc \geq 3^{2a} \cdot 7^{\beta a} \cdot 3^{2b} \cdot 7^{\beta b} \cdot 3^{2c} \cdot 7^{\beta c} = 3^{2a+2b+2c} \cdot 7^{\beta a+\beta b+\beta c} \geq 3^{28} \cdot 7^{36}$$

Пример где $abc = 3^{28} \cdot 7^{36}$, $a = 3^9 \cdot 7^{19}$, $b = 3^5 \cdot 7^{14}$

Т.к. $\beta b \geq 0$, то $\beta a + \beta b + \beta c \geq 42$.

$$\text{Следовательно, } abc \geq 3^{2a} \cdot 7^{\beta a} \cdot 3^{2b} \cdot 7^{\beta b} \cdot 3^{2c} \cdot 7^{\beta c} = 3^{2a+2b+2c} \cdot 7^{\beta a+\beta b+\beta c} \geq 3^{28} \cdot 7^{42}$$

Пример где $abc = 3^{28} \cdot 7^{42}$, $a = 3^9 \cdot 7^{19}$, $b = 3^5$, $c = 3^{14} \cdot 7^{23}$.

Ответ: $3^{28} \cdot 7^{42}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$N \div 2$

Пример для $m=11$: $a=10$, $b=1$,

$$\frac{a+b}{a^2-9ab+b^2} = \frac{11}{100-90+1} = \frac{11}{11}, \text{ можно сокр. на } 11.$$

$$\text{По алгоритму Евклида } (a+b, a^2-9ab+b^2) = (a+b, (a+b)^2-11ab) = (a+b, -11ab).$$

$$\text{П.к. } a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, \text{ то } (a+b, -11ab) = (a+b, 11ab).$$

П.к. grado $\frac{a}{b}$ несократима, то $(a, b) = 1$,

а-но, $(a+b, b) = 1$ и $(a+b, ab) = 1$. Но тогда

$(a+b, 11ab)$ не может быть больше 11.

Тогда $m \geq 11$.

Ответ: 11.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$N^{\circ} 3$

Пусть $\sqrt{3x^2 - 5x + 6} = a$, $\sqrt{3x^2 + x + 1} = b$,
тогда $a - b = 5 - 6x$.

$$a^2 = 3x^2 - 5x + 6, \quad b^2 = 3x^2 + x + 1.$$

$$a^2 - b^2 = -5x - x + 6 - 1 = -6x + 5.$$

А-но, $a - b = a^2 - b^2 \Leftrightarrow (a - b)(a + b) - (a - b) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (a - b)(a + b - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b, \\ a + b = 1. \end{cases}$

1) Если $a = b$, то $\begin{cases} 5 - 6x = 0, \\ \sqrt{3x^2 - 5x + 6} = \sqrt{3x^2 + x + 1} \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{6}, \\ -5x + 6 = x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{6}, \\ x = \frac{5}{6} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{6}.$$

2) Если $a + b = 1$, то $5 - 6x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$. Тогда

$$a = \sqrt{3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 5 \cdot \frac{2}{3} + 6} = \sqrt{\frac{4}{3} - \frac{10}{3} + 6} = \sqrt{4} = 2,$$

$$b = \sqrt{3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} + 1} = \sqrt{\frac{4}{3} + \frac{2}{3} + 1} = \sqrt{2}.$$

$$\begin{cases} a - b = 5 - 6x, \\ a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 - 3x, \\ b = 3x - 2. \end{cases}$$

$$\sqrt{3x^2 - 5x + 6} = 3 - 3x \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 5x + 6 = 9 + 9x^2 - 18x, \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 - 13x + 3 = 0, \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{13 \pm \sqrt{97}}{12}, \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{13 - \sqrt{97}}{12}.$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{3x^2+x+1} = 3x-2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2+x+1 = 9x^2-12x+4, \\ x \geq \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2-13x+3=0, \\ x \geq \frac{2}{3} \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{13 \pm \sqrt{97}}{12}, \\ x \geq \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{13 + \sqrt{97}}{12}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{13 + \sqrt{97}}{12}, \text{ т.к. } \frac{13 - \sqrt{97}}{12} < \frac{13 - \sqrt{81}}{12} < \frac{1}{3}$$

Таким образом, единственным корнем
ур-я является $x = \frac{5}{6}$.

Ответ: $\left\{ \frac{5}{6} \right\}$.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
☐

2
☐

3
☐

4
☒

5
☐

6
☐

7
☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

а-по, $r^2 = 169 - 144$, а т.к. $r > 0$, то $r = 5$.

Тогда $|O_1M| = 5$, $|O_2N| = 13$

O_1MNH - прямоугольник, т.к. $\angle O_1MN = \angle MNH =$

$= \angle HNO_1 = 90^\circ$, а-по, $|NH| = |O_1M| = 5$, $|HO_2| = 13 - 5 = 8$,

$$|MN| = |O_1H| = \sqrt{|O_1O_2|^2 - |O_2H|^2} = \sqrt{13^2 - 8^2} = \sqrt{169 - 64} = \sqrt{105}.$$

Ответ: $\sqrt{105}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

N°6. Пусть скорость велосипедиста x км/ч, мотоциклиста - y км/ч. П.х. мотоциклист приедет в В на 12 раньше велосипедиста, но $\frac{S}{y} + 1 = \frac{S}{x}$, где S - расст. от А до В. Если бы скор. каждого из них возросла на 7 км/ч, то велосипедист приедет в В за $\frac{S}{x+7}$ (ч), мотоциклист - $\frac{S}{y+7}$ (ч), т.е. по условию $\frac{S}{y+7} + \frac{3}{5} = \frac{S}{x+7}$. Если бы велосип. ехал со своей скор. в течение того времени, что пока мотоцикл. на этот путь, то проехал бы $\frac{xS}{y}$ (км), мотоцикл. - $\frac{yS}{x}$ (км). Тогда по условию $\frac{yS}{x} - \frac{xS}{y} = 49$.

Имеем с-му (решая ее, будем иметь в виду $x > 0, y > 0, x \neq y$ по условию задачи)

$$\begin{cases} \frac{S}{y} + 1 = \frac{S}{x}, \\ \frac{yS}{y+7} + \frac{3}{5} = \frac{S}{x+7}, \\ \frac{yS}{x} - \frac{xS}{y} = 49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = \frac{49xy}{y^2 - x^2}, \\ \frac{S}{y} + 1 = \frac{S}{x}, \\ \frac{yS}{x} - \frac{xS}{y} = 49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = \frac{49xy}{y^2 - x^2}, \\ 49x + y^2 - x^2 - 49y = 0, \\ \frac{yS}{x} - \frac{xS}{y} = 49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = \frac{49xy}{y^2 - x^2}, \\ (x-y)(49-x-y) = 0, \\ \frac{yS}{x} - \frac{xS}{y} = 49 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=49, \\ S = \frac{xy}{y-x}, \\ \frac{5S(x+7)+3(56-y)(y+7)-5S(y+7)}{5(x+7)(y+7)} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=49, \\ S = \frac{xy}{x-y}, \\ \frac{5S(56-y)+3(56-y)(y+7)-5S(y+7)}{5(56-y)(y+7)} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=49, \\ S = \frac{xy}{x-y}, \\ 5S \cdot (49-2y) = 3(56-y)(y+7) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=49, \\ S = \frac{(49-y)y}{49-2y}, \\ S = \frac{3(56-y)(y+7)}{5(49-2y)} \end{cases}$$

Тогда $5(49-y)y = 3(56-y)(y+7) \Leftrightarrow 245 - 5y^2 = 168y + 21y^2 + 1776 \Leftrightarrow 8y^2 - 147y - 1421 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{203}{8}$, а тогда, $y = \frac{203}{8}$, тогда $x = 49 - \frac{203}{8} = 23\frac{5}{8} = \frac{189}{8}$, а $S = \frac{203 \cdot 189}{8 \cdot 14} = \frac{29 \cdot 189}{16} = \frac{5481}{16}$ (км).

Ответ: $\frac{5481}{16}$ км.

(здесь я использовал $\angle DFY = \angle XDC$, т.к. (DC) -касат. к ω_X $\angle DFY = \angle DCY/2$, т.к. $\angle DFY$ -вписанный в (FDY) , опир. на $\cup DY$, а $\angle DCY$ -центральный, опир. на $\cup DY$).



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Потому $\angle EDX = 90^\circ$, а по, EX - диаметр ω ,
откуда $FX = EX \cdot \sin \angle FEX$.

$\angle YFC = \angle FYC = 45^\circ$, т.к. $\angle FCY = 90^\circ$, $FC = CY$,
тогда $\angle FEX = \angle XFC = \angle YEC = 45^\circ$, т.к. FC -
касательная к ω .

$$\text{Отсюда } FX = EX \cdot \sin 45^\circ = \sqrt{2} \cdot XY \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = XY$$

~~т.к. (YDE) и (YXF) - касательные к ω , то
 $YD \cdot YE = YX \cdot YF$~~

Потому X - середина FY , $\angle CXY = 90^\circ$, т.к.
 $\triangle FCY$ - равноб., и $CX = XY$, т.к. $\triangle FCY$ - прямоугол.

$$\angle XCY = \angle FCY / 2 = 45^\circ$$

$$\frac{YD}{YF} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$YD = \sqrt{2} YX$$

$$YD \cdot YE = 2 YX^2$$

$$YE = \sqrt{2} YX$$

$$ED =$$

$$AD:DC = \frac{1}{2}$$

Ответ: 1; 2





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$C = \begin{matrix} Bc = 23 \\ Ba = 19 \\ Bc = 26 \end{matrix}$$



$$2r \cdot t = 12^2$$

$$r \cdot t = 72$$

$$r + t = 13$$

$$13t - t^2 - 72 = 0$$

$$t^2 - 13t + 72 = 0$$

$$t = 7$$

$$t(t+2r) = 72$$

no, 13
↑

$$(a, b) = 1$$

$$\frac{a+b}{a^2 - 9ab + b^2} = \frac{a+b}{(a+b)^2 - 7ab}$$

$$7ab : a+b$$


$$\frac{73 + 17 + 42}{2} = 36$$

$$a = 3 \alpha a \text{ и } \beta a$$

$$2\alpha + 2\beta \geq 14$$

$$2\beta + 2\gamma \geq 19$$

$$2\gamma + 2\alpha \geq 23$$



$$EX = 12 \times Y$$