



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 4



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^6 3^{13} 5^{11}$, bc делится на $2^{14} 3^{21} 5^{13}$, ac делится на $2^{16} 3^{25} 5^{28}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,4$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_{x^3} \frac{1}{121} - 5, \quad \text{и} \quad \log_{11}^4 (0,5y) + \log_{0,5y} 11 = \log_{0,125y^3} (11^{-13}) - 5.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-15;90)$, $Q(2;90)$ и $R(17;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $6x_2 - 6x_1 + y_2 - y_1 = 48$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 180, $SA = BC = 20$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 6$, а радиус сферы Ω равен 8.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$a, b, c \in \mathbb{N}$ $ab: 2^6 3^{13} 5^{11}$; $bc: 2^{14} 3^{21} 5^{13}$; $ac: 2^{16} 3^{25} 5^{28}$ (✓1)

Пусть $v_p(x)$ - наибольшая степень вхождения простого числа p в разложение числа x на простые множители ($x \in \mathbb{N}$)

По свойствам степеней: $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$

$$\begin{cases} v_2(a) + v_2(b) \geq 6 & (1) \\ v_2(b) + v_2(c) \geq 14 & (2) \\ v_2(a) + v_2(c) \geq 16 & (3) \end{cases}$$

$$\frac{(1) + (2) + (3)}{2}: v_2(a) + v_2(b) + v_2(c) \geq 18$$

Это достигается при: $v_2(a) = 2$; $v_2(b) = 4$; $v_2(c) = 12$

$$\min v_2(abc) = 18$$

Аналогично для 3:

$$\begin{cases} v_3(a) + v_3(b) \geq 13 \\ v_3(b) + v_3(c) \geq 21 \\ v_3(a) + v_3(c) \geq 25 \end{cases}$$

$$v_3(a) + v_3(b) + v_3(c) \geq \frac{59}{2}, \text{ но к.к. } v_3(x) - \text{натуральное, то}$$

$$v_3(a) + v_3(b) + v_3(c) \geq 30$$

Достигается при $v_3(a) = 5$; $v_3(b) = 9$; $v_3(c) = 16$

$$\min v_3(abc) = 30$$

Для 5:

$$\begin{cases} v_5(a) + v_5(b) \geq 11 \\ v_5(b) + v_5(c) \geq 13 \\ v_5(a) + v_5(c) \geq 28 \end{cases} \quad (4)$$

$$v_5(a) + v_5(b) \geq 0$$

$$v_5(a) + v_5(b) + v_5(c) \geq 28$$

$$\text{Достигается: } v_5(a) = 14; v_5(b) = 0; v_5(c) = 14$$

$$\min v_5(abc) = 28$$

$$\text{Тогда минимальное } abc = 2^{18} 3^{30} 5^{28}$$

$$\text{Ответ: } 2^{18} 3^{30} 5^{28}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№3

$$10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$$

$$\arccos(\sin x) = \frac{9\pi}{10} - \frac{x}{5} \quad \text{ОДЗ: } \begin{cases} \frac{9\pi}{10} - \frac{x}{5} \in [0; \pi] \\ \sin x \in [-1; 1] \end{cases}$$

$$\sin x = \cos\left(\frac{9\pi}{10} - \frac{x}{5}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{9\pi}{10} + \frac{x}{5}\right) = \sin\left(\frac{x}{5} - \frac{2\pi}{5}\right)$$

$$\begin{cases} x + 2\pi k = \frac{x}{5} - \frac{2\pi}{5} \\ \pi - x + 2\pi k = \frac{x}{5} - \frac{2\pi}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2\pi = 10\pi k \\ -6x + 2\pi = 10\pi h \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{7\pi}{6} + \frac{5\pi h}{3}, h \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{9\pi}{10} - \frac{x}{5} \in [0; \pi]$$

$$0 \leq 9\pi - 2x \leq 10\pi$$

$$-9\pi \leq -2x \leq \pi$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 4,5\pi$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi k}{2} \leq 4,5\pi$$

$$0 \leq \frac{k}{2} \leq 1; k \in \{0, 1, 2\}$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \frac{7\pi}{6} + \frac{5\pi h}{3} \leq \frac{9}{2}\pi$$

$$-3\pi \leq 7\pi + 10\pi h \leq 22\pi$$

$$-10\pi \leq 10\pi h \leq 20\pi$$

$$-1 \leq h \leq 2$$

$$h \in \{-1, 0, 1, 2\}$$

Ответ: $x = -\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi k}{2}; k \in \{0, 1, 2\}$

$$x = \frac{7\pi}{6} + \frac{5\pi h}{3}; h \in \{-1, 0, 1, 2\}$$

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} 5x + 6ay - 6 = 0 \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

(N4)

$$\begin{cases} 5x + 6ay - 6 = 0 & (1) \\ \begin{cases} x^2 + y^2 = 5^2 \\ x^2 + (y+9)^2 = 2^2 \end{cases} & (2) \end{cases}$$

Изобразим график
совокупности (2)

(1): $5x + 6ay - 6 = 0$

$$y = \frac{-5x + 6}{6a}, \text{ Путь } K = \frac{-5}{6a}$$

Найдем такие K , что не
существует 4 решения для
системы ни при каком a

$$Kl_2 \leq K \leq Kl_1$$

$$K(l_1 = \tan \angle = \frac{FB}{OB})$$

l_1 - касательная к двум окружностям

$F = (l_1 \cap Oy)$; A, B - точки касания с
окружностями


$\triangle FOB \sim \triangle FO_2A$, Путь m - коэффициент подобия,

$$m = \frac{OB}{O_2A} = 2,5; \quad m = \frac{OF}{FO_2} = 2,5; \quad OF + FO_2 = 9; \quad OE = \frac{5}{7} \cdot 9$$

$\triangle FOB$: По теореме Пифагора: $FB^2 = OF^2 - OB^2 = 5^2 \left(\frac{81}{49} - 1 \right)$

$$FB = 5 \sqrt{\frac{32}{49}} = \frac{20}{7} \sqrt{2}; \quad Kl_1 = \frac{4}{7} \sqrt{2}, \text{ Видно, что график симметричен относительно } Oy, \text{ тогда } Kl_2 = -Kl_1 = -\frac{4}{7} \sqrt{2}$$

$$-\frac{4}{7} \sqrt{2} \leq \frac{-5}{6a} \leq \frac{4}{7} \sqrt{2}; \quad -\frac{24\sqrt{2}}{35} \leq \frac{1}{a} \leq \frac{24\sqrt{2}}{35}$$





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$-\frac{24\sqrt{2}}{35} \leq \frac{1}{a} \leq \frac{24\sqrt{2}}{35}; \quad \begin{cases} a \leq -\frac{35}{48}\sqrt{2} \\ a \geq \frac{35}{48}\sqrt{2} \end{cases}$$

(24)

Тогда система может иметь ровно 4 решения

$$\text{при } a \in \left(-\frac{35}{48}\sqrt{2}; \frac{35}{48}\sqrt{2}\right)$$

Точка пересечения (1) с Oy — это точка с координатами $(0; \frac{b}{6a})$, она однозначно задаётся значением

b для каждого конкретного a , но найдётся такой

b для каждого a .

$$\text{Ответ: } \left(-\frac{35}{48}\sqrt{2}; \frac{35}{48}\sqrt{2}\right)$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Выразить уравнения прямых, заданных сторонами ^(№6)
параллелограмма

$$OR: y = 0 \quad QR: \frac{y-0}{90} = \frac{x-17}{2-17}; y = -6x + 102$$

$$PQ: y = 90 \quad OP: y = k(-15) = 90; k = -6; y = -6x$$

Все точки внутри параллелограмма удовлетворяют

условию:

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ y \leq 90 \\ y \geq -6x \\ y \leq -6x + 102 \end{cases}$$

$$\text{Площадь } A_1 = 6x_2 + y_2; B_1 = 6x_1 + y_1$$

$$A_1 - B_1 = 48$$

Точки A и B лежат внутри $OPQR$, то их координаты

удовлетворяют условию

$$\begin{cases} y_1 \geq 0 \\ y_2 \geq 0 \end{cases}; \begin{cases} y_1 \leq 90 \\ y_2 \leq 90 \end{cases}; \begin{cases} y_1 + 6x_1 \geq 0 \\ y_1 + 6x_1 \leq 102 \end{cases}; \begin{cases} y_2 + 6x_2 \geq 0 \\ y_2 + 6x_2 \leq 102 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq B_1 \leq 102 \\ 0 \leq A_1 \leq 102 \end{cases}; A_1 - B_1 = 48, \text{ то } B_1 \in [0; 54]$$

$$B_1 = 6x_1 + y_1; 6x_1 = B_1 - y_1; \text{ то } B_1 \equiv y_1 \pmod{6}$$

Если $B_1 \equiv 6$, то $y_1 \equiv 6$; $y_1 \leq 90$, то 16 вариантов y_1

для B_1 ; $B_1 \equiv 6$; $B_1 \in [0; 54] \rightarrow 10$ вариантов B_1

Для конкретного $B_1 \equiv 6$, есть уникальные $A_1 \equiv 6$, $y_2 \equiv 6$; $y_2 \leq 90$

16 вариантов y_2 Итого: $10 \cdot 16^2$

Если $B_1 \equiv k \pmod{6}$; $k \neq 0$, то $y_1 \equiv k \pmod{6}$; $A_1 \equiv k \pmod{6}$

45 вариантов $B_1 \rightarrow \frac{90}{6}$ вариантов для $y_1 \equiv k \pmod{6}$

↓
уникальные $A_1 \rightarrow \frac{90}{6}$ вариантов для $y_2 \equiv k \pmod{6}$. Итого: $45 \cdot 15^2$

Ответ: 12685




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{AB}{BD} = \frac{7}{3}$$


$$\begin{cases} \sqrt{5(a)} + \sqrt{5(b)} \geq 11 \\ \sqrt{5(b)} + \sqrt{5(c)} \geq 13 \\ \sqrt{5(a)} + \sqrt{5(c)} \geq 28/3 \end{cases}$$



$$S_{ACD} = \sqrt{10}x^2$$

$$CD^2 = 10x^2$$



$$CD = \sqrt{10}x$$



$$AC = \sqrt{(10+14)x^2} = \sqrt{24}x$$

$$BC^2 = 49x^2 - 14x^2 = 35x^2$$

$$BC = \sqrt{35}x$$



$$14x^2 = CE \cdot EM$$

$$EM^2 + FE^2 = (2R)^2$$


$$CE \cdot EF = S_{CEF}$$

$$R^2 - R^2 - y^2 + 2Ry = 14x^2$$

$$14x^2 =$$

$$\sin 2 = \frac{\sqrt{14}x}{2\sqrt{R^2 - 14x^2}}$$

$$S_{AFC} = \frac{CF}{BF}$$




$$AT = \sqrt{R^2 - 14x^2}$$

$$CF = R - \sqrt{R^2 - 14x^2}$$

$$AF^2 = 14x^2 + R^2 + R^2 - 14x^2 - 2R\sqrt{R^2 - 14x^2}$$

$$\triangle EFM - MF - \text{quadrangle}$$



$$AN = MF = \sqrt{R^2 - 14x^2}$$

$$4R^2 - 414x^2 - 14x^2 = CF^2$$