



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 2



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^7 3^{11} 5^{14}$, bc делится на $2^{13} 3^{15} 5^{18}$, ac делится на $2^{14} 3^{17} 5^{43}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,3$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .

3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} x + 3ay - 7b = 0, \\ (x^2 + 14x + y^2 + 45)(x^2 + y^2 - 9) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_7^4(6x) - 2 \log_{6x} 7 = \log_{36x^2} 343 - 4, \quad \text{и} \quad \log_7^4 y + 6 \log_y 7 = \log_{y^2} (7^5) - 4.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-17;68)$, $Q(2;68)$ и $R(19;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно на границе) и таких, что $4x_2 - 4x_1 + y_2 - y_1 = 40$.

7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 60, $SA = BC = 10$.

а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .

б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 3$, а радиус сферы Ω равен 4.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$1) \quad ab = 2 \cdot 2^7 \cdot 3^{11} \cdot 5^{11}, \quad bc = 2^{12} \cdot 3^{15} \cdot 5^{12}, \quad ac = 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{13}$$

$$a, b, c \in \mathbb{Z}$$

$$a^2 b^2 c^2 = (abc)^2 = x \cdot y \cdot z \cdot 2^{34} \cdot 3^{43} \cdot 5^{75}$$

$$abc : 2^{17} \cdot 3^{\frac{43}{2}} \cdot 5^{\frac{75}{2}} ;$$

Но так $a, b, c \in \mathbb{N}$, то:

$$(abc)_{\min} = 2^{17} \cdot 3^{43} \cdot 5^{75}$$

$$\text{Ответ: } 2^{17} \cdot 3^{43} \cdot 5^{75}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

12) Обозначим DB за $10x$,
тогда $AB = 13x \Rightarrow AD = 3x$

Из подобия $\triangle DBE$ и $\triangle ABC$:

$$\frac{CB}{AB} = \frac{DB}{CB} \Rightarrow CB = x\sqrt{130}$$

$$\text{Тогда } AC = x\sqrt{39}; CD = x\sqrt{30}$$

Продолжим AB до пересечения

с окружностью. ~~$AB \cap \omega = T$~~ $AB \cap \omega = T$. Тогда, т.к.

$EF \parallel AB$, то $AETF$ — трапеция, а т.к. она
вписанная, то она равнобедренная. ($\angle ATF = \angle EAB$)

Т.к. AC — касательная, то $\angle CAF = \angle ATF$ (угол


~~между~~ между касательной и хордой). Тогда $\angle EAB = \angle CAF$
и $\triangle ACF \sim \triangle AED \Rightarrow \frac{ED}{CF} = \frac{AD}{AC} = \frac{3}{\sqrt{39}}$

$$\frac{CD - CE}{CF} = \frac{3}{\sqrt{39}} \Leftrightarrow \frac{x\sqrt{30}}{CF} - \frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{3}{\sqrt{39}} \Rightarrow CF = \frac{x \cdot 13 \sqrt{30}}{\sqrt{39} + 3\sqrt{13}}$$

Т.к. $\triangle ACD$ и $\triangle CEF$ — подобны, то если k — коэффициент
подобия, то: $k = \frac{AC}{CF} = \frac{39 + 3 \cdot 13}{13 \sqrt{30}} = \frac{6}{\sqrt{30}}$

$$\frac{S_{ACD}}{S_{CEF}} = k^2 = \frac{36}{30} = \frac{6}{5}$$

Ответ: $\frac{6}{5}$





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$^{\wedge} 3) \quad 5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$$



$$5 \arccos\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)\right) = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$\frac{3\pi}{2} + x \in [(b+k)\pi; (b+k)\pi]$$



$$5\left(\frac{3\pi}{2} + x - \pi k\right) = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$\left(\frac{15}{2} - 5k\right)\pi + 5x = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$4x = -6\pi + 5\pi k$$

$$x = -\frac{3}{2}\pi + \frac{5\pi}{4}k; \quad x \in \left[-\frac{3}{2}\pi + \pi k, -\frac{1}{2}\pi + \pi k\right]$$

~~$$\text{Ответ: } -\frac{3}{2}\pi + \frac{5\pi}{4}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$~~

~~$$k \in \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$~~

$$k \in \{0; 2; 4\}$$

~~$$\text{Ответ: } x = -\frac{3}{2}\pi$$~~

~~$$\begin{aligned} x &= -\frac{\pi}{4} \\ x &= \pi \\ x &= \frac{9\pi}{4} \\ x &= \frac{14\pi}{4} \end{aligned}$$~~

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x = -\frac{3}{2}\pi \\ x = \pi \\ x = \frac{7\pi}{2} \end{cases}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~4)

$$x + 3ay - 7b = 0$$

у-е прямой


$$(x^2 + 14x + y^2 + 45)(x^2 + y^2 - 9) = 0$$

у-е окружностей

с центром в т. $(-7; 0)$ и

радиусом 2; и с центром

в т. $(0; 0)$ и радиусом 3



При $a = 0$: при $b = 0 \rightarrow x = 0 \Rightarrow 4$ решения

$$\text{При } a \neq 0: y = -\frac{1}{3a}x + \frac{7b}{3a}$$

Не найдется такого b , чтоб система имела 4 решения, если укажем коэффициент прямой будет меньше, чем у "общей" касательной 1 или больше, чем у "общей" касательной 2.

$$\text{Касательная 1: } y = a_1x + b_1$$

$$\frac{2+3}{\sin \alpha} = 7 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{5}{7} \Rightarrow \alpha = \frac{5}{2\sqrt{6}}$$

$$-\frac{1}{3a} \in \left(-\frac{5}{2\sqrt{6}}; 0\right) \cup \left(0, \frac{5}{2\sqrt{6}}\right) \Rightarrow a \in \left(\frac{2\sqrt{6}}{15}; 0\right) \cup \left(0, \frac{2\sqrt{6}}{15}\right) \text{ или } a = 0$$

$$\text{Ответ: } a \in \left(-\frac{2\sqrt{6}}{15}; \frac{2\sqrt{6}}{15}\right)$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

решение)

$$-\frac{1}{3a} \in \left(-\frac{5}{2\sqrt{6}}; 0\right) \cup \left(0; \frac{5}{2\sqrt{6}}\right)$$

$$a \in \left(-\infty; -\frac{2\sqrt{6}}{15}\right) \cup \left(\frac{2\sqrt{6}}{15}; +\infty\right)$$

~~и~~ $a = 0$

Ответ: $a \in \left(-\infty; -\frac{2\sqrt{6}}{15}\right) \cup \{0\} \cup \left(\frac{2\sqrt{6}}{15}; +\infty\right)$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$15) \log_7^4(6x) - 2 \log_{6x} 7 = \log_{3(x^2-4)} 343 - 4 \quad \begin{matrix} y > 0; y \neq 1 \\ x > 0; x \neq \frac{1}{6} \end{matrix}$$

$$\log_7^4 y + 6 \log_y 7 = \log_{7^2} (7^5) - 4$$

$$\log_7^4(6x) - \frac{2}{\log_7(6x)} = \frac{3}{2} \frac{1}{\log_7 6x} - 4$$

$$\log_7^4 y + \frac{6}{\log_7 y} = \frac{3}{2} \frac{1}{\log_7 y} - 4$$

$$\log_7^4(6x) - \frac{7}{2} \frac{1}{\log_7(6x)} + 4 = 0$$

$$\log_7^4 y + \frac{7}{2} \frac{1}{\log_7 y} + 4 = 0$$

Пусть ℓ — корень первого уравнения относительно $\log_7(6x)$. Тогда $(-\ell)$ — корень второго уравнения относительно $\log_7 y$. Следовательно, т.к. производные ур-е $\ell^5 + 4\ell - \frac{7}{2} = 0$ и ур-е $\ell^5 + 4\ell + \frac{7}{2} = 0$ всегда имеют, тем более, то эти ур-е имеют ~~единственный~~ корень по единственному корню. Тогда:

$$\log_7 y = -\log_7(6x) \Rightarrow y = (6x)^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow xy = \frac{1}{6} \rightarrow \text{единственное возможное значение}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{6}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




6) $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

$$4(x_2 - x_1) + y_2 - y_1 = 40$$

l — прямая, содержащая
т. A и т. B , проходящей
через $(0, 40)$

l — прямая, проходящая
через $(0, 40)$ и точку A и B

$$4x + y - 40 = 0$$



$y = -4x + 40$. Данное уравнение параллельно
сторонам OP и RQ параллелограмма

$$\begin{cases} y = -4x + 40 \\ x \in [-7, 10] \\ x \in [-7, 10] \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{точки лежат внутри} \\ \text{параллелограмма} \end{matrix}$$

Т.к. все точки на этой прямой с целыми x -координатами также имеют целые y -координаты, то нам подходит 18 разных точек. Тогда из них выберем пару точек A и B можно 306 способами, если они должны быть различными или 324 способами, если A и B могут совпадать.

Ответ: ~~324 (если A и B могут совпадать)~~ или
306 (если A и B не могут совпадать)




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{AD}{DB} = \frac{3}{10}$$

$$\frac{AB}{CB} = \frac{BD}{BD}$$

$$CB^2 = AB \cdot BD$$

$$\arccos(\cos(\frac{3\pi}{2} + x)) = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$\frac{3\pi}{2} + x \in [0, \pi] \Rightarrow \frac{15\pi}{2} + x = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$4x = -6\pi$$



$$x = -\frac{3\pi}{2}$$

$$\frac{3\pi}{2} + x \in [\pi, 2\pi] \Rightarrow \frac{5\pi}{2} + x = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$4x = -\pi \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{2} + x \in [2\pi, 3\pi] \Rightarrow 4x = \pi; x = \frac{\pi}{4}$$


$$\frac{3\pi}{2} + x \in [3\pi, 4\pi] \Rightarrow$$



$$OB^2 =$$

$$\frac{3\pi}{2} + x \in (\frac{\pi}{2} + \pi; \pi + \pi]$$

$$\frac{3\pi}{2} + x =$$



$$10x^2; (x = \sqrt{10})$$

$$AC = x\sqrt{10}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$3ay = -x + 7b$$

$$y = -\frac{1}{3a}x + \frac{7b}{3a}$$

$$5+2$$

$$4+3 \quad \frac{7}{2} \cdot \frac{4}{3}$$

$$\frac{2}{\sin x} + \frac{3}{\sin x} = 7$$

$$\frac{X\sqrt{30} - CE}{CE} = \frac{3}{\sqrt{30}}$$

$$CE = X$$


$$y \rightarrow 0; y \neq 1$$

$$x \rightarrow 0; x \neq \frac{1}{5}$$

$$16g \cdot \frac{3}{13} \quad \frac{\sqrt{3}g + 3\sqrt{\frac{13}{3}}}{13}$$

$$l_1, l_2, l_3, l_4, l_5$$

$$-l_1, -l_2, -l_3, -l_4, -l_5$$



4(

$$y = \frac{68}{17} + -4x$$

$$\log_2^4(6x) - \frac{2}{\log_2 6x} =$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\log_2 6x} - 4$$

$$\log_2^7 y + 6 \log_2 y =$$

$$= \frac{5}{2} \log_2 y - 4$$

$$\log_2^4(6x) = \frac{7}{2} \frac{1}{\log_2 6x} - 4$$

$$\log_2^4 y = -\frac{7}{2} \frac{1}{\log_2 y} - 4$$

$$l^4 + \frac{7}{2} \frac{1}{l} + 4 = 0$$

$$l - \log_{10} 10$$

$$l$$

$$l^5 + 4l = \frac{7}{2} = 0$$

$$5l^4 + 4$$

$$\overrightarrow{AB} \{x_2 - x_1, y_2 - y_1\}$$

$$\frac{1}{3a} = \frac{5}{25c}$$

$$3a = \frac{25c}{5}; \quad d = \frac{25c}{11}$$