



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 10



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{15}7^{11}$, bc делится на $2^{17}7^{18}$, ac делится на $2^{23}7^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 17 : 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 7 и 13 соответственно.
4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-13;26)$, $Q(3;26)$ и $R(16;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$.
6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax + y - 8b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y - 12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 5 и 2,5.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№7. П.к. $a, b, c \in \mathbb{N}$, то $a, b, c \neq 0$.

Потому что п.к. $ab : 2^{15} \cdot 7^{11}$, то $ab \geq 2^{15} \cdot 7^{11}$

аналогично: $bc \geq 2^{17} \cdot 7^{18}$
 $ac \geq 2^{23} \cdot 7^{39}$

Применив неравенства Коши $a^2 b^2 c^2 \geq 2^{55} \cdot 7^{68}$

~~$abc \geq 2^{\frac{55}{2}} \cdot 7^{\frac{68}{2}}$~~

П.к. $a, b, c \in \mathbb{N}$, то $abc \in \mathbb{N}$,

потому $abc \geq 2^{27+1} \cdot 7^{39} = 2^{28} \cdot 7^{39}$.

~~Покажем, что такая оценка достигается:~~

~~Пусть $a = 2^{11} \cdot 7^{19}$
 $b = 2^5$
 $c = 2^{12} \cdot 7^{20}$~~

Пусть $a = 7^d$, $c = 7^b$, где d, b - макс.

Тогда $ac = 7^{d+b}$, но $ac = 7^{39}$,

потому $d+b \geq 39$,

то есть $\min(d+b) = 38$.

П.к. $ac = 7^{39}$, то и $abc = 7^{39}$

потому $abc \geq 2^{28} \cdot 7^{39}$.

Покажем, что такая оценка достигается:

Пусть:

$$a = 2^{11} \cdot 7^{19}$$
$$c = 2^{12} \cdot 7^{20}$$
$$b = 2^5$$

Тогда $abc = 2^{28} \cdot 7^{39}$.

Методом проверки и применив конкретные пары на соответствующие моменты. Также двойки и семёрки.

Ответ: $2^{28} \cdot 7^{39}$.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$N^{\frac{0}{3}} \quad 24 \sqrt{\sqrt{13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33} - 169}$$

$$13^4 = (169)^2 = (170-1)^2 = 28900 - 2 \cdot 170 + 1$$

$$13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33 = 28900 - 2 \cdot 170 + 1 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33 =$$

$$= 28901 + 17(17 \cdot 19 \cdot 33 - 20) =$$

$$= 28901 + 17(17 \cdot 19 \cdot 33 - 19 - 1) =$$

$$= 28901 + 17(19 \cdot (17 \cdot 33 - 1) - 1) =$$

$$= 28901 + 17(19 \cdot 560 - 1) =$$

$$= 28901 + 17(10639) =$$

$$= 28901 + 180863 =$$

$$= 209764$$

$$\text{Ответ: } 24 \sqrt{\sqrt{209764} - 169}$$

$$\begin{array}{r} \times 33 \\ \times 17 \\ \hline + 231 \\ \quad 33 \\ \hline \quad 561 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 560 \\ \times 19 \\ \hline + 5040 \\ \quad 560 \\ \hline 10640 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 10639 \\ \times 17 \\ \hline 79973 \\ + 10639 \\ \hline 180863 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 28901 \\ + 180863 \\ \hline 209764 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№2.

Из условия следует, что $\text{НОД}(a; b) = 1$.

$$a^2 - 7ab + b^2 = (a+b)^2 - 2ab - 7ab = (a+b)^2 - 9ab.$$

Тогда
$$\frac{a+b}{a^2 - 7ab + b^2} = \frac{a+b}{(a+b)^2 - 9ab}.$$

Если ~~это~~ дроби можно сократить на m ,

то $a+b : m$, н.т.к. $(a; b) = 1$, то $a \not\vdash m$ и $b \not\vdash m$

(Если $a : m$ и $a+b : m$, то и $b : m \Rightarrow \text{НОД}(a; b) \geq m$)

т.к. $(a+b) : m$, то и $(a+b)^2 : m$.

т.к. дроби сократили на m , то $(a+b)^2 - 9ab : m$

и т.к. $(a+b)^2 : m$, то и $9ab : m$, но $a \not\vdash m$ и $b \not\vdash m \Rightarrow$

$$\Rightarrow 9 : m \Rightarrow \boxed{m \leq 9}.$$

Приведем в пример такие a и b , что $\frac{a+b}{(a+b)^2 - 9ab}$ сократили на 9 :

$$\begin{matrix} a=4 \\ b=5 \end{matrix} \quad \frac{a+b}{(a+b)^2 - 9ab} = \frac{4+5}{(4+5)^2 - 9 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{9}{81 - 180} = \frac{9}{-99} = -\frac{1}{11}$$

Ответ: при $m=9$.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




№ 3.

Пусть $AC = 17x$,
тогда $BC = 7x$.

Очевидно, $\triangle O_2BC$ — прямоугольный.
тогда $\operatorname{tg} \angle O_2BC = \frac{O_2C}{BC} = \frac{7}{17x} = \frac{1}{x}$.

Проведем AO_1 до пересечения с Ω ,
пусть она пересекается в Γ .
тогда AD — диаметр $\Rightarrow \angle DO_2A = \frac{\pi}{2}$.



По т. Пифагора для $\triangle O_2CA$: $O_2A = \sqrt{O_2C^2 + AC^2} = \sqrt{49 + 289x^2}$

По т. Пифагора для $\triangle O_2AD$: $O_2D = \sqrt{AD^2 - AO_2^2} = \sqrt{26^2 - 49 - 289x^2}$

$\angle O_2BA = \angle O_2DA$, как вписанные $\Rightarrow \operatorname{tg} \angle O_2BA = \operatorname{tg} \angle O_2DA = \frac{1}{x}$

$$\operatorname{tg} \angle O_2DA = \frac{O_2A}{O_2D} = \frac{\sqrt{49 + 289x^2}}{\sqrt{26^2 - 49 - 289x^2}}$$

но $\operatorname{tg} \angle O_2DA = \frac{1}{x}$. Получаем:

$$\frac{1}{x} = \frac{\sqrt{49 + 289x^2}}{\sqrt{(26^2 - 49) - 289x^2}}$$

$$\sqrt{19 \cdot 33 - 289x^2} = x \sqrt{49 + 289x^2}$$

$$19 \cdot 33 - 289x^2 = x^2 (49 + 289x^2)$$

$$19 \cdot 33 - 289x^2 = 49x^2 + 289x^4$$

$x^2 = t$

$$289x^4 + (49 + 289)x^2 - 19 \cdot 33 = 0$$

$$289t^2 + (49 + 289)t - 19 \cdot 33 = 0$$

$$D = (49 + 289)^2 + 4 \cdot 289 \cdot 19 \cdot 33 = 338^2 + 4 \cdot 289 \cdot 19 \cdot 33 =$$

$$= (2 \cdot 169)^2 + 4 \cdot 289 \cdot 19 \cdot 33 = 4 \cdot 13^4 + 4 \cdot 289 \cdot 19 \cdot 33 =$$

$$= 4 (13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33)$$

$$t = \frac{338 + 2 \sqrt{13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33}}{2} =$$

$$= -169 + \sqrt{13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33}$$

$$\text{тогда } x = \sqrt{\sqrt{13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33} - 169}. \quad AB = 17x + 7x = 24x = 24 \sqrt{\sqrt{13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33} - 169}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{3x^2-6x+2} - \sqrt{3x^2+3x+1} = 1-9x$$

Обозначим ~~$3x^2-6x+2$~~ $3x^2-6x+2 = a \geq 0$
 $3x^2+3x+1 = b \geq 0$

Заметим, что $a-b = 3x^2-6x+2-3x^2-3x-1 = 1-9x$.

Тогда исходное уравнение имеет вид:

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = a-b, \quad a, b \geq 0$$
$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{a} - \sqrt{b} = 0 \\ \sqrt{a} + \sqrt{b} = 1 \end{cases}$$

1) $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$
 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$
 $a = b, \quad a \geq 0$

$$3x^2-6x+2 = 3x^2+3x+1$$

$$9x = 1$$

$$x = \frac{1}{9}$$

Проверка: $3 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^2 + 3 \cdot \frac{1}{9} + 1 \geq 0$

$$\frac{1}{27} + \frac{1}{3} + 1 > 0$$

Значит, $x = \frac{1}{9}$ - реш.

2) $\sqrt{3x^2-6x+2} + \sqrt{3x^2+3x+1} = 1$

$$\left(\sqrt{3x^2-6x+2} + \sqrt{3x^2+3x+1}\right)^2 = 1^2$$

$$3x^2-6x+2 + 3x^2+3x+1 + 2 \cdot \sqrt{3x^2-6x+2} \cdot \sqrt{3x^2+3x+1} - 1 = 0$$

$$6x^2-3x+2 = -2 \sqrt{3x^2-6x+2} \cdot \sqrt{3x^2+3x+1}$$

Заметим, что левая часть всегда не положительна, т.к.

$$\forall y \geq 0: \sqrt{y} \geq 0. \quad 6x^2-3x+2, \quad D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 9 - 48 < 0.$$

Получаем, что $6x^2-3x+2$ - это парабола с вершиной направленной вверх ($6 > 0$) и отрицательным дискриминантом. Значит

$$\forall x \quad 6x^2-3x+2 > 0. \quad \text{Но по условию } \forall x \quad 6x^2-3x+2 \neq -2 \sqrt{3x^2-6x+2} \cdot \sqrt{3x^2+3x+1}$$

Ответ: $x = \frac{1}{9}$ (т.к. положительное число всегда больше не положительного)

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




№6. ^{нашли}

$$\begin{cases} ax + y - 8b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y-12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

a: 3b: 2 реш.

Построим график ~~каждого~~ неравенства системы:

$x^2 + y^2 - 1 = 0$ - окр. с центром в т. (0; 0) и радиусом 1.
 $x^2 + (y-12)^2 - 16 = 0$ - окр. с центром в т. (0; 12) и рад. = 4.



Для окружности вида

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$$

Значение выпр. ~~будет~~ $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 - R^2$

будет отрицательным только если x_0, y_0 и y_0 лежат внутри этой окружности и ближе осей.

Если x_0 и y_0 - вне окр. равенство $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$ выполняется только для x и y на этой окр.

Произведение ~~выраж~~ $2 \times \text{выпр}$ ≤ 0 , только если одно из ~~выпр~~ ≤ 0 и а второе ≥ 0 . Поэтому ~~тогда~~ $(x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y-12)^2 - 16) \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ x^2 + (y-12)^2 \geq 16 \end{cases}$.
 Условия ~~каждого~~ ~~неравенства~~, т.к. данные ~~окружности~~ не пересекаются, это можно заметить ~~с~~ графика.

$ax + y - 8b = 0 \Leftrightarrow y = -ax + 8b$ - это уравнение прямой


Если ~~мы~~ ~~каждое~~ ~~неравенство~~ заменим, то если прямая пересекает ~~какую-либо~~ ~~окружность~~, то решение будет ~~демонстр~~ ~~но~~ ~~какого~~.
 Поэтому ~~единственный~~ ~~возможный~~ ~~случай~~ - это когда прямая $y = -ax + 8b$ касается ~~одной~~ ~~окружностей~~.

1) Рассмотрим случай, который ~~показан~~ ~~на~~ ~~рисунке~~:

$\angle BCO_2 = \angle O_1CA$ (как вертик.)
 $\angle O_2BC = \angle O_1AC = 90^\circ$ (перп. в т. кас.)

Значит, $\triangle O_1CA \sim \triangle O_2CB \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{O_1C}{CO_2} = \frac{O_1A}{BO_2} = \frac{1}{1}$



(O_1, O_2 - центры окр.)
 A, B - т. касания.
 C - т. пересч.
 $y = -ax + 8b$ (оси x, y.)

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№6. продолжение.

$$O_1C = 4CO_2 \quad O_1O_2 = 12 = O_1C + CO_2 = 5CO_2$$

$$CO_2 = \frac{12}{5}$$

Рассмотрим $\triangle BO_2C$:

$$BC = \sqrt{O_2C^2 - BO_2^2} = \sqrt{\frac{144}{25} - \frac{25}{25}} = \frac{12}{5}, \quad \sin \angle BO_2C = \frac{1}{5}$$

$$\operatorname{tg} \angle BCO_2 = \frac{BO_2}{BC} = \frac{1}{\frac{12}{5}} = \frac{5}{12}$$

$$\angle DO_2C = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \angle CDO_2 = \frac{\pi}{2} - \angle BCO_2 \Rightarrow \operatorname{tg} \angle CDO_2 =$$

$$\operatorname{tg} \angle CDO_2 = \frac{\sqrt{119}}{5}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\operatorname{tg} \angle BCO_2} \\ &= \frac{1}{\frac{5}{12}} \\ &= \frac{12}{5} \end{aligned}$$

наклона $\frac{\sqrt{119}}{5}$

$$a = -\frac{\sqrt{119}}{5}$$

$y = -ax + b$; $-a$ — это наклон угла прямой, коэффициент $-a = \operatorname{tg} \angle CDO_2 = \frac{\sqrt{119}}{5}$

Заметим, что если выразить прямую AB относительно x и y , то такая прямая может быть касательной, а a либо « a » изменит свой знак, тогда $a = \frac{\sqrt{119}}{5}$.

2) Рассмотрим 2-й случай:

Очевидно, $\triangle XAO_1$, $\triangle XBO_2$:

$$\frac{XO_2}{XO_1} = \frac{O_2B}{O_1A} = \frac{1}{4} \quad \text{и} \quad XO_2 = XO_1$$

$$O_1O_2 = 12 = XO_1 - XO_2 = 3XO_2$$

$$XO_2 = 4$$

$$\operatorname{tg} \angle XBO_2; \quad XB = \sqrt{XO_2^2 - O_2B^2} =$$

$$= \sqrt{15}$$


$$\operatorname{ctg} \angle XBO_2 = \frac{XB}{BO_2} = \sqrt{15}$$

$$\angle XDO_2 = \frac{\pi}{2} - \angle DXO_2 \Rightarrow \angle ADO_2 = \pi - \angle XDO_2 = \frac{\pi}{2} + \angle DXO_2$$

$$-a = \operatorname{tg}(\angle ADO_2) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \angle DXO_2\right) = -\operatorname{ctg} \angle DXO_2 = -\sqrt{15} \quad [a = \sqrt{15}]$$

Аналогично второйму случаю $a = -\sqrt{15}$ — тоже возможно.

Ответ: $a \in \left\{ \pm\sqrt{15}; \pm\frac{\sqrt{119}}{5} \right\}$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

 МФТИ



1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$13^4 = 169^2 \quad 7(170-1)^2 = 28900 - 2 \cdot 170 + 1 + 17^2 \cdot 33 \cdot 19$$

$$\cancel{28} \cdot 28900 - 2 \cdot 170 + 1 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33 =$$

$$= 28800 + 1 - 17(19 \cdot 33 - 20) =$$

$$= 28900 + 1 - 17(19 \cdot 32 - 1) =$$

$$= 28901 - 17 \cdot 19 \cdot 32 + 17.$$

$$20 \cdot 32 = 32 = 640 - 32 = 608.$$

$$28901 - 608 + 17.$$

$$28293 + 17 = 28300.$$

$$\begin{array}{r} 28901 \\ - 608 \\ \hline 28293 \end{array}$$

$$209769$$

$$49$$

$$100^2 = 10000.$$

$$109^2 =$$

$$\begin{array}{r} \times 109 \\ \times 109 \\ \hline 916 \\ + 109 \\ \hline 10816 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№3 Пусть $AC = 17x$, тогда $BC = 7x$.

Прежде всего, $\triangle O_2BC$ — прямоугольный, тогда $\operatorname{tg} \angle O_2BC = \frac{O_2C}{BC} = \frac{7}{7x} = \frac{1}{x}$

Продлим AO_1 до пересечения с Ω .

Пусть они пересекутся в т. D.

AD — диаметр, поэтому $\angle AO_2D = 90^\circ$.

$\angle O_2BC = \angle O_2DA$ как вписанные.

Поэтому $\operatorname{tg} \angle O_2BC = \operatorname{tg} \angle O_2DA = \frac{1}{x}$

Но в $\triangle O_2DA$: $\operatorname{tg} \angle O_2DA = \frac{O_2A}{AD} = \frac{O_2A}{26}$.

Следовательно, $\frac{O_2A}{26} = \frac{1}{x}$.

Из $\triangle O_2CA$: $O_2H = \sqrt{O_2C^2 + AC^2} = \sqrt{49 + 289x^2}$

Тогда: $\frac{\sqrt{49 + 289x^2}}{26} = \frac{1}{x}$

$O_2H = \sqrt{49 + 289x^2}$

$O_2D = \sqrt{26^2 - 49 - 289x^2}$

$$289 + 49 = x \sqrt{49 + 289x^2} = 26$$

$$= 340 - 2 = \sqrt{49x^2 + 289x^4} = 26$$

$\cdot 338$

$$338 = 2 \cdot 169$$

$$49x^2 + 289x^4 = 26^2$$

$$x^2 = t$$


$$289t^2 + 49t - 26^2 = 0$$

$$D = 49^2 + 4 \cdot 289 \cdot 26^2$$

$$49^2 + 2 \cdot 49 \cdot 289 + 289^2 + 4 \cdot 289 \cdot 26^2 = 19 \cdot 33 - 289x^2$$

$$49^2 + 289 \cdot (2 \cdot 49 + 289 + 4 \cdot 19 \cdot 33) \cdot 26^2 - 289 \cdot 7^2 = (26 - 7)(26 + 7) =$$

$$= 19 \cdot 33.$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:


- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$7 = \sqrt{17}$$



$$99 = 17x$$

$$S_{ABC} = \frac{25}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \sin(2(\alpha + \beta))$$

$$S = P \cdot q$$

$$\varepsilon = \frac{25 \sin(2(\alpha + \beta))}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta \cdot P}$$

$$AM = P - BC$$

$$2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$$

$$ab : 2^{15} \cdot 7^{11}$$

$$bc : 2^{17} \cdot 7^{13}$$

$$ac : 2^{23} \cdot 7^{39}$$

$$a = 2^{11} \cdot 7$$

$$c = 2^{12} \cdot 7$$

$$b = 2^5$$

min abc

$$abc^2 \geq 2^{55} \cdot 7^{68} = 2^{55} \cdot 7^{68}$$

$$a = 7^d$$

$$c = 7^d$$

$$d+d$$

$$a = 2^h$$

$$c = 2^{16}$$

$$b = 2^5$$

$$abc \geq 2^{28} \cdot 7^{34}$$

$$\frac{25 \sin(2(\alpha + \beta))}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta (P - BC) P} = \frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)}$$

$$\sqrt{13^4 + 17^2 \cdot 19 \cdot 33} \approx$$


AI = ?

$$AC = 2 \frac{5}{2 \operatorname{tg} \alpha} = \frac{5}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$AB = \frac{10}{\operatorname{tg} \beta}$$

$$BC = \frac{5}{2x} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2} \frac{25}{\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \cdot \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin(\alpha + \beta)$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} + \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1$$

$$3x^2 - 6x + 2 + 3x^2 + 3x + 1 + 2\sqrt{(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)} = 1$$

$$6x^2 - 3x + 3 + 2\sqrt{\dots} = 1$$

$$6x^2 - 3x + 2 = -2\sqrt{\dots}$$


$$2x - 3 = -\sqrt{\dots}$$

$$D = 9 - 1 = 8$$

$ab : 2^{15} \cdot 7^{11}$
 $bc : 2^{17} \cdot 7^{10}$
 $ac : 2^{23} \cdot 7^{39}$

$\min abc = 2^{23} \cdot 7^{39}$
 $ac > bc > ab$
 $a = 2^{15} \cdot 7^{11}$
 $b = 2^9$
 $c = 2^8$

$\frac{AC}{BC} = \frac{17}{7}$



$ab > bc > ac$
 $a^2 + b^2 + c^2 > 2 \cdot 2^{55} \cdot 7^{39 \cdot 2}$

$abc > 2^{\frac{55}{2}} \cdot 7^{39} = 2^{27} \cdot 2 \cdot 7^{39} = 2^{28} \cdot 7^{39}$
 $abc > 2^{27} \cdot 7^{39}$

$a = 2^8$
 $b = 2^7$
 $c = 2^8$
 $\alpha + \beta = 15$
 $\beta + \gamma = 17$
 $\alpha + \gamma = 23$


$a = 2^{15} \cdot 7^{11}$
 $b = 2^9$
 $c = 2^8$
 $\alpha + \gamma = 23$
 $\alpha + \beta = 15$
 $\beta + \gamma = 17$
 $2(\alpha + \beta + \gamma) > 15 + 17 + 23 = 55$

$\alpha + \beta = 16$
 $\beta + \gamma = 17$
 $\alpha + \gamma = 23$

$\gamma - \beta = 23 - 16 = 7$
 $\beta + \gamma = 17$

$\alpha = 4$
 $\beta = 12$
 $\gamma = 19$

$\frac{a+b}{a^2 - 7ab + b^2} = 1$



$\frac{a+b}{(a+b)^2 - 9ab} = m$

$\frac{a^2 - 7ab + b^2}{(a+b)^2 - 2ab - 7ab} = m$
 $= \frac{a^2 - 7ab + b^2}{(a+b)^2 - 9ab}$

$\frac{a+b}{(a+b)^2 - 9ab} = \frac{a+5}{(4+5)^2 - 9 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{9}{81 - 180} = \frac{-9}{99} = -\frac{1}{11}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{AC}{BC} = \frac{17}{7}$$


$$AB = ?$$

$$\omega = 7$$

$$\Omega = 13$$

$$AC = 17x$$

$$BC = 7x$$



$$AO_{\omega} = \sqrt{49 + 289x^2}$$

$$AX = \sqrt{49 + 289x^2} - 7$$

$$AY = \sqrt{49 + 289x^2} + 7$$

$$3\left(x^2 + 2\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}\right) =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$$O_{\Omega}H = \sqrt{13^2 - 49x^2}$$

$$289x^2 = 49 + 289x^2$$

$$3\left(x^2 + x + \frac{1}{3}\right)$$

$$2x + 1$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{2}{4} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$$

$$3\left(x^2 + 2\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} = \sqrt{3x^2 - 6x + 2} = \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x$$

$$3\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) = 3\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$a > 0$$

$$b > 0$$

$$3x^2 - 6x + 2 = a$$

$$3x^2 + 3x + 1 = b$$

$$a - b = 1 - 9x$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = a - b$$

$$a - 2\sqrt{ab} + b = a^2 - 2ab + b^2$$

$$f(x) = x - \sqrt{x}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases}$$

$$a=b$$

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = (a - b)(\sqrt{a} + \sqrt{b})$$

$$(a - b) = (a - b)(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \quad \sqrt{a} - \sqrt{b} = a - b$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$$

$$\sqrt{a} = \sqrt{b} \quad \sqrt{a} \cdot a = b$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$$