



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 10



1. [4 балла] Натуральные числа a , b , c таковы, что ab делится на $2^{15}7^{11}$, bc делится на $2^{17}7^{18}$, ac делится на $2^{23}7^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 17 : 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 7 и 13 соответственно.

4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1} = 1 - 9x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-13; 26)$, $Q(3; 26)$ и $R(16; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14$.

6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax + y - 8b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y - 12)^2 - 16) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 5 и 2,5.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 1.

1. ~~аб делится на $2^{15} \cdot 7^{11}$ $\Rightarrow$ существует такое~~

1. $a, b, c \in \mathbb{N} \Rightarrow ab, bc, ac \in \mathbb{N}$. ~~аб делится на $2^{15} \cdot 7^{11}$, следовательно~~
~~также~~ ab и $2^{15} \cdot 7^{11}$ — натуральные числа $\Rightarrow$ существует такое натуральное
 p , что $ab = 2^{15} \cdot 7^{11} \cdot p$; аналогично $bc = 2^{17} \cdot 7^{18} \cdot q$ ($q \in \mathbb{N}$) и $ac = 2^{23} \cdot 7^{39} \cdot r$
($r \in \mathbb{N}$).

$$2. ab \cdot bc \cdot ac = 2^{15} \cdot 7^{11} \cdot p \cdot 2^{17} \cdot 7^{18} \cdot q \cdot 2^{23} \cdot 7^{39} \cdot r$$

$$(abc)^2 = 2^{55} \cdot 7^{68} \cdot pqr$$

$$(abc)^2 = \cancel{2^{55} \cdot 7^{68}} \cdot 2^{54} \cdot 7^{68}$$

$$abc = \sqrt{2pqr \cdot 2^{54} \cdot 7^{68}} = \sqrt{2pqr} \cdot 2^{27} \cdot 7^{34}$$

$$3. \text{ ~~так как } a, b, c \in \mathbb{N} \Rightarrow abc \in \mathbb{N}; 2^{27} \cdot 7^{34} \in \mathbb{N}; abc = \sqrt{2pqr} \cdot 2^{27} \cdot 7^{34}~~$$

$2, p, q, r \in \mathbb{N} \Rightarrow 2pqr \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt{2pqr}$ — натуральное или иррациональное
число (такое $\sqrt{2pqr} = \frac{m}{n}$, где $m, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$, m и n взаимно просты, ~~тогда~~
 $2pqr = \frac{m^2}{n^2}$, где $m^2 \in \mathbb{N}$, $n^2 \in \mathbb{N}$, $n^2 \neq 1$, m^2 и n^2 взаимно просты, ~~от~~
чего следует, что $2pqr \notin \mathbb{N}$, что неверно). Если $\sqrt{2pqr}$ — иррациональное
число, то $\sqrt{2pqr} \cdot 2^{27} \cdot 7^{34}$ как произведение иррационального и ~~нату~~
рального также иррационально, то есть $abc = \sqrt{2pqr} \cdot 2^{27} \cdot 7^{34} \notin \mathbb{N}$,
что неверно $\Rightarrow \sqrt{2pqr}$ — натуральное число.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

4. $\sqrt{2pq^2r}$ - натуральное число $\Rightarrow 2pq^2r$ - полный квадрат натурального числа.

$$p, q, r \in \mathbb{N} \Rightarrow p, q, r \geq 1 \Rightarrow 2pq^2r \geq 2.$$

5. Наименьшее значение $abc = \sqrt{2pq^2r} \cdot 2^{27} \cdot 7^{39}$ достигается
при наименьшем значении $\sqrt{2pq^2r}$, наименьшее значение
 $\sqrt{2pq^2r}$ - при наименьшем значении $2pq^2r$. $2pq^2r \geq 2$, $2pq^2r$ - полный
квадрат. 2 и 3 не являются полными квадратами $\Rightarrow$
наименьшее значение $2pq^2r = 4$ - это 2^2 , и тогда $abc =$
 $= \sqrt{2pq^2r} \cdot 2^{27} \cdot 7^{39} = \sqrt{4} \cdot 2^{27} \cdot 7^{39} = 2^{28} \cdot 7^{39}.$

4. $abc = a \cdot bc = a \cdot q \cdot r$. $b \cdot ac = b \cdot r \cdot 2^{23} \cdot 7^{39} \Rightarrow abc$ делится на 7^{39} , $abc = \sqrt{2pq^2r} \cdot 2^{27} \cdot 7^{39} = (b \cdot r \cdot 2^{23}) \cdot 7^{39}$

$\sqrt{2pq^2r} \cdot 2^4 = b \cdot r \cdot 7^{35} \Rightarrow \sqrt{2pq^2r} \cdot 2^4$ делится на 7^{35} . П.к. 2 и 7 - взаимно простые простые числа, но 2^4 не делится на 7 в какой-либо натуральной степени $\Rightarrow \sqrt{2pq^2r} : 7^5$.

5. $\sqrt{2pq^2r}$ - натуральное число, $\Rightarrow 2pq^2r$ - полный квадрат. $\sqrt{2pq^2r}$ делится на $7^5 \Rightarrow 2pq^2r$ делится на $7^{10} \Rightarrow 2pq^2r = t \cdot 7^{10}$, где $t \in \mathbb{N}$.
П.к. $2pq^2r$ - полный квадрат, но $2pq^2r$ делится на простое число в четной степени. П.к. $2pq^2r = p \cdot q^2 \cdot r$ но $2pq^2r$ кратно $2^1 \Rightarrow 2pq^2r$ кратно 2^2 . Наименьшее значение $2pq^2r = 2^2 \cdot 7^{10}$.
Это $2^2 \cdot 7^{10} \Rightarrow$ наименьшее значение $2pq^2r = 2^2 \cdot 7^{10} \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ наименьшее значение $abc = \sqrt{2pq^2r} \cdot 2^{27} \cdot 7^{39} = 2^{28} \cdot 7^{39}.$

Ответ: $2^{28} \cdot 7^{39}.$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 2.

1. $(a+b)$ и $(a^2 - 7ab + b^2)$ можно сократить на $m \Rightarrow \frac{a+b}{m} \in \mathbb{N}$ (числитель и знаменатель делимые, числитель кратен знаменителю).

Пусть $\frac{a+b}{m} = x$.

$$\frac{a+b}{a^2 - 7ab + b^2} = \frac{\frac{a+b}{m}}{\frac{a^2 - 7ab + b^2}{m}} = \frac{x}{\frac{a^2 - 7ab + b^2 - 9ab}{m}} = \frac{x}{\frac{(a+b)(a+b) - 9ab}{m}} = \frac{x}{\frac{(a+b)(a+b) - 9ab}{m}}$$

2. $(a^2 - 7ab + b^2)$ делится на $m \Rightarrow \frac{a^2 - 7ab + b^2}{m} \in \mathbb{N}$. Пусть

$$\frac{a^2 - 7ab + b^2}{m} = y. \text{ Тогда } y = \frac{a^2 - 7ab + b^2}{m} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 - 9ab}{m} = \frac{(a+b)^2 - 9ab}{m} = \frac{(a+b)(a+b) - 9ab}{m} = \frac{(a+b)(a+b) - 9ab}{m}$$

$$x(a+b) \in \mathbb{N}, \frac{9ab}{m} > 0, y = x(a+b) - \frac{9ab}{m} \Rightarrow \frac{9ab}{m} \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$\Rightarrow 9ab$ делится на m .

3. Докажем, что m не может быть больше 9, от противного.

предположим, что $m > 9$. Тогда $\frac{9ab}{m} < 9ab$. Или же $a \mid m$ и $b \mid m$ были взяты по простому, но $\frac{9ab}{m}$ не могло бы

быть меньше 9 $\Rightarrow$ либо $a \mid m$, либо $b \mid m$ есть общий делитель, отличный от 1. Без ограничения общности пусть общий делитель $a \mid m$ $k > 1$. Тогда $a = pk$, $m = qk$ ($p, q \in \mathbb{N}$). Известно, что

$$\frac{a+b}{m} = x (x \in \mathbb{N})$$

$$a+b = xm$$

$$pk + b = xqk \Rightarrow b = (xq - p)k. x, q, p \in \mathbb{N} \Rightarrow xq - p \in \mathbb{Z} \Rightarrow$$

$\Rightarrow b$ делится на k . Но тогда дробь $\frac{a}{b}$ сократится на k . Тогда верно $\Rightarrow m \leq 9$. При $m = 9$ $\frac{9ab}{m} = ab$, и дробь $\frac{a+b}{a^2 - 7ab + b^2}$ действительно сократится на m так можно показать при $a=1, b=8$:

$$\frac{a+b}{a^2 - 7ab + b^2} = \frac{9}{1 - 56 + 64} = \frac{9}{9} = 1.$$

Ответ: 9.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 3.

1. Пусть центр окр. Ω - O_1 , окр. ω - O_2 .

Существует 2 случая:

I. Плоски $O_1 O_2$ лежит на прямой, соединяющей центры.



Условные обозначения:

$\in$ - принадлежность
 $\perp$ - перпендикулярность
 $\cap$ - пересечение (пересечение
 двух)

окр. - окружность

м.к. - прямая

м. - точка

2. Пусть $AB = 24x$, $AC = y$, $CB = z$. Тогда $y : z = AC : CB = 17 : 7 \Rightarrow z = \frac{7}{17} y$;

$$y + z = AC + CB = AB = 24x \Rightarrow y + \frac{7}{17} y = 24x \Rightarrow \frac{24}{17} y = 24x \Rightarrow y = 17x \Rightarrow z = 7x.$$

3. ω касается окр. Ω в м. $C \Rightarrow O_2 C \perp \omega$ по св. касания; тогда $\triangle O_2 C B \sim \triangle O_2 C A$ ($\angle O_2 C B = 90^\circ$, $\angle O_2 C A = 90^\circ$) $\Rightarrow O_2 B^2 = O_2 C^2 + CB^2 = 7^2 + 7^2 x^2$ по теореме Пифагора и $O_2 A^2 = O_2 C^2 + CA^2 = 7^2 + 17^2 x^2$ по теореме Пифагора ($O_2 C = 7$, м.к. $C \in \omega$, а радиус ω - 7).

3. Пусть $\angle O_1 O_2 A = \alpha$, $\angle O_1 O_2 B = \beta$. В $\triangle O_1 O_2 A$ по теореме косинусов

$$O_2 A^2 = O_1 A^2 + O_1 O_2^2 - 2 O_1 A \cdot O_1 O_2 \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{O_1 A^2 + O_1 O_2^2 - O_2 A^2}{2 O_1 A \cdot O_1 O_2} = \frac{13^2 + 13^2 - 7^2 - 17^2 x^2}{2 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{2 \cdot 13^2 - (7^2 + 17^2 x^2)}{2 \cdot 13^2}$$

$$= 1 - \frac{7^2 + 17^2 x^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\text{В } \triangle O_1 O_2 B \text{ по теореме косинусов } O_2 B^2 = O_1 O_2^2 + O_1 B^2 - 2 O_1 O_2 \cdot O_1 B \cdot \cos \beta$$

$$\Rightarrow \cos \beta = \frac{O_1 O_2^2 + O_1 B^2 - O_2 B^2}{2 O_1 O_2 \cdot O_1 B} = \frac{13^2 + 13^2 - 7^2 - 7^2 x^2}{2 \cdot 13^2} =$$

$$= 1 - \frac{7^2 + 7^2 x^2}{2 \cdot 13^2} \quad (\text{т.к. } O_1 O_2 = O_1 A = O_1 B = 13, \text{ м.к. } O_1, A, B \in \Omega, \text{ радиус } \Omega - 13).$$

$$\text{Тогда } \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{7^2 + 17^2 x^2}{2 \cdot 13^2}\right)^2} = \sqrt{\left(1 - 1 + \frac{7^2 + 17^2 x^2}{2 \cdot 13^2}\right) \left(1 + 1 - \frac{7^2 + 17^2 x^2}{2 \cdot 13^2}\right)} =$$

$$= \sqrt{\frac{O_2 A^2}{2 \cdot 13^2} \cdot \left(2 - \frac{O_2 A^2}{2 \cdot 13^2}\right)}; \sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{7^2 + 7^2 x^2}{2 \cdot 13^2}\right)^2} =$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 3 (продолжение).

3 (продолжение). $\dots = \sqrt{\left(1 - 1 + \frac{7^2 + 7^2 x^2}{2 \cdot 13^2}\right) \left(1 + 1 - \frac{7^2 + 7^2 x^2}{2 \cdot 13^2}\right)} =$
 $= \sqrt{\frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2} \left(2 - \frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2}\right)}.$

4. В $\triangle AOB$ по теореме косинусов

$$AB^2 = AO^2 + OB^2 - 2AO \cdot OB \cdot \cos \angle AOB \Rightarrow \cos \angle AOB = \frac{AO^2 + OB^2 - AB^2}{2AO \cdot OB} =$$

$$= \frac{13^2 + 13^2 - 24^2 x^2}{2 \cdot 13^2} = 1 - \frac{24^2 x^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\cos \angle AOB = 1 - \frac{24^2 x^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\cos(\angle AOB_2 + \angle O_2OB) = 1 - \frac{24^2 x^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = 1 - \frac{24^2 x^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta = 1 - \frac{24^2 x^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\left(1 - \frac{0_2 A^2}{2 \cdot 13^2}\right) \left(1 - \frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2}\right) - \sqrt{\frac{0_2 A^2}{2 \cdot 13^2} \left(2 - \frac{0_2 A^2}{2 \cdot 13^2}\right)} \cdot \sqrt{\frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2} \left(2 - \frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2}\right)} =$$

$$= 1 - \frac{24^2 x^2}{2 \cdot 13^2} \quad (2 \cdot 13^2)^2 \neq 0$$

$$(2 \cdot 13^2)^2 \left(1 - \frac{0_2 A^2}{2 \cdot 13^2}\right) \left(1 - \frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2}\right) - \sqrt{(2 \cdot 13^2)^4 \cdot \frac{0_2 A^2}{2 \cdot 13^2} \left(2 - \frac{0_2 A^2}{2 \cdot 13^2}\right) \cdot \frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2} \left(2 - \frac{0_2 B^2}{2 \cdot 13^2}\right)} =$$

$$= (2 \cdot 13^2)^2 - 24^2 x^2 \cdot 2 \cdot 13^2$$

$$(2 \cdot 13^2 - 0_2 A^2)(2 \cdot 13^2 - 0_2 B^2) - \sqrt{0_2 A^2(2 \cdot 13^2 - 0_2 A^2)0_2 B^2(2 \cdot 13^2 - 0_2 B^2)} =$$

$$= (2 \cdot 13^2)^2 - 24^2 x^2 \cdot 2 \cdot 13^2$$

Пусть $2 \cdot 13^2 = k$:

$$(k - 0_2 A^2)(k - 0_2 B^2) - \sqrt{0_2 A^2(2k - 0_2 A^2)0_2 B^2(2k - 0_2 B^2)} = k^2 - 24^2 x^2 \cdot k$$

$$k^2 - k(0_2 A^2 + 0_2 B^2) + (0_2 A \cdot 0_2 B)^2 - 0_2 A \cdot 0_2 B \sqrt{(2k - 0_2 A^2)(2k - 0_2 B^2)} = k^2 - 24^2 x^2 \cdot k$$

$$k(24^2 x^2 - 0_2 A^2 - 0_2 B^2) + (0_2 A \cdot 0_2 B)^2 = 0_2 A \cdot 0_2 B \sqrt{(2k - 0_2 A^2)(2k - 0_2 B^2)}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



Задача 31 (продолжение).

1 (продолжение).

Приведём обе части уравнения в квадрат:

$$k^2(24^2x^2 - O_2A^2 - O_2B^2) + (O_2A \cdot O_2B)^4 + 2 \cdot k(24^2x^2 - O_2A^2 - O_2B^2)(O_2A \cdot O_2B)^2 =$$

$$= (O_2A \cdot O_2B)^2(2k - O_2A^2)(2k - O_2B^2).$$

$$5. 24^2x^2 - O_2A^2 - O_2B^2 = 576x^2 - 49 - 49x^2 - 49 - 289x^2 = 238x^2 - 98.$$

$$6. k^2(238x^2 - 98) + 2k(238x^2 - 98)(O_2A \cdot O_2B)^2 = (O_2A \cdot O_2B)^2(4k^2 - 2k(O_2A^2 + O_2B^2) +$$

$$+ (O_2A \cdot O_2B)^2 - (O_2A \cdot O_2B)^2)$$

$$k^2(238x^2 - 98) + 2k(238x^2 - 98)(O_2A \cdot O_2B)^2 = (O_2A \cdot O_2B)^2(4k^2 - 2k(O_2A^2 + O_2B^2) +$$

$$+ (O_2A \cdot O_2B)^2 - (O_2A \cdot O_2B)^2)$$

$$k \cdot k(238x^2 - 98) + k \cdot 2(238x^2 - 98)(O_2A \cdot O_2B)^2 = (O_2A \cdot O_2B)^2 \cdot 2k(2k - O_2A^2 - O_2B^2)$$

$$k(238x^2 - 98) + k \cdot 2(238x^2 - 98)(O_2A \cdot O_2B)^2 = (O_2A \cdot O_2B)^2 \cdot 2 \cdot (2k - O_2A^2 - O_2B^2)$$

$$k(238x^2 - 98) = (O_2A \cdot O_2B)^2(4k - 2(O_2A^2 + O_2B^2) + 2(238x^2 - 98))$$

$$k(238x^2 - 98) = (O_2A \cdot O_2B)^2(4k - 2(O_2A + O_2B)^2 - 2(24^2x^2 - O_2A^2 - O_2B^2))$$

$$k(238x^2 - 98) = (O_2A \cdot O_2B)^2(4k - 2O_2A^2 - 2O_2B^2 - 2 \cdot 24^2x^2 + 2O_2A^2 + 2O_2B^2)$$

$$k(238x^2 - 98) = (O_2A \cdot O_2B)^2(4k - 2 \cdot 24^2x^2)$$

$$238 \cdot k \cdot x^2 - 98k = (49 + 49x^2)(49 + 289x^2)(4k - 2 \cdot 576x^2)$$

$$7 \cdot 34k \cdot x^2 - 7 \cdot 14 \cdot k = 7^2(1 + x^2)(7^2 + 17^2x^2)(4k - 2 \cdot 24^2x^2)$$

$$7 \cdot 34 \cdot kx^2 - 7 \cdot 14 \cdot k = 7^2(7^2 + 7^2x^2 + 17^2x^2 + 17^2x^4)(4k - 2 \cdot 24^2x^2)$$

$$7 \cdot 34 \cdot kx^2 - 7 \cdot 14 \cdot k = 7^2(7^2 + 2 \cdot 338x^2 + 17^2x^4)(4k - 2 \cdot 24^2x^2)$$

$$2 \cdot 338kx^2 - 2 \cdot 7k = 7(7^2 + 338x^2 + 17^2x^4)2(2k - 24^2x^2)$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 3 (продолжение).

6 (продолжение).

$$17k \cdot x^2 - 7k = 7(7^2 \cdot 2k - 7^2 \cdot 24^2 x^2 + 2 \cdot 13^2 x^2 \cdot 2k - 2 \cdot 13^2 \cdot 24^2 x^4 +$$
$$+ 44^2 x^4 \cdot 2k - 17^2 \cdot 24^2 x^6)$$

$$17k x^2 - 7k = \cancel{17k} \cdot 7^3 \cdot 2k - 7^3 \cdot 24^2 x^2 + \cancel{17k} \cdot x^2 - 7 \cdot 24^2 k x^4 +$$
$$+ 7 \cdot 17^2 \cdot 2k x^4 - 7 \cdot 17^2 \cdot 24^2 x^6$$

$$7 \cdot 17^2 \cdot 24^2 x^6 + 7k(17^2 \cdot 2 - 24^2) x^4 + 44k^2 x^2$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача 4.

$$1. \begin{cases} \sqrt{3x^2-6x+2} - \sqrt{3x^2+3x+1} = 1-9x \\ \sqrt{3x^2-6x+2} = 1-9x + \sqrt{3x^2+3x+1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x^2-6x+2 \geq 0 \\ 1-9x + \sqrt{3x^2+3x+1} \geq 0 \\ 3x^2-6x+2 = (1-9x + \sqrt{3x^2+3x+1})^2 \end{cases}$$

$$2. 3x^2-6x+2 = (1-9x + \sqrt{3x^2+3x+1})^2$$

$$3x^2-6x+2 = 1 + 81x^2 + 3x^2 + 3x + 1 - 18x - 18x\sqrt{3x^2+3x+1} + 2\sqrt{3x^2+3x+1}$$

$$81x^2 + 3x^2 + 3x + 2 - 18x - 3x^2 + 6x - 2 - (18x-2)\sqrt{3x^2+3x+1} = 0$$

$$81x^2 - 9x = (18x-2)\sqrt{3x^2+3x+1}$$

$$9x(9x-1) = (9x-1)(2\sqrt{3x^2+3x+1})$$

$$(9x-1)(9x-2\sqrt{3x^2+3x+1}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 9x-1=0 \\ 9x-2\sqrt{3x^2+3x+1}=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} \\ 9x-2\sqrt{3x^2+3x+1}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} \\ 9x \geq 0 \\ 3x^2+3x+1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \dots$$

$$81x^2 = 4(3x^2+3x+1)$$

$$3. 81x^2 = 12x^2 + 12x + 4$$

$$69x^2 - 12x - 4 = 0$$

$$D = (-12)^2 - 4 \cdot 69 \cdot (-4) = 144 + 1104 = 1248 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{12 \pm \sqrt{1248}}{2 \cdot 69} = \frac{12 \pm 4\sqrt{78}}{138} = \frac{6 \pm 2\sqrt{78}}{69}$$

4. Проанализируйте пункт 2:

$$\dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} \\ 9x \geq 0 \\ 3x^2+3x+1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} \\ x \geq 0 \\ 3x^2+3x+0,75+0,25 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = \frac{6-2\sqrt{78}}{69} \\ x = \frac{6+2\sqrt{78}}{69} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} \\ x \geq 0 \\ \frac{3}{4}(3x+1)^2 + 0,25 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{9} \\ x \geq 0 \\ x = \frac{6-2\sqrt{78}}{69} \\ x = \frac{6+2\sqrt{78}}{69} \end{cases}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача 4 (продолжение).

4.1 (продолжение).

$$1) 78 > 64 \Rightarrow \sqrt{78} > 8 \Rightarrow 2\sqrt{78} > 16 \Rightarrow 6 - 2\sqrt{78} < -10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{6 - 2\sqrt{78}}{69} < -10 < 0 \Rightarrow x = \frac{6 - 2\sqrt{78}}{69} \text{ не подходит.}$$

$$2) 78 > 64 \Rightarrow \sqrt{78} > 8 \Rightarrow 2\sqrt{78} > 16 \Rightarrow 6 + 2\sqrt{78} > 22 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{6 + 2\sqrt{78}}{69} > \frac{22}{69} > \frac{10}{69} = \frac{1}{6.9} > 0 \Rightarrow \frac{6 + 2\sqrt{78}}{69} \text{ подходит.}$$

5. Продолжение пункта 1:

$$\dots \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 6x + 2 \geq 0 \\ 1 - 9x + \sqrt{3x^2 + 3x + 1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 6x + 3 - 1 \geq 0 \\ 1 - 9x + \sqrt{3x^2 + 3x + 1} \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ x = \frac{6 + 2\sqrt{78}}{69} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ x = \frac{6 + 2\sqrt{78}}{69} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3(x-1)^2 \geq 1 \\ \sqrt{3x^2 + 3x + 1} \geq 9x - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ x = \frac{6 + 2\sqrt{78}}{69} \end{cases}$$

При $x = \frac{1}{3}$:

$$1) 3\left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 = 3 \cdot \frac{8}{9} = \frac{8}{3} > \frac{2}{3} = 1; \sqrt{3\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{1}{3}\right) + 1} \geq 0 =$$

$$= 9 \cdot \frac{1}{3} - 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \text{ подходит.}$$

2) При $x = \frac{6 + 2\sqrt{78}}{69}$:

$$64 < 78 < 81 \Rightarrow 8 < \sqrt{78} < 9 \Rightarrow 16 < 2\sqrt{78} < 18 \Rightarrow 22 < 2\sqrt{78} + 6 < 36 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{22}{69} < \frac{2\sqrt{78} + 6}{69} < \frac{36}{69} \Rightarrow \frac{22}{69} < \frac{2\sqrt{78} + 6}{69} < \frac{12}{23} < \frac{1}{2}; 9x - 1 >$$

$$> 9 \cdot \frac{22}{69} - 1 = \frac{198}{69} - 1 = \frac{129}{69} = \frac{43}{23} > \frac{66}{23} - 1 = 2 \frac{20}{23} - 1 = 1 \frac{20}{23};$$

$$3x^2 + 3x + 1 < 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 \cdot \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} + \frac{3}{2} + 1 = \frac{3}{4} + \frac{6}{4} + \frac{4}{4} = \frac{13}{4} = 2 \frac{3}{4};$$

$$(9x - 1)^2 > \left(1 \frac{20}{23}\right)^2 = 1 + 2 \cdot \frac{20}{23} + 1 = \frac{400}{529} = 1 + \frac{40}{23} + \frac{400}{529} = \dots$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 4 (продолжение).

5 (продолжение).

$$= 1 + 1 \frac{17}{23} + \frac{400}{529} = 2 + \frac{17.23}{529} + \frac{400}{529} \geq 2 + \frac{10.23}{529} + \frac{400}{529} =$$

$$= 2 + \frac{530}{529} = 2 + 1 \frac{1}{529} > 3 > 2 \frac{3}{4} > 3x^2 + 3x + 1,$$

$$9x - 1 > 3x^2 + 3x + 1 \Rightarrow \sqrt{3x^2 + 3x + 1} < 9x - 1 \Rightarrow \frac{6 + 2\sqrt{38}}{69} \text{ не}$$

подходит.

6. Пошли дальше, вернем только один ответ:

$$x = \frac{1}{9}.$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{1}{9}.$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

задача 5 (продолжение). (Р: говорит, что
решение 9)
3. Рассмотрим случаи, когда $m \div 2$. Пусть $m = 2n$.
Выведем отрезки $OPQR$ содержащиеся отрезок
прямой $y = 2x + m$ от точки с $y = 0$ до точки с $y = 16$.

$$1) 0 = 2x + m \Rightarrow x = -\frac{m}{2} = -n.$$

$$2) 16 = 2x + m \Rightarrow x = \frac{16 - m}{2} = 8 - n.$$

Получим отрезки, соединяющие точки A на прямой
 $y = 2x + m$, с $m \div 2$, $8 - n - (-n) + 1 = 9$.

т.е. $(n - 14) \div 2$ точек, но к каждой из них вписывается

иногда покрываются отрезки B . Прямых с $m \div 2$ всего

10: n от 7 до 16, т.е. от 14 до 32, итого

$10 \cdot 9 \cdot 9 = 810$ пар точек.

4. Рассмотрим случаи, когда $m \div 2$. Пусть $m = 2n + 1$.

Выведем отрезки $OPQR$ содержащиеся отрезок прямой
 $y = 2x + m$ от точки с $y = 0$ до точки с $y = 16$.

$$1) 0 = 2x + m \Rightarrow x = -n - \frac{1}{2}.$$

$$2) 16 = 2x + m \Rightarrow x = 8 - n - \frac{1}{2}.$$

Покрываются вписывается координат
А x от $8 - n - \frac{1}{2}$ до $-n - \frac{1}{2}$, т.е. иное отрезки $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ всего $8 - n - (-n - \frac{1}{2}) + 1 = 8$. т.е. $(n - 14) \div 2$ точек, но
для каждой A покрываются B точек B . Прямых с

$m \div 2$ 9: n от 7 до 15, $\Rightarrow$ итого $9 \cdot 8 \cdot 8 = 576$ пар
точек.

Итого покрывают $810 + 576 = 1386$ пар точек A и B в выделенном
область

Ответ: 1386.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




Задача 6.


$$1. (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + (y-12)^2 - 16) \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 1 \leq 0 \\ x^2 + (y-12)^2 - 16 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ x^2 + (y-12)^2 \geq 16 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1^2 \\ x^2 + (y-12)^2 \geq 4^2 \end{cases} \quad (1) \quad \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 1^2 \\ x^2 + (y-12)^2 \leq 4^2 \end{cases} \quad (2)$$

Видим с центром $(0; 0)$ и радиусом 1 и внешнюю окружность с центром $(0; 12)$ и радиусом 4, видим наоборот.




2. $ax + y - 8b = 0 \Leftrightarrow y = -ax + 8b$. У данного уравнения есть. Из данного уравнения и неравенства выразим a и можем быть 2 решения, если уравнение $-ax + 8b$ задает общую касательную для обеих окружностей. Ух всего 4.



У обеих окружностей касательная равна в 4 равен, но противоположны по знаку a , у обеих внешняя - точка.

13.



Рассмотрим внешнюю общую касательную. Пусть центры окружностей - O_1 и O_2 . Тогда $O_1(0; 0)$, $O_2(0; 12)$. Пусть ω_1 - окружность ω_1 , ω_2 - ω_2 . Пусть касательная.

$$\text{Прямая } l, \text{ и } l \cap \omega_1 = A_1, l \cap \omega_2 = A_2. \text{ Тогда } \sin \angle A_2 O_1 A_1 = \frac{O_2 A_2 - O_1 A_1}{O_1 O_2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$ax + y - 8b = 0$$
$$y = 8b - ax$$



$$x^2 + a^2 x^2 - 16abx + 64b^2 - 1 \geq 0$$

$$x^2 + y^2 - 1 \leq 0$$

$$x^2 + y^2 - 24y + 144 - 16 \geq 0$$

$$24y - 129 \leq 0$$

$$y \leq \frac{129}{24} = \frac{43}{8} = 5\frac{3}{8}$$






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



$$y = \frac{a+b}{m} \cdot x$$

$$(x^2 + a^2x^2 + b^2x^2 - 16ab \cdot x - 1)$$

$$\frac{a+b}{a^2 + ab + b^2 - 9ab} = \frac{k}{k(a+b) - \frac{9ab}{m}}$$

$$j \frac{a+b}{m} = k$$

$$x^2 + y^2 - 1 \geq 0$$

$$x^2 + (y-12)^2 - 16 \leq 0$$



$$-x^2 - y^2 + 24y - 144 + 16 \geq 0$$

$$24y - 128 \geq 0$$

$$y \geq \frac{16}{3}$$

$$x^2 \geq 1 - y^2$$

$$P(13, 1)$$



$$2x_2 + y_2 - (2x_1 + y_1) = 14$$

$$\begin{cases} y_1 \leq 26 \\ y_1 \geq 0 \\ y_1 \geq -2x_1 \\ y_1 \leq -2x_1 + 32 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} y_1 \leq 26 \\ y_1 \geq 0 \\ y_1 + 2x_1 \geq 0 \\ y_1 + 2x_1 \leq 32 \end{cases}$$



$$576x^2 - 98 = (289 + 49)x^2 = (576 - 338)x^2 = 238x^2 = 7 \cdot 34$$

$$\frac{y}{z} = \sqrt{2} \quad \alpha =$$

$$x = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

$$y = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$


$$z = \frac{r}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$



$$AN = NB = \frac{5}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

$$90^\circ - 2\delta_1 + 90^\circ - 2\delta_2$$

$$\gamma = 2\delta_2$$



$$\gamma + \delta_1 + \delta_2 + \alpha = 180^\circ$$

$$180^\circ - \beta + 2\delta_1 = 180^\circ \quad \left(\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \right)^2 = 2$$

$$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot AN \cdot NB \cdot \sin \alpha$$

$$c = \frac{5}{\sin \frac{\alpha}{2}} \sin \alpha$$

$$b = \frac{2.5}{\sin \frac{\alpha}{2}} \sin \beta$$

$$\frac{c}{\sin \beta} = \frac{5}{\sin \alpha}$$

$$\frac{2.5}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{5}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$ab = p \cdot 2^5 \cdot 7^{11}$$

$$bc = q \cdot 2^{17} \cdot 7^{18}$$


$$ac = 2^{23} \cdot 7^{33}$$

$$a^2 b^2 c^2 = pqr \cdot 2^{15+17+23} \cdot 7^{40+54+66}$$


$$(abc)^2 = pqr \cdot 2 \cdot 2^{54} \cdot 7^{68}$$

$$abc = \sqrt{2pqr} \cdot 2^{27} \cdot 7^{34} \Rightarrow abc \geq 2^{28} \cdot 7^{35}$$

$$\frac{a+b}{a^2+ab+b^2} =$$



$$JKS = x$$



$$0 = 4 - x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot 69$$

$$81x^2 - 9x = 2(9x - 1) \sqrt{\dots}$$

$$C = 2^6 \cdot 7$$

$$28$$

$$3x^2 - 6x + 2 + 3x^2 + 3x + 1 - 2\sqrt{\dots} \sqrt{\dots} = 81x^2 - 18x + 1$$

$$15x - 75x^2 + 2 = 2\sqrt{\dots} \sqrt{\dots}$$

$$(15x - 75x^2 + 2)^2 = 4(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)$$

$$(75x^2 - 15x - 2)^2 = 4(3x^2 - 6x + 2)(3x^2 + 3x + 1)$$

$$75^2 x^4 + 225x^2 + 4 + 60x - 300x^2 - 25 \cdot 30x^3 = 4(9x^4 - 18x^2 + 6)$$

$$\sqrt{3x^2 - 6x + 2} = \sqrt{3x^2 + 3x + 1} + 1 - 9x$$

$$3x^2 - 6x + 2 = 81x^2 + 1 + 3x^2 + 3x + 1 + 2\sqrt{\dots} - 18x\sqrt{\dots} - 18x$$

$$81x^2 - 21x + 2 = (18x - 2)\sqrt{\dots}$$

$$81x^4 - 2 \cdot 3^5 \cdot 7x^3 + 441x^2 = (322x^2 - 72x + 4)\sqrt{\dots}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$$3x^2 + 6x + 2 = 3x^2 + 3x + 1 + 1 + 81x^2 - 18x - (18x + 2) \sqrt{\dots}$$
$$9x + 81x^2 = (18x + 2) \sqrt{\dots}$$
$$9x(9x + 1) = 2(9x + 1) \sqrt{\dots}$$

$$81x^2 = 2(3x^2 + 3x + 1)$$

$$81x^2 - 9x = 2 \sqrt{\dots} \quad (9x + 1)$$

$$9x(9x + 1) = 2 \sqrt{\dots} \quad (9x + 1)$$

$$81x(81x^2 - 18x + 1) = (3x^2 - 3x + 1)(81x^2 - 18x + 1)$$

$$81x^2$$

$$x^3y^7 - 2x^2y^3 + xy^2 = (x^2y^2 + 2xy + 1)$$

$$x^3y^7 - 2x^2y^3 + xy^2 = 3x^4y^2 + 6x^2y + 3x^2 + 3x^3y^2 + 6x^2y + 3x + 1$$

$$x^3(y^7 - 6y - 3y^2) + 8x^2y - 2xy^2 - 3 - 6y - y^2$$

$$+ x(y^2 - 3 - 2y) - 3x^2y^2 - 1 = 0$$

$$x^3(3^8 - 3^3) - x^2(2 \cdot 3^6 - 3 - 2 \cdot 3^3 - 3^4) + x(3^4 - 3^2)$$

$$- 35 \cdot x^4 - 1 = 0$$

$$3^5 \cdot x^7 + 3^3 \cdot 3^4(3^4 - 1) - x^2 \cdot 3(2 \cdot 3^5 - 3 - 2 \cdot 3^2 - 1) + x \cdot 3^2(3^2 - 1) = 0$$
$$3^5 \cdot x^7 + 3^7 \cdot 80 - x^2 \cdot 3 \cdot 740 + x \cdot 3^2 \cdot 8 - 1 = 0$$

$$3x^2 - 6x + 2 = 81x^2 + 1 + 3x^2 + 3x + 1 - 18x - (18x + 2) \sqrt{\dots}$$
$$81x^2 - 9x = 2(9x + 1) \sqrt{\dots}$$
$$9x(9x + 1) = 2$$

$$28 \cdot 9 + 79 = 338$$

$$9x = 2 \sqrt{\dots}$$

$$81x^2 = 6x^2 - 12x + 4$$

$$45x^2 + 12x - 4 = 0$$

$$\Delta = 144 + 4 \cdot 4 \cdot 75 = 144 + 1200 = 1344$$


$$786 - 27 - 18 - 1 = 740$$
$$= 786 - 46 = 740$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$AO = \sqrt{7^2 + \left(\frac{13}{24}\right)^2}$$

$$OB = \sqrt{7^2 + \left(\frac{13}{24}\right)^2}$$

$$AO^2 = 49 + 13^2 - 2 \cdot 13^2 \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{2 \cdot 13^2 - AO^2}{2 \cdot 13^2} = 1 - \frac{AO^2}{2 \cdot 13^2} \Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{\frac{AO^2}{2 \cdot 13^2}}$$

$$OB^2 = 2 \cdot 13^2 - 2 \cdot 13^2 \cdot \cos \beta$$

$$\cos \beta = 1 - \frac{OB^2}{2 \cdot 13^2} \Rightarrow \sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{OB^2}{2 \cdot 13^2}}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{X}{2 \cdot 13}$$

$$\cos \gamma = 2 \cdot 13^2 - 2 \cdot 13^2 \cdot \cos \delta$$

$$\cos \delta = 1 - \frac{X^2}{2 \cdot 13^2} = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sqrt{1 - \frac{X^2}{2 \cdot 13^2}} = \sqrt{1 - \frac{AO^2}{2 \cdot 13^2} - \frac{OB^2}{2 \cdot 13^2} + \frac{AO^2 \cdot OB^2}{2 \cdot 13^2 \cdot 2 \cdot 13^2}}$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{AO^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\sin \alpha = \frac{AO}{2 \cdot 13}$$

$$\cos \beta = 1 - \frac{OB^2}{2 \cdot 13^2}$$

$$\sin \beta = \frac{OB}{2 \cdot 13}$$

$$\sin \gamma = \frac{X}{2 \cdot 13}$$

$$\frac{X}{2 \cdot 13} = \frac{AO}{2 \cdot 13} - \frac{OB}{2 \cdot 13} + \frac{AO \cdot OB}{4 \cdot 13^3}$$

$$X \cdot 2 \cdot 13^2 = AO \cdot 2 \cdot 13^2 - OB \cdot 2 \cdot 13^2 + AO \cdot OB \cdot 2 \cdot 13^2$$

$$\cos \gamma = 1 - \frac{X^2}{2 \cdot 13^2} = 1 - \frac{AO^2}{2 \cdot 13^2} - \frac{OB^2}{2 \cdot 13^2} + \frac{AO \cdot OB}{4 \cdot 13^3}$$

$$4 \cdot 13^4 - 2X^2 = 4 \cdot AO^2 - 2 \cdot OB^2 - 2 \cdot AO \cdot OB + 4 \cdot AO^2 \cdot OB^2$$

$$+ AO^2 \cdot OB^2 - 13^2$$

$$X \cdot 2 \cdot 13^2 = (AO + OB) \cdot 2 \cdot 13^2 - AO \cdot OB \cdot 2 \cdot 13^2$$

$$X \cdot 2 \cdot 13^2 = (AO + OB) \cdot (2 \cdot 13^2 - AO \cdot OB)$$