МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1

1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^9 3^{10} 5^{10}$, bc делится на $2^{14} 3^{13} 5^{13}$, ac делится на $2^{19} 3^{18} 5^{30}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc.

2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC. Окружность, касающаяся прямой BC в точке B, пересекает высоту CD, проведённую к гипотенузе, в точке F, а катет AC – в точке E. Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 3 : 1$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF.

3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arcsin(\cos x) = x + \dfrac{\pi}{2}$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a, для каждого из которых найдётся значение параметра b, при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 9)\,(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 \quad \text{и} \quad \log_3^4(5y) + 2\log_{5y} 3 = \log_{25y^2}\left(3^{11}\right) - 8.$$

Найдите все возможные значения произведения xy.

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-14;42)$, $Q(6;42)$ и $R(20;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$.

7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M. Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K, лежащей на отрезке AM. Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q. Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 90, $SA = BC = 12$.

   а) Найдите произведение длин медиан AA_1, BB_1 и CC_1.

   б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N, $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

Пусть $ab = 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10} \cdot r$, $r \in N$.
$bc = 2^{14} \cdot 3^{13} \cdot 5^{13} \cdot m$, $m \in N$.
$ac = 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30} \cdot k$, $k \in N$.

Заметим, что $abc \,\vdots\, ac$, т.е. $abc \,\vdots\, 5^{30}$.

Перемножим ab, bc и ac:

$$(abc)^2 = 2^{9+14+19} \cdot 3^{10+13+18} \cdot 5^{10+13+30} \cdot r \cdot m \cdot k.$$

$$(abc)^2 = 2^{42} \cdot 3^{41} \cdot 5^{53} \cdot r \cdot m \cdot k.$$

степень вхождения 3 в

Заметим, что если $abc \le$ ~~меньше или равно~~ 20, то степень вход. 3 в $(abc)^2 \le 40$, но она точно не менее 41

т.е. степень вхождения тройки в abc не менее 21.
Аналогично, степень вхождения 2 в abc не меньше 21

Тогда наим. abc, которое может быть это $2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{30}$

Это возможно при $a = 2^7 3^7 \cdot 5^{17}$
$b = 2^2 \cdot 3^3$
$c = 2^{12} 3^{11} \cdot 5^{13}$

$ab = (2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{17}) \,\vdots\, (2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10})$
$bc = (2^{14} \cdot 3^{14} \cdot 5^{13}) \,\vdots\, (2^{14} \cdot 3^{15} \cdot 5^{13})$
$ac = (2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30}) \,\vdots\, (2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 50^{30})$

Ответ: $2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{30}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



1) $\triangle ABC$ - прямоуг, AD и DB - проекции катетов на гипотенузу, тогда $AD = AC^2 : AB$
$DB = CB^2 : AB$

$AD : DB = 3:1$, т.е. $AC^2 : CB^2 = 3:1$, т.е. $AC = CB \cdot \sqrt{3}$
$tg \angle CBA = AC : CB = \sqrt{3}$, т.е $\angle CBA = 60^\circ$, тогда
т.к. $EF \parallel AB$, то $\angle ABC = \angle EPC = 60^\circ$, где $P = EF \cap CB$.

2) Пусть $CP = x$, $PB = y$,
$\left.\begin{array}{l} CD \perp AB \\ AB \parallel EF \end{array}\right\} \Rightarrow CF \perp EP$, $\triangle CFP$: $\angle F = 90^\circ$, $\angle P = 60^\circ$, т.е. $FP = \frac{1}{2} CP$
$FP = \frac{x}{2}$
$\triangle ECP$: $\angle C = 90^\circ$, $\angle P = 60^\circ$, т.е. $CP = \frac{1}{2} EP$, $EP = 2x$

тогда т.к. F, E $\overset{и\ B}{}$ точки на окр., PB - касательная, то запишем степень точки $PB^2 = PF \cdot PE$
$y^2 = \frac{x}{2} \cdot 2x$, $y^2 = x^2$, $y = x$, т.е P - сер. CB.

3) Тогда EP - линия, пар AB, проход. через сер CB, т.е. содержит среднюю линию, $\triangle CBA$
EP - ср. линия $\triangle CBA$, EF - ср. линия $\triangle CDA$, тогда $S_{EFC} = \frac{1}{4} S_{ADC}$

4) $AD : DB = 3:1$, т.е. $S_{\triangle CAD} : S_{\triangle DBD} = 3:1$,
$S_{\triangle CAD} = \frac{3}{4} S_{ABC}$

Тогда $S_{ECF} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} S_{ABC} = \frac{3}{16} S_{ABC}$
$S_{ABC} : S_{ECF} = 16 : 3$

Ответ 16:3

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$5\arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$.

$5\arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = x + \frac{\pi}{2}$.

arcsin числа это число от $-\frac{\pi}{2}$ до $\frac{\pi}{2}$ вкл.

$\arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) \cancel{= \frac{\pi}{2}}, \cancel{где} = \frac{\pi}{2} - x + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$,

где $-\frac{\pi}{2} \le \frac{\pi}{2} - x + 2\pi k \le \frac{\pi}{2}$.

тогда уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} 5\left(\frac{\pi}{2} - x + 2\pi k\right) = x + \frac{\pi}{2} \\ k \in \mathbb{Z} \\ -\frac{\pi}{2} \le \frac{\pi}{2} - x + 2\pi k \le \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{5\pi}{2} - 5x + 10\pi k = x + \frac{\pi}{2} \\ k \in \mathbb{Z} \\ -\pi \le -x + 2\pi k \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi + 10\pi k = 6x \\ k \in \mathbb{Z} \\ -\pi \le -x + 2\pi k \le 0 \mid \cdot 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi + 10\pi k = 6x \\ k \in \mathbb{Z} \\ -6\pi \le -(2\pi + 10\pi k) + 12\pi k \le 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi + 10\pi k = 6x \\ k \in \mathbb{Z} \\ -4\pi \le 2\pi k \le 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\pi + 10\pi k = 6x \\ k \in \mathbb{Z} \\ -2 \le k \le 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi(1+5k)}{6} \\ k \in \mathbb{Z} \\ -2 \le k \le 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} k = 1 \\ x = 2\pi \end{cases} \\ \begin{cases} k = 0 \\ x = \frac{\pi}{3} \end{cases} \\ \begin{cases} k = -1 \\ x = -\frac{4\pi}{3} \end{cases} \\ \begin{cases} k = -2 \\ x = -3\pi \end{cases} \end{array} \right.$$

Ответ: $\left\{-3\pi; -\frac{4\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; 2\pi\right\}$.

$$\begin{cases} ax+2y-3b=0 \\ (x^2+y^2-9)(x^2+y^2-12x+32)=0 \end{cases}$$

(1)

1) $(x^2+y^2-9)(x^2+y^2-12x+32)=0 \Leftrightarrow (x^2+y^2-9)((x-6)^2+32-36+y^2)=0,$
$\Leftrightarrow (x^2+y^2-9)((x-6)^2+y^2-4)=0 \Leftrightarrow$ ~~решением~~
~~этот уравнение создает~~ является множество
~~точек, представляющие~~

$\Leftrightarrow \left[\begin{aligned} x^2+y^2=9 \\ (x-6)^2+y^2=4 \end{aligned}\right.$ — решение уравнения (1) будут окр. ω_1 с центром $(0,0)$ и рад. 3 и ω_2 с центром $(6,0)$ и рад. 2.



2) $ax+2y-3b=0$ — уравнение прямой $y=\frac{-ax+3b}{2}$
необходимо, чтобы было 4 решения. Прямая имеет с окр. макс. 2 общие точки, т.е. необходимо, чтобы прямая пересекла каждую окр. в двух точках.

Заметим, что параметр a задает наклон этой прямой, параметр b задает пар. перенос на вектор $(0; \frac{3b}{2})$.

~~Тогда стоит рассматривать такие прямые, которые никаких парам.~~

3) Проведем внутр касательные окружностей. Каждая из окр. симметрична относ. OX т.е. их кас. тоже будут симметр. относ. OX и т. перес. кас., точка A, будет лежать на OX.

4) Рассмотрим одну из кас. l, пусть она кас ω_1 в т. B, ω_2 в т. C, $O_1(6,0)$ — центр ω_2. т.к. рад. окр., провед. в т. кас, перпенд. кас, то (-1-)

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$OB \perp AB$, $O_1C \perp AC$. $\angle BAO = \angle O_1AC$ как вертик. тогда $\triangle OBA \sim \triangle O_1CA$, т.е. $\frac{OA}{AO_1} = \frac{OB}{OC} = \frac{3}{2}$ — радиусы.

$OA + AO_1 = OO_1 = 6$.

тогда $\begin{cases} OA = 1{,}5\,AO_1 \\ OA + AO_1 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} OA = \frac{18}{5} \\ OA_1 = \frac{12}{5}. \end{cases}$

$\triangle ACO_1$: ~~Ao~~ по т. Пифагора $AC = \sqrt{AO_1^2 - OC^2} = \sqrt{\left(\frac{12}{5}\right)^2 - 2^2} = \sqrt{\frac{144}{25} - 4} = \sqrt{\frac{44}{25}} = \frac{2\sqrt{11}}{5}$.

тогда $tg\,\angle O_1AC = \frac{O_1C}{AC} = 2 / \left(\frac{2\sqrt{11}}{5}\right) = \frac{5}{\sqrt{11}}$

$\angle O_1AC$ — угол между кас. и OX.
$\angle(l; OX) = \angle(m; OX)$, тангенс угла наклона и есть коэф. наклона прямой.

Тогда ~~зап~~ кас. это прямые с наклоном $\frac{5}{\sqrt{11}}$ к OX проход. через $\left(\frac{18}{5}; 0\right)$.

$m: y = \frac{5}{\sqrt{11}}x - \frac{18}{\sqrt{11}}$, $l: y = -\frac{5}{\sqrt{11}}x + \frac{18}{\sqrt{11}}$.

4) а) Рассмотрим все прямые, проход. через т. A. если это кас, то они имеют с окр. по 1 точке, всего 2 решения, $\Rightarrow$ не подходит.

б) Если это прямые M, которые проходят через область ⓐ (см. на рисунке), то они не имеют общих т. ~~с окр. Все прямые~~ с окр.
Окр. находятся по разные стороны от таких прямых. Прямые, пар. прямых M будут по одну сторону от прямой M, проход. через A, т.е. по одну сторону с одной из окр. и по другую с другой, т.е. могут быть только перес. только с одной, т.е. макс 2, а не 4.

ⓐ область между кас., в которой не лежат окр.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

а) • Каждая из прямых пар кас. ~~не имеют~~ так же расположена по одну какую-то сторону от касательной, которой она пар. Окр. находятся по разные стороны от кас, т.е. ~~по одну сторону только с одной/окр. т.е прямые~~ прямые, пар. кас могут иметь макс. 2 общие точки с окр., а не 4.

в) Если это прямые N, проход. через область (e), то они ~~имеют общ~~ пересекают каждую окр. в двух точках, т.е есть 4 решения. (Область (e) это область между кас, сод. ω_2). ~~т.е~~

Значит нам подходят прямые, про таким угловым коэф, что если они проходят через т. A, то ~~они нет~~ их лучи лежат в области (e).

т.е. это прямые с угл. коэф от 0 до $\frac{5}{\sqrt{11}}$ (касательной m) и от $\frac{-5}{\sqrt{11}}$ (кас. l) до 0. (0 включительно).

г) Коэф. прямых $y=\frac{-ax+3b}{2}$ это $-\frac{a}{2}$

т.е. $-\frac{5}{\sqrt{11}} < -\frac{a}{2} < \frac{5}{\sqrt{11}}$, $-\frac{10}{\sqrt{11}} < a < \frac{10}{\sqrt{11}}$.

Ответ: $\left(-\frac{10}{\sqrt{11}}; \frac{10}{\sqrt{11}}\right)$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1) $\log_3^4 x + 6\log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8.$

$\log_3^4 x + 6\log_x 3 = \frac{5}{2}\log_x 3 - 8$

$\log_3 x = \frac{1}{\log_x 3}$

Пусть $\log_3 x = a$, $a \neq 0$, тогда

$\begin{cases} a^4 + 6\frac{1}{a} = \frac{5}{2}\cdot\frac{1}{a} - 8 \\ a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a^5 + 16a + 7 = 0 \\ a \neq 0 \end{cases}.$

2) $\log_3^4(5y) + \cancel{2\log_{25y^2}(3^{11}) - 8}\ 2\log_{5y} 3 = \log_{25y^2}(3^{11}) - 8$ -

$\log_3^4(5y) + 2\log_{5y} 3 = \frac{11}{2}\log_{5y} 3 - 8.$

$\log_3 5y = \frac{1}{\log_{5y} 3}$

Пусть $\log_3 5y = b$, $b \neq 0$, тогда

$\begin{cases} b^4 + 2\frac{1}{b} = \frac{11}{2}\cdot\frac{1}{b} - 8 \\ b \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2b^5 + 16b - 7 = 0 \\ b \neq 0. \end{cases}$

3) Рассмотрим функции $f(t) = 2t^5 + 16t + 7$ и $g(t) = 2t^5 + 16t - 7$.

$2t^5 \nearrow$ на R, $16t + 7 \nearrow$ на R, т.е. $f(t) \nearrow$ на R как сумма возр. функций.

$f(0) = 7 > 0$, $f(-1) = -2 - 16 + 7 = -11 < 0$,
$f(t)$ непрерывна на R как сумма непрерывных функций, тогда по т. Больцано–Коши на R $\exists$ найдется такое c, что $f(c) = 0$.
А так как $f(t)$ строго монотонна, то такое c – единственное. $c = a$, т.к. $2a^2 + 16a + 7 = 0$ из 1).

Аналогично $g(t)$ имеет ед. корень и этот корень b.

-1-

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

~~$f(-a) = 2(-a)^5 + 16(-a) + 7 = -2a^5 - 16a + 7 =$~~

$z \in \mathbb{R}$: $f(-z) = 2(-z)^5 + 16(-z) + 7 =$
$= -2z^5 - 16z + 7 = -(2z^5 + 16z - 7) = -g(z)$.

т.е $f(-z) = -g(z)$.

$g(b) = 0$, т.е. $0 = g(b) = -g(b) = f(-b)$.

$f(-b) = 0$, но a — ед. корень ~~этого~~ $f(t)=0$
т.е. $a = -b$.

4) т.е. $\log_3 x = -\log_3 5y$
$\log_3 x = \log_3 (5y)^{-1}$
$x = \frac{1}{5y}$
$xy = \frac{1}{5}$ Ответ: $\frac{1}{5}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☒

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ





Решение:

а) 1) $(AMS) \cap \Omega$ по окр.

$L, K, Q, P \in (AMS)$ и $\in \Omega$, т.е. L, P, Q, K лежат на одной окр. ω

AL и AK — кас к Ω, т.е. кас. к ω

$AL = AK$ — как отрезки кас, провед. из 1 т.

Запишем степени точек S и M:

$SL^2 = SP \cdot SQ$, $MK^2 = MQ \cdot MP$ (SL и MK — кас.)

$SP = QM$ — по усл. $\left.\begin{array}{l} SQ = SP + PQ \\ MP = SP + QM \end{array}\right\} \Rightarrow QS = MP$.

т.е. $SL^2 = SP \cdot SQ = MQ \cdot MP = KM^2$, $SL = MK$.

т.е. $AS = AM = 12$

2) M — т. перес. медиан, т.е. $AM = \frac{2}{3} AA_1$, т.е. $AA_1 = 18$.

$S_{BAA_1} = S_{AA_1C}$, т.к. AA_1 — медиана. $S_{ABC} = 2S_{BAA_1}$.

$S_{AA_1B} = AA_1 \cdot A_1B \cdot \sin\angle(AA_1; BA_1)/2$.

Пусть $\angle(AA_1; BA_1) = \alpha$, тогда

$S_{ABC} = AA_1 \cdot A_1B \cdot \sin\alpha$.

$18 \cdot \frac{12}{2} \cdot \sin\alpha = 90$, $\sin\alpha = \frac{5}{6}$.

Пусть, не умаляя общности $AB < AC$, тогда в $\triangle AA_1B$ $\angle AA_1B$ — острый, $\cos\angle AA_1B =$
$= \sqrt{1 - \sin^2\angle AA_1B} = \frac{\sqrt{11}}{6}$.

$\triangle AA_1B$ по т. косинусов: $AB^2 = AA_1^2 + A_1B^2 - 2\cos\angle A_1 \cdot AA_1 \cdot A_1B$

$AB^2 = 18^2 + 6^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{11}}{6} \cdot 18 \cdot 6 = 2^2(9^2 + 3^2 - \sqrt{11} \cdot 9) =$
$= 6^2(3^2 + 1^2 - \sqrt{11})$. $AB = 6\sqrt{10 - \sqrt{11}}$.

$\triangle AA_1C$ ~~по~~ $\cos\angle AA_1C = -\frac{\sqrt{11}}{6}$

по т. косинусов

$AC^2 = AA_1^2 + A_1C^2 - 2\cos\angle A_1 \cdot AA_1 \cdot A_1C.$

$AC^2 = 18^2 + 6^2 - 2\cdot\left(-\frac{\sqrt{11}}{6}\right)\cdot 18 \cdot 6.$

$AC^2 = 6^2(9+1+\sqrt{11})$; $AC = 6\sqrt{10+\sqrt{11}}.$

3) $\triangle ABC$ по т. косинусов $CB^2 = AC^2 + AB^2 - 2\cos\angle A \cdot AC \cdot AB$

$12^2 = (6\sqrt{10-\sqrt{11}})^2 + (6\sqrt{10+\sqrt{11}})^2 - 2\cos\angle A \cdot 6^2\sqrt{10-\sqrt{11}}\cdot\sqrt{10+\sqrt{11}}$

$4 = 10-\sqrt{11}+10+\sqrt{11} - 2\cos\angle A\sqrt{100-11}$

$\cos\angle A = \frac{10+10-4}{2\sqrt{89}} = \frac{16}{2\sqrt{89}} = \frac{8}{\sqrt{89}}$

$\triangle ACC_1$ по т. косинусов:

$CC_1^2 = AC^2 + AC_1^2 - 2\cos\angle A \cdot AC \cdot C_1A$

$CC_1^2 = 6^2(10+\sqrt{11}) + 3^2(10-\sqrt{11}) - 2\cdot\frac{8}{\sqrt{89}}\cdot 6\cdot 3\sqrt{10+\sqrt{11}}\cdot\sqrt{10-\sqrt{11}}$

$CC_1^2 = 6^2(10+\sqrt{11}) + 3^2(10-\sqrt{11}) - 2\cdot 8\cdot 6\cdot 3.$

$CC_1^2 = 3^2(40+4\sqrt{11}+10-\sqrt{11} - 4\cdot 8)$

$CC_1^2 = 3^2(3\sqrt{11}+50-32)$; $CC_1 = 3\sqrt{3\sqrt{11}+18}.$

$\triangle ABB_1$ по т. косинусов:

$BB_1^2 = BA^2 + AB_1^2 - 2\cos\angle A \cdot AB \cdot AB_1$

$BB_1^2 = 6^2(10-\sqrt{11}) + 3^2(10+\sqrt{11}) - 2\cdot\frac{8}{\sqrt{89}}\cdot 6\cdot 3\sqrt{10-\sqrt{11}}\cdot\sqrt{10+\sqrt{11}}$

$BB_1^2 = 3^2(40-4\sqrt{11}+10+\sqrt{11}) - 2\cdot 8\cdot 6\cdot 3$

$BB_1^3 = 3^2(50-3\sqrt{11}-32)$; $BB_1 = 3\sqrt{18-3\sqrt{11}}$

Тогда $AA_1\cdot BB_1\cdot CC_1 = 18\cdot 3\sqrt{3\sqrt{11}+18}\cdot 3\sqrt{18-3\sqrt{11}} =$
$= 18\cdot 9\sqrt{18^2-(3\sqrt{11})^2} = 18\cdot 9\cdot 3\sqrt{6^2-11} = 18\cdot 9\cdot 3\cdot 5 =$
$= 2\cdot 81\cdot 3\cdot 5 = 2430$

Ответ: 2430.

б) SN кас. Ω, т.е. $SL = SN = 4.$

$AL = AK = 8$

$BN = BK$, $CN = CK$. $\triangle KBC = \triangle NBC.$

По т. косинусов можно найти BK, CK.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№4.

$x^2-12x+36-36+32+y^2=0.$

$$\begin{cases}(x-6)^2+y^2=\cancel{4}^2\\ x^2+y^2=\cancel{3}^2\end{cases}$$

$y=\dfrac{-ax+3b}{2}.$

$-\dfrac{a}{2}.$





$ax+2y-3b=0$

$x=\dfrac{3b-2y}{a}.$







На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$\cancel{3+x}$

$x+y=6 \mid \cdot 2$

$\frac{x}{y}=\frac{3}{2}$; $2x=3y$.

$3y+2y=12y=\frac{12}{5}$

$x=\frac{18}{5}$.

$\frac{12}{5}$.

$\sqrt{\left(\frac{12}{5}\right)^2-2^2}=$

$=\sqrt{\frac{144}{25}-4}=\sqrt{\frac{44}{25}}=\frac{2\sqrt{11}}{25}$

$tg=\frac{2}{\frac{2\sqrt{11}}{5}}=\frac{5}{\sqrt{11}}$

$\log_3^4 x+6\log_x 3=\log_{x^2} 3^5-8$.

$\log_3^4 x+6\log_x 3=\frac{5}{2}\log_x 3-8$.

$a^4+6\frac{1}{a}=\frac{5}{2}\frac{1}{a}-8$

$a^5+6=2,5-8a$.



$a^5+8a+3,5=0$ $\quad 2a^5+16a+7=0$.

$a=-b$

$\log_3^4 5y+2_{5y}3=\frac{11}{2}\log_{25y^2}-8$.

2

25

$b^4+2\frac{1}{b}=\frac{11}{2}\frac{1}{b}-8b$

$b^5+8b-3,5$

$2b^5+16b-7=0$.

$\cancel{b^5+8b-3}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$2(a^5+b^5)+16(a+b)=0$

$(a+b)(a^4 - \cancel{\ } + b^2a^2 - ba^3 + b^4 + 4) = 0.$

$a=-b$

$\log_3 x = -\log_{3} 5y^{-1}$ $\qquad y_1 = y_3$

$\log_3 x = \log_3 \frac{1}{5y}$

№ 5 $\qquad 3(x_1; y_1)$

$f(-z) = -2z^5 - 16z + 7 = -(2z^5 + 16 - 7) = -g(z)$



$0 \le y \le 42$

$-14 \le 20.$

$y=42$

$y=20.$

$42 = -14x + b$

$y = -3x$

$y = -3x + 60$

$37.$ $\qquad y_1 = y_3.$

$33 + 3x_1 + y_1 = 3x_2 + y$

x $\begin{cases} y \le 42 \\ y \ge 0 \\ y \ge -3x \\ y \le -3x + 60 \end{cases}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



$AC = 6\sqrt{10+\sqrt{11}}$

$AB = 6\sqrt{10-\sqrt{11}}$



$AA_1 = 18$.



$\cancel{18} \cdot 18 \cdot \sin\alpha \cdot 6 = 90$

$\sin\alpha \; \frac{5}{6}$

$2\frac{\sqrt{11}}{4}$



$1 - \frac{25}{36}$

$\left(3 + \frac{\sqrt{11}}{6}\right)^2$.

$\cancel{45 = \frac{x + \sqrt{a} + 8}{2}}$ x

$9 + \sqrt{11} + \frac{11}{36} + \frac{25}{36}$

$\frac{5}{6}$

$6(10 - \sqrt{11})$.

$AB = 6\sqrt{10-\sqrt{11}}$.

9

$\cancel{x + ab}$ $+$

$45^2 = \cancel{\frac{\sqrt{10-\sqrt{11}}\,x + 6}{2}} \cdot \frac{3\sqrt{10-\sqrt{11}} + x + 12}{2}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$ab = 2^9 3^{10} 5^{10} r$
$bc = 2^{14} 3^{13} \cdot 5^{13} m$
$ac = 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30} \cdot q.$

$9+14+19 = 14 + 28 = 42.$

$(abc)^2 = 2^{32} \cdot 3^{41} \cdot 5^{53} \; r \cdot m \cdot q$

$abc = 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{27}.$

$ab = 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{-10}.$
$bc = 2^{14} \cdot 3^{13}$
$ca =$

$\cancel{b = 2^{7} \cdot 3^{3} \cdot 5}$

$abc = 2^{21} \cdot 3^{21} 5^{30}$

$2^{19} 3^{18} 5^{-30}$

$b = 2^2 \cdot 3^3$
$a = 2^7 \cdot 3^{7} 5^{17}$
$C = 2^{12} \cdot 3^{11} \cdot 5^{20}.$

№2.







$FP = \frac{y}{2}.$ $\angle B = 60^\circ.$

$EP = 2y.$



$AD = \frac{AC^2}{AB}$

$DB = \frac{CB^2}{AB}$

$\left(\frac{AC}{CB}\right)^2 = 3$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$$5\arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}.$$

$$5\arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \le \frac{\pi}{2} - x + 2\pi k \le \frac{\pi}{2} \\ 5\left(\frac{\pi}{2} - x + 2\pi k\right) = x + \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\pi \le -x + 2\pi k \le 0 \\ \frac{5\pi}{2} - 5x + 10\pi k = x + \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \le -x + 2\pi k \le 0 \\ 2\pi + 10\pi k = 6x \end{cases}$$

$$x = \frac{2\pi(1+5k)}{6}.$$

$$-\frac{\pi}{2} \le -\frac{2\pi(1+5k)}{6} + 2\pi k \le 0$$

$$-3\pi \le -2\pi - 10\pi k + 12\pi k \le 0$$

$$-\pi \le 2\pi k \le 2\pi.$$

$$-\frac{1}{2} \le k \le 1$$

$0; 1.$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!







$ax+2y+6.$

$\log \quad x>0$
$y>0.$

$\frac{2\pi - 3\pi}{6}.$

$2\pi(\frac{1}{6}) = \frac{\pi}{3}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!