



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 9



1. [4 балла] Натуральные числа a , b , c таковы, что ab делится на $2^{14}7^{10}$, bc делится на $2^{17}7^{17}$, ac делится на $2^{20}7^{37}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .

2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 1 и 5 соответственно.

4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2 - 7x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-12;24)$, $Q(3;24)$ и $R(15;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 12$.

6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax - y + 10b = 0, \\ ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 4,5 и 2.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + p_1 + p_2 \geq 104 \\ x_1 + x_3 + p_1 + p_3 \geq 174 \\ x_1 + x_3 + p_1 + p_3 \geq 20 \\ x_1 + x_2 + x_3 = \frac{51 + p_1 + p_2 + p_3}{2} = 26 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + p'_1 + p'_2 \geq 104 \\ y_2 + y_3 + p'_1 + p'_3 \geq 174 \\ y_1 + y_3 + p'_1 + p'_3 \geq 34 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 32 + \frac{p'_1 + p'_2 + p'_3}{2} \end{cases}$$

Нетрудно заметить, что
вторая система имеет
решения при $p'_1 + p'_2 + p'_3 = 5$,
которое при этом являет-
ся минимальным.

Пример: $x_1 = 9$, $x_2 = 11$, $x_3 = 6$,
 $y_1 = 20$, $y_2 = 0$, $y_3 = 10$

abc = $2^{26} \cdot 4^{34}$

Ответ: $2^{26} \cdot 4^{37}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$abc = 4^{\frac{34}{2}} \sqrt{K_1 K_2 K_3 \cdot 2^{51}} \Leftrightarrow$$

$$2^{x_1 + x_2 + x_3} \cdot 4^{y_1 + y_2 + y_3} = 4^{\frac{(32 + p_1 + p_2 + p_3)}{2}} \cdot 2^{\frac{51 + p_1 + p_2 + p_3}{2}}$$

$$\text{т.к. } \sqrt{K_1 K_2 K_3 \cdot 2^{51}} \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$\frac{51 + p_1 + p_2 + p_3}{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow 51 + p_1 + p_2 + p_3 : 2$$

Без ограничения общности при-
мем, что $p_1 = 1, p_2 = 0, p_3 = 0$
(подобрать тройку (p_1, p_2, p_3)

такую, чтобы $\frac{p_1 + p_2 + p_3 + 51}{2} : 2$

и при этом, чтобы сумма $p_1 + p_2 + p_3$
в новой тройке была меньше

$p_1 + p_2 + p_3$ при $p_1 = 1, p_2 = 0, p_3 = 0$
меньше, т.к. наименьшее число к

$p_1 + p_2 + p_3 + 51$ которое будет $: 2$
при $p_1, p_2, p_3 \geq 0$ будет 52).

$$ab : 2^{14} \cdot 4^{10}, bc : 2^{14} \cdot 4^{14}, ac : 2^{10} \cdot 4^{34} \Leftrightarrow$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

м.к $ab: 2^{14} \cdot 4^{10}$, $bc: 2^{14} \cdot 4^{14}$,
 $ac: 2^{20} \cdot 4^{34} \Rightarrow ab = k_1 \cdot 2^{14} \cdot 4^{10}$,
 $bc = k_2 \cdot 2^{14} \cdot 4^{14}$, $ac = k_3 \cdot 2^{20} \cdot 4^{34}$,
 где k_1, k_2, k_3 - частное полученное
 при делении: ab на $2^{14} \cdot 4^{10}$,
 bc на $2^{14} \cdot 4^{14}$, ac на $2^{20} \cdot 4^{34}$
 соответственно. $\Rightarrow$

$$ab \cdot bc \cdot ac = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot 2^{14+14+20} \cdot 4^{10+14+34}$$

$$\Leftrightarrow (abc)^2 = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot 2^{51} \cdot 4^{64} \Leftrightarrow$$

$$abc = 4^{32} \sqrt{k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot 2^{51}}. \text{ Так как}$$

как $a, b, c \in \mathbb{N} \Rightarrow abc \in \mathbb{N} \Rightarrow$
 $\sqrt{k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot 2^{51}} \in \mathbb{N}$. Очевидно,

чтобы abc было минималь-
 ным, $k_1 = 2^{p_1} \cdot 4^{p'_1}$, $k_2 = 2^{p_2} \cdot 4^{p'_2}$,

$k_3 = 2^{p_3} \cdot 4^{p'_3}$, где $p_1, p_2, p_3, p'_1, p'_2, p'_3$

$p'_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, а $a = 2^{x_1} \cdot 4^{y_1}$,
 $b = 2^{x_2} \cdot 4^{y_2}$, $c = 2^{x_3} \cdot 4^{y_3}$. Тогда

получаем, что $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3 \in$
 $\mathbb{N} \cup \{0\}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Из условия следует, что
 m — это НОД: $(a+b, a^2-6ab+b^2)$

$$\begin{aligned} a^2-6ab+b^2 &= (a+b)^2-8ab \Rightarrow \\ (a+b, (a+b)^2-8ab) &= (a+b, -8ab) \Rightarrow \\ (\text{т.к. } \frac{a}{b} \text{ является несократимой} \\ \text{дробью}) &\Rightarrow a \text{ и } b \text{ взаимнопросты} \\ &\Rightarrow (a+b, -8ab) = \pm 8, \pm 4, \pm 2, \\ &\pm 1 \end{aligned}$$

Ис. к нас интересуют наимень-
шие $m \Rightarrow m = 8$. Пример: $a=11, b=5$

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2} = \frac{11+5}{11^2-6 \cdot 5 \cdot 11+5^2} = \frac{16 \overset{\cdot 8}{\cancel{128}}}{184 \overset{\cdot 8}{\cancel{1472}}} = \frac{2}{23}$$

Ответ: $m = 8$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1

☐

2

☐

3

☒

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\Rightarrow AB = 8 \sqrt{\frac{-50 + \sqrt{50^2 + 4 \cdot 49 \cdot 99}}{2 \cdot 49}}$$

$$\text{Ответ: } 8 \sqrt{\frac{-50 + \sqrt{50^2 + 4 \cdot 49 \cdot 99}}{2 \cdot 49}}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



N3



Дано

O - ц. W

$$\frac{AC}{CB} = 4$$

$$r_W = 1$$

$$R_\Omega = 5$$

$$AB = ?$$

Решение: Проведём CO .

Продлим OC до пересечения с Ω в точке D . $\angle ADO = \angle CBO$ как опирающиеся на одну дугу AD . Пусть $AC = 4x$, $CB = x$.

П.к. C - это точка касания $\Rightarrow \angle OCB = 90^\circ \Rightarrow \angle DCA = \angle OCB = 90^\circ$ (как вертикальные).

$$\angle ADC = \angle CBO, \angle DCA = \angle BCO = 90^\circ \Rightarrow \triangle ADC \sim \triangle BCO \Rightarrow \frac{AC}{CO} = \frac{DC}{x}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$AB = 8 \times = 8 \sqrt{\frac{-50 \pm \sqrt{50^2 + 4 \cdot 49 \cdot 99}}{2 \cdot 49}}$$

Ответ: $8 \sqrt{\frac{-50 \pm \sqrt{50^2 + 4 \cdot 49 \cdot 99}}{2 \cdot 49}}$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{2x^2+2x+1} \leq 1 \text{ и } \sqrt{2x^2-5x+3} \leq 1$$

не пересекаются $\Rightarrow \sqrt{2x^2+2x+1} + \sqrt{2x^2-5x+3}$
будет больше 1 при всех допус-
тимых $x \Rightarrow x = \frac{2}{7}$ является
единственным корнем.

Ответ: $x = \frac{2}{7}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{2x^2-5x+3} - \sqrt{2x^2+2x+1} = 2-4x \Leftrightarrow$$

$$\left(\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1} \right) \left(\sqrt{2x^2-5x+3} - \sqrt{2x^2+2x+1} \right) = 2-4x$$

$$- \sqrt{2x^2+2x+1} + \sqrt{2x^2-5x+3}$$

$$\frac{2x^2-5x+3 - 2x^2-2x-1}{\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1}} = 2-4x$$

$$\frac{2-4x}{\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1}} = 2-4x$$

Заметим, что $x = \frac{2}{4}$ является решением. Рассмотрим теперь все

$$x \neq \frac{2}{4} : \frac{2-4x}{\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1}} = 2-4x \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2x^2-5x+3} + \sqrt{2x^2+2x+1} = 1.$$

Заметим, что $\sqrt{2x^2-5x+3} \leq 1$
при $x \in \left[\frac{1}{2}, 2 \right]$, а с учетом
того, что $2x^2-5x+3 \geq 0$:

$$\sqrt{2x^2-5x+3} \leq 1 \text{ при } x \in \left[\frac{1}{2}; 1 \right] \cup [1,5; 2]$$


А при $x \in \left[-\frac{1}{2}; 0 \right] : \sqrt{2x^2+2x+1} \leq 1$
т.к. множества x , при которых

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


МФТИ

$$49(x^4 + x^6) + x^4 + 1 = 700$$

$$49x^9 + 50x^6 + 99 = 0$$

$$x = 50 \pm \sqrt{e}$$

$$\begin{array}{r} 89 \\ \times 97 \\ \hline 623 \\ 8010 \\ \hline 8693 \end{array}$$

27904 =

9. 11. 24.

$\begin{array}{ccccc} & 7 & 9 & 4 & 0 & 4 \\ + & 2 & 5 & 0 & 0 & \\ \hline \end{array}$

$$\begin{array}{r} 21904 \overline{) 15976} \\ \underline{-20} \\ 19 \\ \underline{-16} \\ 30 \end{array}$$

$$\sqrt{5476} = 74$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐







МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 14 \\ y_1 + y_2 \geq 10 \\ x_2 + x_3 \geq 14 \\ y_2 + y_3 \geq 14 \\ x_1 + x_3 \geq 10 \\ y_1 + y_3 \geq 34 \end{cases}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{51 + p_1 + p_2 + p_3}{2} = \frac{54}{2} = 27$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 32 + \frac{p_1 + p_2 + p_3}{2}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2x - 7$$

$$2x^2 - 5x + 3 - 2x^2 - 2x - 1 = (2x - 7)^2$$

$$(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1})$$

$$-7x + 2 = (2x - 7)(\sqrt{2x^2 + 2x + 1} + \sqrt{2x^2 - 5x + 3})$$

$$\frac{a+b}{a^2 - 6ab + b^2} = \frac{-7x+2}{2x-7} = \frac{-\sqrt{2x^2+2x+1} - \sqrt{2x^2-5x+3}}{-5x+1}$$

$$y_1 = 0, y_2 = 14, y_3 = 20$$

$$a, b : 2^{14} \cdot 4^{10} \Rightarrow a, b \geq K_1 \cdot 2^{14} \cdot 4^{10}$$

$$b, c : 2^{14} \cdot 4^{12} \Rightarrow b, c = K_2 \cdot 2^{14} \cdot 4^{14}$$

$$a, c : 2^{10} \cdot 4^{32} \Rightarrow a, c = K_3 \cdot 2^{20} \cdot 4^{32}$$

$$(abc)^c = K_1 K_2 K_3 \cdot 2^{51} \cdot 4^{69} \Rightarrow$$

$$abc = \sqrt{K_1 K_2 K_3 2^{51} \cdot 4^{69}} = 2^{26} \cdot 4^{32}$$

$$K_1 = 2^1$$

$$a, b = 2^{25} \cdot 4^{10}$$

$$\begin{cases} y + y_1 = 20 \\ y_1 + y_2 = 14 \\ y + y_2 = 34 \end{cases} \Rightarrow y_1 \geq 9, y_2 \geq 2, y_3 \geq$$

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 14 \\ x_1 + x_3 = 14 \\ x_1 + x_2 = 20 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 6, x_2 = 8, x_3 = 11$$

$$x_1 = 6, x_2 = 8, x_3 = 11$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = \frac{4 - 2x}{2 - 4x}$$

$$4 - 4x = a, \quad 2 - 4x = b$$

$$\sqrt{(4 - 4x)(2 - 4x)} = 2(x - 1)(x - 1.5)$$

$$a = x - 1, \quad b = x - 1.5$$

$$\sqrt{2x^2 + 2x + 1} + 4 - 4x \geq 0$$

$$\sqrt{2x^2 + 2x + 1} \geq 4x - 4$$

$$\begin{cases} 2x^2 + 2x + 1 \geq 16x^2 - 32x + 16 \\ 4x - 4 \geq 0 \end{cases}$$

$$4x - 4 \geq 0 \quad \frac{4x - 5}{2\sqrt{2x^2 - 5x + 3}} + \frac{4x + 2}{2\sqrt{2x^2 + 2x + 1}}$$

$$4x - 4 \leq 0 \quad \sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{\frac{4}{9} - \frac{10}{9}} + \frac{14}{9} = \frac{8}{3}$$

$$\sqrt{2x^2 + 2x + 1} = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{28}{9} + \frac{49}{9}} = \frac{9}{3}$$

$$\boxed{x = \frac{9}{3}}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{3+5}{9+25-60} = \frac{8}{25}$$

$$a+b = kab$$

$$\frac{a(bk+1) + b(bk+1)}{(-bk+1)(a+b)} = -bk$$

$$a+b = 8k$$

$$ab = k$$


$$y = ax + 10b$$

$$a = \frac{k}{8}, \quad k - 8kb + b^2 = 0$$

$$b = \frac{8k \pm \sqrt{64k^2 - 4k}}{2}$$

$$b = 8k \pm \sqrt{16k^2 - k}$$

$$76k - 1 = a$$



- 1 - 1
- 2 - 4
- 3 - 9
- 4 - 0
- 5 - 9
- 6 - 4
- 7 - 1
- 8 - 0

$$\begin{array}{r} 113 \\ 16 \\ \hline 136 - 336 \end{array}$$

8

$$\begin{array}{r} 17 + 5 \\ 117 + 25 - 60 \cdot 5 \\ \hline 111 \\ 111 \\ 111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 330 \\ - 195 \\ \hline 135 \\ 134 \\ - 16 \\ \hline 118 \end{array}$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\text{pow}(A, w) = R^L - R^L = 0$$

$$\text{pow}(B, w)$$

$$a^L - 8ab + b^L =$$

$$(a+b)^L - 8ab$$

$$\{(a+b)^L - 8ab, a+b\}$$

$$(a+b)^L - 8ab \equiv -8ab \Rightarrow$$

$$((a+b)^L - 8ab, a+b) = (-8ab, a+b)$$

$$\frac{a}{b} - \text{месса} \Rightarrow a \perp b \Rightarrow \text{?}$$

$$a+b = -8ab \Leftrightarrow a(8b+1) = -b \Rightarrow$$

$$\sqrt{2x^L - 5x + 3} - \sqrt{2x^L + 2x + 1} = 2 - 4x \Leftrightarrow$$

$$= 4x + 2$$

$$\sqrt{2x^L - 5x + 3} + \sqrt{2x^L + 2x + 1} = 2 - 4x$$

$$x \neq \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sqrt{2x^L - 5x + 3} + \sqrt{2x^L + 2x + 1} = 1$$

$$f(x) = 2x^L + 2x + 1, f'(x) = 4x + 2; x = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{3}{4} \quad \frac{2 \cdot 15}{16} - \frac{5 \cdot 5 \cdot 4}{16} + \frac{48}{16} =$$

$$\frac{90}{16} - \frac{100}{16} = \frac{-10}{16} = -\frac{5}{8}$$

$$x = \frac{1}{4} \quad 2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{5}{4} + 3 = \frac{1}{2} + \frac{5}{4} + 3 = \frac{1}{4} + \frac{5}{2} + 3 = \frac{1}{4} + \frac{5}{2} + \frac{6}{2} = \frac{1}{4} + \frac{11}{2} = \frac{1}{4} + \frac{22}{4} = \frac{23}{4}$$

$$2x^L + 2x + 1 \leq 1$$

$$2x^L - 5x + 3 \geq 1$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Соединим точ. C
с точ. O. П.к. C -
т. касания $\Rightarrow$
 $\angle BCO = 90^\circ$. Проведем

OC до пересечения с Ω . Пусть
OC пересекает Ω в точке D.
 $\angle BCO = \angle ADO = 90^\circ$ (как верт.).

$\angle ADC = \angle ABC$ как опираю-
щиеся на одну дугу $\Rightarrow \triangle ADC \sim$
 $\triangle BCO \Rightarrow \frac{AC}{OC} = \frac{BC}{OB}$. Пусть

$$AC = 4x, BC = x: DC = \frac{AC \cdot CB}{OC} = 4x^2$$

$\triangle ADC \sim \triangle BCO$ - подобие $\Rightarrow$

$$AD = 4\sqrt{x^2 + x^2}, BC = \sqrt{x^2 + 1}$$

П.к. $OD \perp BA$ ($\angle DCB = \angle ACO = 180 - \angle ACB$
 $= 90$) $\Rightarrow AD^2 + OB^2 = 4 \cdot 5^2 \Leftrightarrow$

$$99x^4 + 50x^2 - 99 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{-50 \pm \sqrt{50^2 + 4 \cdot 99}}{2 \cdot 99}}$$

Положительное выр $> 0, x > 0 \Rightarrow$

$$x = \sqrt{\frac{-50 + \sqrt{50^2 + 4 \cdot 99}}{2 \cdot 99}} \Rightarrow$$