



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 3



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^8 3^{14} 5^{12}$, bc делится на $2^{12} 3^{20} 5^{17}$, ac делится на $2^{14} 3^{21} 5^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 5 : 2$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3, \quad \text{и} \quad \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-16;80)$, $Q(2;80)$ и $R(18;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $5x_2 - 5x_1 + y_2 - y_1 = 45$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 100, $SA = BC = 16$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



~ 1

Дано: $a, b, c \in \mathbb{N}$

$$ab : 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}$$

$$bc : 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}$$

$$ac : 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}$$

Найти: abc - наим.

$$1) \text{ пусть } \begin{cases} ab = k \cdot 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} \\ bc = m \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} \\ ac = n \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39} \end{cases}$$

где $k, m, n \in \mathbb{N}$

$$\text{Тогда } \begin{cases} b = \frac{k}{a} \cdot 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} & (1) \\ c = \frac{m}{b} \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} & (2) \\ c = \frac{n}{a} \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39} & (3) \end{cases}$$

$$(2) = (3) \quad \frac{m}{b} \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} = \frac{n}{a} \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}$$

$$b = \frac{m}{n} \cdot a \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1} \cdot 5^{-22}$$

$$(1): \quad \frac{m}{n} \cdot a \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1} \cdot 5^{-22} = \frac{k}{a} \cdot 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}$$

$$\frac{m}{n} a^2 = \frac{k n}{m} \cdot 2^{20} \cdot 3^{15} \cdot 5^{34}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$a = \sqrt{\frac{kn}{m} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \cdot 3^{15} \cdot 5^{34}} =$$

$$= 2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^{17} \sqrt{\frac{kn}{m} \cdot 3}$$

Заметим, что

$$abc = \underbrace{2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^{17} \sqrt{\frac{kn}{m} \cdot 3}}_a \cdot \underbrace{m \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}}_{bc} =$$

$$= 2^{17} \cdot 3^{27} \cdot 5^{34} \sqrt{m^2 \cdot \frac{kn}{m} \cdot 3} =$$

$$= 2^{17} \cdot 3^{27} \cdot 5^{34} \sqrt{knm \cdot 3}$$

$$\text{Т.к. } abc \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt{knm \cdot 3} \in \mathbb{N}$$

(нога $a, b, c \in \mathbb{N}$)

$$\text{и т.к. } \sqrt{knm \cdot 3} \text{ - наим} \Rightarrow \sqrt{knm \cdot 3} \text{ - наим} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{knm \cdot 3} = 3, \text{ при } k=3 \text{ или } n=3 \text{ или } m=3$$

$$\text{Тогда } abc = 2^{17} \cdot 3^{27+1} \cdot 5^{34}$$

$$\text{Ответ: } 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{34}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$12m = 16\pi - 4\pi k \quad / : 4$$

$$3m = 4\pi - \pi k$$

$$m = \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi k}{3}, \quad \pi \leq m < 2\pi$$

$$\pi \leq \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi k}{3} < 2\pi \quad / : \pi$$

$$1 \leq \frac{4}{3} - \frac{k}{3} < 2 \quad / \cdot 3$$

$$3 \leq 4 - k < 6 \quad / - 4$$

$$-1 \leq -k < 2$$

$$-2 < k \leq +1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$k = -1 \quad m = \frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \chi = -2\pi + \frac{5\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$$

$$k = 0 \quad m = \frac{4\pi}{3} \quad \Rightarrow \quad \chi = 0 \cdot 2\pi + \frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

$$k = 1 \quad m = \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \pi \quad \chi = 2\pi + \pi = 3\pi$$

$$\text{Ответ: } -2\pi; \frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; 3\pi.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$8m = 4\pi + 4\pi k \quad / : 8$$

$$m = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2}, \quad 0 \leq m < \pi$$

$$0 \leq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2} < \pi \quad / : \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq 1 + k < 2 \quad / - 1$$

$$-1 \leq k < 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$k = -1 \quad m = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow x = -2\pi + 0 = \boxed{-2\pi}$$

$$k = 0 \quad m = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 0 + \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

II 3 и 4 знака, $\pi \leq m < 2\pi$

$$10(m - \frac{3\pi}{2}) = \pi - 4\pi k - 2m$$

$$10m - 15\pi = \pi - 4\pi k - 2m$$

$$12m = +16\pi - 4\pi k$$

$$m = 2\pi - \frac{\pi k}{2}$$

$$\pi \leq 2\pi - \frac{\pi k}{2} < 2\pi \quad / : \pi$$

$$1 \leq 2 - \frac{k}{2} < 2 \quad / - 2$$

$$-1 \leq -\frac{k}{2} < 0$$

$$0 < \frac{k}{2} \leq 1 \quad / \cdot 2$$

$$0 < k \leq 2, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$k = 1 \quad m = 2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = 1 \cdot 2\pi + \frac{3\pi}{2} = \frac{7\pi}{2}$$

$$k = 2 \quad m = 2\pi - \frac{\pi \cdot 2}{2} = \pi \Rightarrow x = 2 \cdot 2\pi + \pi = 5\pi$$

Ответ: $-2\pi; \frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}; 5\pi.$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



~ 3

$$10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

Итак $m = x \% 2\pi \Rightarrow x = k \cdot 2\pi + m, k \in \mathbb{Z}$
(m - остаток x от деления на 2π)



Получа ~~а~~ $\cos x = \cos m$

$$\arcsin(\cos x) = \arcsin(\cos m)$$

Реш 4 случая



1) $m \in I$

$$\arcsin(\cos m) = \frac{\pi}{2} - m$$



2) $m \in II$

$$\arcsin(\cos m) = \frac{\pi}{2} - m$$



3) $m \in III$

$$\arcsin(\cos m) = \frac{3\pi}{2} - m = m - \frac{3\pi}{2}$$

4) $m \in IV$

$$\arcsin(\cos m) = m - \frac{3\pi}{2}$$

$$10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

$$10 \arcsin(\cos m) = \pi - 2(k \cdot 2\pi + m)$$

или

I 1 и 2 случая $0 \leq m < \pi$

$$10 \left(\frac{\pi}{2} - m \right) = \pi - 4\pi k - 2m$$

$$5\pi - 10m = \pi - 4\pi k - 2m$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0 & (1) \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \quad 3y = ax + 4b$$

$$y = \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b \quad - \text{наклонная прямая}$$

проходят через

$$\frac{a}{3} = \tan \alpha \quad \frac{4}{3}b(0) \frac{4}{3}b$$

α - угол наклона

$$(2): \quad x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad | \quad x^2 + y^2 - 20y + 64 = 0$$

$$x^2 + y^2 = 1 \quad - \text{уражение}$$

окр-ты

$$y^2 - 20y + 100 + x^2 - 100 + 64 = 0$$

(0; 0) - центр

$$R = 1$$

$$x^2 + (y - 10)^2 = 36 \quad - \text{уражение}$$

(0; 10) - центр


окр-ты

$$R = 6$$

$$y = \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b$$

$$\frac{a}{3} = \tan \alpha$$

$$y = \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b$$



Проведем внутр касат, найдем α - угол наклона

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

Т.к. система имеет 4 решения $\Rightarrow$

Каждое значение a , для которых нет таких
систем
уравнений не может иметь 4 решения.



$$OB = 20$$

$$OH = AC = \sqrt{OB^2 - BH^2} \quad (1)$$

$$BH = BC + CH = 6 + 1 = 7$$

$$(2) \sqrt{10^2 - 7^2} = \sqrt{51}$$

Заметим, что $\triangle BCD \sim \triangle OAD$ $\Rightarrow$
($\angle BDC = \angle ADO$ - верт, по 2-му углу
 $\angle BCD = \angle OAD = 90^\circ$)

$$\Rightarrow \frac{BC}{AO} = \frac{AD}{OD} = k$$

$$\frac{AD}{OD} = \frac{6}{1} \Rightarrow \text{пусть } AD = 6x \quad OD = x$$

$$OB = BD + OD = 6x + x = 7x = \sqrt{51} \quad 10$$

$$AD = AC = AD + OD = 7x = \sqrt{51}$$

$$x = \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$OD = 6x = \frac{6\sqrt{51}}{7}$$

Тогда, $\tan \angle BDC = \tan(90^\circ - 2) = \frac{BC}{OD} = \frac{6 \cdot 7}{6\sqrt{51}} = \frac{7}{\sqrt{51}}$

$$\cot(90^\circ - 2) = \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$\tan 2 = \frac{\sqrt{51}}{7}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\frac{a}{3} = \operatorname{tg} 2 = \frac{\sqrt{51}}{7}$$

Тогда система ^{может} иметь 4 реш при

$$\frac{a}{3} > \operatorname{tg} 2$$

$$\frac{a}{3} > \frac{\sqrt{51}}{7}$$

и

$$\frac{a}{3} < -\frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$a > 3 \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$a < -3 \frac{\sqrt{51}}{7}$$

$$\text{Ответ: } a > \frac{3\sqrt{51}}{7}; \quad a < -\frac{3\sqrt{51}}{7}.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\sim 5 \quad \begin{cases} \log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{2x^3} 625 - 3 & (1) \\ \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3 & (2) \end{cases} \quad xy = ?$$

$$\text{ОДЗ: } \begin{cases} 2x > 0 \\ 2x \neq 1 \\ y > 0 \\ y \neq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{1}{2} \\ y > 0 \\ y \neq 1 \end{cases}$$

(1): Замена: $\log_5(2x) = a$, с зр ОДЗ $a \neq 0$

$$\log_5^4 2x = a^4$$

$$\log_{2x} 5 = \frac{1}{\log_5 2x} = \frac{1}{a}$$

$$\log_{2x^3} 625 = \log_{(2x)^3} 5^4 = \frac{4}{3} \log_{2x} 5 = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{a} = \frac{4}{3a}$$

$$a^4 - 3 \cdot \frac{1}{a} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{a} - 3 \quad / \cdot a \neq 0$$

$$a^5 - 3 = \frac{4}{3} - 3a$$

$$a^5 + 3a = 4 \frac{1}{3}$$

(2): Замена: $\log_5 y = b$, с зр ОДЗ $b \neq 0$

$$\log_5^4 y = b^4$$

$$\log_y 5 = \frac{1}{\log_5 y} = \frac{1}{b}$$

$$\log_{y^3} 0,2 = \frac{1}{3} \log_y \frac{1}{5} = -\frac{1}{3} \log_y 5 = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{b}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$b^4 + 4 \cdot \frac{1}{b} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{b} - 3 \quad / \cdot b \neq 0$$

$$b^5 + 4 = -\frac{1}{3} - 3b$$

$$b^5 + 3b = -4\frac{1}{3}$$

$$+ \begin{cases} a^5 + 3a = 4\frac{1}{3} \\ b^5 + 3b = -4\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$a^5 + b^5 + 3(a+b) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Заметим, что } (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) = \\ = a^5 - \cancel{a^4b} + \cancel{a^3b^2} - \cancel{a^2b^3} + \cancel{ab^4} + \cancel{a^4b} - \cancel{a^3b^2} + \cancel{a^2b^3} - \cancel{ab^4} + b^5 = a^5 + b^5 \end{aligned}$$

$$(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) + 3(a+b) = 0$$

$$(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 + 3) = 0$$

$$a+b=0 \quad \left| \quad \frac{a^5 + b^5}{a+b} + 3 = 0 \quad a+b \neq 0 \right.$$

$$\log_5 2x + \log_5 y = 0 \quad \left| \quad \text{выражение} \right.$$

$$\log_5 (2xy) = 0 \quad \left| \quad \text{Заметим, что } (a^5 + b^5) \text{ и } (a+b) \right.$$

$$2xy = 1 \quad \left| \quad \text{совпадают по знаку} \Rightarrow \right.$$

$$\left| xy = \frac{1}{2} \right| \quad \left| \quad \Rightarrow \frac{a^5 + b^5}{a+b} > 0 \Rightarrow \right.$$

$$\text{Тогда } \frac{a^5 + b^5}{a+b} + 3 \geq 0 \quad \text{реш нет}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$$a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 + 3 = 0$$

$$a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - a^2b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2)^2 - (ab)^2 - ab(a + b)^2 - 2ab + 3 = 0$$

$$((a + b)^2 - 2ab)^2 - (ab)^2 - ab((a + b)^2 - 2ab) + 3 = 0$$

$$(a + b)^2 = s \quad ab = p$$

$$(s - 2p)^2 - p^2 - p(s - 2p) + 3 = 0$$

$$s^2 - 4ps + 4p^2 - p^2 - ps + 2p^2 + 3 = 0$$

$$s^2 - 5ps + 5p^2 + 3 = 0$$

$$s^2 - 5ps + 5p^2 + 3 = 0$$

$$s^2 - 4ps + 4p^2 - ps + p^2 + 3 = 0$$

$$(s - 2p)^2 + p^2 - 2ps + 1 + 2 + ps = 0$$

$$(p - 1)$$

$$\frac{a^5 + b^5}{a + b}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$a^4 + a^2 b^2 + b^4 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$a^4 - 2a^2 b^2 + b^4 + 3a^2 b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 - b^2)^2 + 3a^2 b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$a^4 + 2a^2 b^2 + b^4 - a^2 b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2)^2 + 2ab(a^2 + b^2) + a^2 b^2 - 2a^2 b^2 - 3ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2 + ab)^2 - 2a^2 b^2 + 3(-ab(a^2 + b^2) + 1) = 0$$

$$\underbrace{(a^2 + b^2)^2}_{c} - \underbrace{2ab}_{p} + ab)^2 - 2(ab)^2 + 3(-ab(a^2 + b^2 - 2ab) + 1) = 0$$

$$(c^2 - p)^2 -$$

$$a^4 + b^4 + ab(-a^2 + ab - b^2) + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 - ab(a^2 - ab + b^2) + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 - ab((a+b)^2 - ab) + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 - ab(a+b)^2 - a^2 b^2 + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 - a^2 b^2 + b^2(a^2 + b^2) + (a^2 + b^2)ab - a^2 b^2 - 3ab - (a+b)^2 ab -$$

$$0 = 3 + 2ab - (a^2 + b^2)ab - (a^2 + b^2)ab - (a^2 + b^2)ab - (a^2 + b^2)ab -$$

$$0 = 3 + (a^2 + b^2)ab - a^2 b^2 - a^2 b^2 - a^2 b^2 - a^2 b^2 -$$

$$0 = 3 + a^2 b^2 + b^2 a^2 - a^2 b^2 - a^2 b^2 - a^2 b^2 - a^2 b^2 -$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МОФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$h \cdot 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} = \frac{m}{n} \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1} \cdot 5^{-22} \cdot a^2 \quad \frac{33}{22}$$

$$a^2 = \frac{h}{m} \cdot 2^{10} \cdot 3^{15} \cdot 5^{34}$$

$$a = 3 \cdot 2^5 \cdot 5^{17} \sqrt{\frac{h}{m} \cdot 3}$$

~~$$b = \frac{h \cdot 2^{16} \cdot 3^{24} \cdot 5^{12} \cdot m}{n \cdot 2^{10} \cdot 3^{25} \cdot 5^{34}} = \frac{m}{n} \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1} \cdot 5^{-22}$$~~

~~$$c = \frac{h \cdot 2^{10} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33}}{n}$$~~

$$abc = a \cdot \frac{m}{n} \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1} \cdot 5^{-22} \cdot \frac{h \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{35}}{n}$$

$$= a \cdot m \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{13}$$

$$= a \cdot m \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{13} \cdot 3 \cdot 2^5 \cdot 5^{17} \sqrt{\frac{h}{m} \cdot 3}$$

$$m \sqrt{\frac{h}{m} \cdot 3} \rightarrow \min$$

$$\sqrt{h m \cdot 3} \rightarrow \min$$

используем $\cos x = a$

$$\sin x = \pm \sqrt{1 - a^2} \Rightarrow$$

are $\sin(\cos x)$

$$\Rightarrow \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + a^2 = 1$$

$$a = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



23



$$10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

1) $x \in I$ и т

Рассмотрим 4 случая

1) $x \in I$ и т

$$\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$$



2) $x \in IV$ и т


$$\arcsin(\cos x) = \left(x + \frac{\pi}{2}\right) / \frac{\pi}{2}$$

3) $x \in II$ и т

$$\arcsin(\cos x) = \left(\frac{\pi}{2} - x\right) / \frac{\pi}{2}$$

4) $x \in III$ и т

$$\arcsin(\cos x) = \left(x + \frac{\pi}{2}\right) / \frac{\pi}{2}$$



10 Т.к.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$a^4 + a^2 b^2 + b^4 - a^3 b - a b^3 + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2)^2 + a^2 b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2)(a^2 + b^2 - ab) + 3 + a^2 b^2 = 0$$

$$(a^2 + b^2)((a+b)^2 - 3ab) + 3 + a^2 b^2 = 0$$

$$(a^2 + b^2)^2 - 3ab(a^2 + b^2) + a^2 b^2 + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2)^2 - ab(a^2 + b^2) + a^2 b^2 + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2 + ab)^2 - 3ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$((a+b)^2 - ab)^2 + 3(1 - ab(a^2 + b^2)) = 0$$

$$(a^2 + b^2 - a^2 b^2)^2 + ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$\frac{a^3 + b^3}{a+b} + 3 = 0 \quad | \cdot a+b \neq 0$$

$$a^3 + b^3 + 3(a+b) = 0$$

$$(a+b) \left((a^2 + b^2)^3 + a^3 b^3 + 3 \right) = 0$$

$$(a^2 + b^2)^3 + a^3 b^3 + 3(a^2 + b^2 + ab) = 0$$

$$a^2 + b^2 = m$$

$$a^2 b^2 = n$$

$$m^2 - mn + n^2 + 3 = 0$$

$$\frac{m^3 + n^3}{m+n} + 3 = 0$$

$$a^3 + b^3 - (a+b)(a^2 - ab + b^2) = 0$$

$$\cos \frac{4\pi}{3} = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{4\pi}{3} = \cos \left(\frac{\pi}{3} + \pi \right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\arcsin \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Замена: $\log_y 5 \rightarrow \log_5 y = b$ $4\pi + 4\pi k = 8\pi$
 $u \in \mathbb{D}^3$ т.е. $y \neq 1 \Rightarrow b \neq 0$ $m = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2}$
 $0 \leq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2} < \pi / \pi$

$$b^4 + \frac{4}{b} = -\frac{1}{3b} - 3 \quad | \cdot b \neq 0 \quad 0 \leq \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2} < \pi$$

$$b^5 + 4 = -\frac{1}{3} - 3b \quad 0 \leq 1 + k < 2$$

$$(2) \quad b^5 + 3b + 4\frac{1}{3} = 0$$

$$(1) \quad a^5 + 3a - 4\frac{1}{3} = 0 \quad (2)$$

$$a^5 + b^5 + 3a + 3b = 0$$

$$x = \frac{a^5}{2}$$

$$y = \frac{b^5}{2}$$

$$x \cdot y = \frac{a^5 \cdot b^5}{2}$$

$$(a+b)(a^4 - ab^3)$$

$$-a + b^4$$

$$a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

$$(1) \quad b^5 + 3a + 4\frac{1}{3} = 0 \quad | \cdot 3$$

$$b^5 + 3a + 4\frac{1}{3} = 0 \quad | \cdot 3$$

$$a^5 + b^5 = (a+b)^5 - 5ab(a^3 + b^3)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) = (a+b)((a+b)^2 - 3ab)$$

$$a^4 + b^4 = (a+b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3) =$$

$$= a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + a^3b - a^2b^2 + ab^3 - b^4 = a^4 - b^4$$

$$a^4 + b^4 = (a+b)(a^3 - a^2b + ab^2 - b^3)$$

$$a^5 + b^5 = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ




$$AD : DB = \frac{5}{2}$$

$$\text{при } m = \frac{x}{2\pi}$$

$$\frac{S_{\triangle AEC}}{S_{\triangle BFC}} = \frac{\arcsin(\cos x)}{\arcsin(\cos m)} = \arcsin(\cos m)$$

$$\arcsin(\cos x)$$

при $x \in I, IV$ и $x \in I$
 $\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$



$$\text{то } \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

$x \in IV$
 $\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} + x$

$$\arcsin(\cos x)$$

(1) ~~при~~ $\cos x$

$x \in I, IV$ и $x \in I$

$$\arcsin(\cos x)$$

$$\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$$

$x \in II$

$$\arcsin(\cos x) = x + \pi$$


$x \in III$

$$x = \frac{3\pi}{2} \quad \cos \frac{3\pi}{2} = 0$$

$$\arcsin(0) = 0$$

$$\text{то } 0 = 0$$

$$\pi -$$



$x \in II$
 $\arcsin(\cos x)$

$$\arcsin(\cos x) = -x - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - x$$

$x \in III$

$$\arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$\cos(5\pi) = \cos \pi = -1$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$-5\pi = \pi - 2 \cdot 5\pi$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

a, b, c

$$ab: 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}$$

$$bc: 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}$$

$$ac: 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33}$$

a, b, c наим - ?

$$\text{Решб } | ab = k 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12} \quad (1)$$

$$bc = m 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} \quad (2)$$

$$ac = n 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33} \quad (3)$$

$$(1) + (2): b(a+c)$$

$$c(a+b)$$

$$a(b+c)$$

$$(1) \quad b = \frac{2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}}{a}$$

$$(2): \quad b = \frac{2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}}{c}$$

или

$$(3): \quad c = \frac{2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33}}{a} = \frac{2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} \cdot a}{2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}} = 2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^5 \cdot a$$

$$2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33} = 2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^5 \cdot a^2$$

$$a^2 = 2^{10} \cdot 3^{15} \cdot 5^{34}$$

$$(1): \quad b = \frac{k 2^8 \cdot 3^{14} \cdot 5^{12}}{a}$$

$$(3): \quad c = \frac{n \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33}}{a}$$

$$(2): \quad b = \frac{m 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17}}{c} = \frac{m \cdot 2^{12} \cdot 3^{20} \cdot 5^{17} \cdot a}{n \cdot 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{33}}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$= a^5 - a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 + ab^4 - a^3b^2 + a^2b^3 - a^4b + b^5 = a^5 + b^5$$

$$(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) + 3(a+b) = 0$$

$$(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 + 3) = 0$$

$$a+b=0 \quad a^3(a-b) + a^2b^2 + b^3(b-a) + 3 = 0$$

$$a^2b^2 + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 + ab(-a^2 + ab - b^2) + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 - ab(a^2 - 2ab + b^2 + ab) + 3 = 0$$

$$a^4 + b^4 - ab(a-b)^2 + ab + 3 = 0$$

$$a^2 + b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$a^4 + b^4 = (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) =$$

$$= a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 - a^3b - a^2b^2 - ab^3 - b^4$$

$$a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - a^2b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2) - a^2b^2 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$(a^2 + b^2)(1 - ab) - a^2b^2 + 3 = 0$$

$$a^2 + b^2$$

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 - ab(a^2 + b^2) + 3 = 0$$

$$a^4 + ab^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + a^2b^2 + b^4) =$$

$$\frac{a^4 - b^4}{a^2 - b^2} = \frac{a^2b^2 - b^6}{a^2 - b^2}$$

$$3 = 4 - 1$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$



$$\arcsin \cos x = \pi - 2x$$

$$\frac{100}{3^6}$$

$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{2x^3} 625 - 3 \quad (1)$$

$$\log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_5^3 0,2 - 3 \quad (2)$$

$$x^2 + y^2 - 2 \cdot 10 \cdot y + 10^2 - 10^2 + 64 = 0$$

$$x^2 + (y - 10)^2 = 36$$

$$(0) \quad 10 = 12$$

$$\text{OD 3: } \begin{cases} 2x > 0 \\ 2x \neq 1 \\ y > 0 \\ y \neq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq \frac{1}{2} \\ y > 0 \\ y \neq 1 \end{cases}$$

$$625 = 25^2 = 5^4$$

$$(1): \log_{2x} \log_{2x} 5 = \frac{1}{\log_5 2x}$$

$$\log_{2x^3} 625 - 3 = \frac{1}{3} \log_{2x} 625 = \frac{4}{3} \log_{2x} 5 = \frac{4}{3 \log_5 2x}$$

$$\text{Замена: } \log_5 2x = a \quad \text{и} \quad \text{OD 3} \quad \text{т.е. } x \neq \frac{1}{2} \Rightarrow a \neq 0$$

$$a^4 - \frac{3}{a} = \frac{4}{3a} - 3 \quad / \cdot a \neq 0$$

$$a^5 - 3 = \frac{4}{3} - 3a$$

$$(2): \log_y 5 = \frac{1}{\log_5 y}$$

$$\log_5^3 0,2 = \frac{1}{3} \log_y \frac{1}{5} = -\frac{1}{3} \log_y 5 = -\frac{1}{3 \log_5 y}$$

